

Práctica 6

Grupo 4:

- Sofía Apolo Tovar
- M^a Teresa Batanero Llorens
- Lía Jover Henríquez
- María Moya García
- Luís Martín

ÍNDICE


Ejercicio 1: Con la base de datos datos_practica_2.sav realiza el siguiente contraste de hipótesis:	2
- Si la media de altura es 1,65 en la población de estudiantes de primero de Nebrija. Siendo $\alpha = 0,05$	2
Ejercicio 2: Crea la sintaxis para reproducir los análisis	2
- Código	3
Ejercicio 3: Crea un repositorio y sube allí la sintaxis el informe y la base de datos	3

Ejercicio 1: Con la base de datos datos_practica_2.sav realiza el siguiente contraste de hipótesis:

- Si la media de altura es 1,65 en la población de estudiantes de primero de Nebrija. Siendo $\alpha = 0,05$

Prueba para una muestra							
Valor de prueba = 1.65							
	t	gl	Significación		Diferencia de medias	95% de intervalo de confianza de la diferencia	
			P de un factor	P de dos factores		Inferior	Superior
Altura (metros)	6,043	44	<,001	<,001	,07133	,0475	,0951

Ejercicio 2: Crea la sintaxis para reproducir los análisis



```
* Encoding: UTF-8.
DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1.
EXAMINE VARIABLES=altura_metros
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
T-TEST
  /TESTVAL=1.65
  /MISSING=ANALYSIS
  /VARIABLES=altura_metros
  /ES DISPLAY(TRUE)
  /CRITERIA=CI(.95).
```

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode: ACTIVADO Clásico In 18 Col 0 NUM

- Código

* Encoding: UTF-8.

```
DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1.
```

```
EXAMINE VARIABLES=altura_metros
```

```
/PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPLOT
```

```
/COMPARE GROUPS
```

```
/STATISTICS DESCRIPTIVES
```

```
/CINTERVAL 95
```

```
/MISSING LISTWISE
```

```
/NOTOTAL.
```

T-TEST

```
/TESTVAL=1.65
```

```
/MISSING=ANALYSIS
```

```
/VARIABLES=altura_metros
```

```
/ES DISPLAY(TRUE)
```

```
/CRITERIA=CI(.95).
```

Ejercicio 3: Crea un repositorio y sube allí la sintaxis el informe y la base de datos

