FMI, Info, Anul I Semestrul I, 2016/2017 Logică matematică și computațională Laurențiu Leuştean, Alexandra Otiman, Andrei Sipoş

Seminar 4

- (S4.1) Arătați, pe rând, următoarele:
 - (i) Dacă A este finită şi B este numărabilă, atunci $A \cup B$ este numărabilă.
 - (ii) Dacă I este o mulțime numărabilă şi $(A_i)_{i\in I}$ este o familie disjunctă de mulțimi numărabile, atunci $\bigcup_{i\in I} A_i$ este numărabilă.
- (iii) Dacă I este o mulțime numărabilă și $(A_i)_{i\in I}$ este o familie de mulțimi numărabile, atunci $\bigcup_{i\in I} A_i$ este numărabilă.
- (iv) \mathbb{Q} este numărabilă.
- (S4.2) Să se arate că mulțimea Form, a formulelor logicii propoziționale, este numărabilă.
- (S4.3) Fie următoarele propoziții exprimate în limbaj natural:
 - (i) Merg în parc dacă îmi termin treaba şi nu apare altceva.
 - (ii) Este necesar să nu plouă ca să putem observa stelele.
- (iii) Treci examenul la logică numai dacă înțelegi subiectul.
- (iv) Treci examenul la logică dacă faci o prezentare de calitate.

Transpuneți-le în formule ale limbajului formal al logicii propoziționale.

- (S4.4) Să se arate că pentru orice formulă φ , numărul parantezelor deschise care apar în φ coincide cu numărul parantezelor închise care apar în φ .
- (S4.5) Să se dea o definiție recursivă a mulțimii variabilelor unei formule.
- (S4.6) Să se arate că pentru orice $e: V \to \{0,1\}$ și pentru orice formule φ, ψ avem:

- (i) $e^+(\varphi \lor \psi) = e^+(\varphi) \lor e^+(\psi);$
- (ii) $e^+(\varphi \wedge \psi) = e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi);$
- (iii) $e^+(\varphi \leftrightarrow \psi) = e^+(\varphi) \leftrightarrow e^+(\psi)$.

(S4.7) Să se demonstreze că pentru orice $x_0, x_1, x_3, x_4 \dim \{0, 1\}$ avem:

- (i) $((x_0 \to x_1) \to x_0) \to x_0 = 1;$
- (ii) $(x_3 \to x_4) \to ((x_4 \to x_1) \to (x_3 \to x_1)) = 1$.