Evolución de la brecha en la edad de defunción entre hombres y mujeres en Costa Rica, 2005-2024

Herramientas de Ciencia de Datos 1

Mariano Morales Carvajal C5H565
Universidad de Costa Rica, Escuela de Matemática, Departamento de Ciencias Actuariales
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica
Profesor: Luis Alberto Juárez Potoy
17 de octubre de 2026

1 Introducción

La edad de defunción difiere entre hombres y mujeres en Costa Rica, y entender cómo ha cambiado esa diferencia es importante desde el punto de vista actuarial. La brecha entre ambos sexos tiene implicaciones en áreas como los seguros de vida, los sistemas de pensiones y los riesgos que conlleva la longevidad. Además, comprender cómo evoluciona permite identificar patrones de mortalidad que pueden servir como punto de partida para realizar proyecciones actuariales y evaluar riesgos futuros.

En este reporte se busca contestar la pregunta de investigación: **¿Cómo evolucionó la brecha en la edad de defunción entre hombres y mujeres en Costa Rica durante el período 2005-2024?** Para responderla se utilizan los registros oficiales de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Se entiende por brecha la diferencia entre la edad de defunción de las mujeres y la de los hombres, que se calcula restando el valor de los hombres al de las mujeres. En los análisis descriptivos se utiliza la edad mediana y en la regresión lineal (que constituye el análisis principal) la edad promedio.

2 Objetivos

Objetivo general: Analizar la evolución de la brecha en la edad de defunción entre hombres y mujeres en Costa Rica durante el período 2005-2024.

Objetivos específicos:

1. Describir la distribución de las edades de defunción por sexo, las diferencias entre sexos según las principales causas de defunción y la evolución de la brecha en la edad mediana.
2. Estimar, mediante una regresión lineal con interacción entre sexo y año, la brecha en 2005 y su cambio hasta 2024.
3. Evaluar si el resultado de la regresión es sensible a la inclusión de las defunciones de menores de un año.

3 Datos

Los datos corresponden al registro oficial de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2026) obtenido mediante solicitud directa a las oficinas centrales de la institución en un archivo en formato .sav. El periodo de estudio es 2005-2024 y las variables principales son el año de defunción, el sexo, la edad de defunción (registrada en años enteros) y el grupo de causa de defunción.

El archivo contiene 444731 registros. Con base en la documentación metodológica se identificaron tres posibles complicaciones: defunciones anteriores a 2005 (960 registros), edad ignorada, registrada con el código 999 (478 registros), y sexo distinto de hombre o mujer (0 registros). Los registros de los dos primeros casos se excluyeron porque la edad es la variable central de la investigación, el horizonte temporal estaba delimitado y representan un porcentaje mínimo del total (aproximadamente 0.32 %). Imputarlos podría alterar los resultados, por lo que se optó por excluirlos. Después de la limpieza quedaron 442938 registros para el análisis.

4 Metodología

Para comparar las edades de defunción por sexo se utiliza estadística descriptiva. Se calcula la edad mediana por sexo y año, y la brecha como la diferencia entre ambas medianas. Además, se construye una pirámide de defunciones por grupo de edad y sexo para los períodos 2005-2009 y 2020-2024, y se compara la edad mediana de hombres y mujeres dentro de las ocho causas de defunción más frecuentes, excluyendo embarazo y parto. La mediana divide las edades ordenadas en dos mitades y es menos sensible a valores extremos que el promedio. Los gráficos se elaboraron con ggplot2 (Wickham *et al.*, 2016).

El análisis principal es una regresión lineal de la edad promedio de defunción con interacción entre el sexo y los años transcurridos desde 2005, ajustada con la función lm() (R Core Team, 2026b). El modelo usa una recta para cada sexo, donde la edad promedio es igual al punto de partida más el ritmo de cambio por año multiplicado por los años desde 2005. Sus cuatro coeficientes son: el punto de partida de los hombres, la brecha en 2005, el ritmo anual de los hombres y el cambio anual de la brecha. Si este último es positivo, la brecha crece, y si es 0, la brecha no cambia. El cambio acumulado entre 2005 y 2024 se calcula multiplicando el cambio anual por los 19 años del período, y las rectas estimadas se obtienen con predict() (R Core Team, 2026c) y se comparan con los promedios observados.

Los coeficientes son estimaciones, por lo que se acompañan de intervalos de confianza del 95 %, calculados con confint() (R Core Team, 2026a). Si un intervalo incluye el cero, no hay evidencia estadística suficiente para asegurar que existe un cambio o una diferencia real (Pennsylvania State University, s. f.). Como las defunciones a edades tempranas, en especial las de bebés, pueden reducir considerablemente el promedio, el modelo se repite excluyendo a los menores de un año para evaluar la sensibilidad del resultado. Es importante distinguir que los análisis descriptivos utilizan la edad mediana, mientras que la regresión estima la edad promedio, por lo que sus valores no son directamente comparables.

5 Resultados

5.1 Análisis exploratorio de datos




Figura 1: Defunciones por grupo de edad y sexo, primer y último quinquenio

La figura 1 muestra que entre los 20 y los 65 años se registraron más defunciones de hombres que de mujeres. También se aprecia una mayor cantidad de defunciones a edades avanzadas durante el período 2020-2024 en comparación con 2005-2009. Sin embargo, estas diferencias deben analizarse con cuidado, ya que se comparan cantidades de defunciones y no tasas de mortalidad.




Figura 2: Edad mediana al morir por sexo y causa, 2005-2024

Según la figura 2, la brecha más grande se presenta en las causas externas (accidentes y violencia), donde la edad mediana es de 39 años en los hombres y de 60 en las mujeres, lo que genera una brecha de 21 años. En la categoría de tumores ocurre lo contrario, pues los hombres presentaron una edad

mediana ligeramente mayor que las mujeres. Esto muestra que las diferencias entre ambos sexos varían según la causa de defunción.




Figura 3: Brecha en edad mediana al morir (mujeres - hombres)

La figura 3 describe la evolución de la diferencia en la edad mediana de defunción. Las mujeres presentaron una edad mediana mayor que los hombres durante todo el período, y esta aumentó en ambos sexos: pasó de 68 a 71 años en los hombres y de 74 a 78 años en las mujeres. La brecha fue de 6 años en 2005 y de 7 años en 2024, pero no aumentó de forma constante, ya que alcanzó los 8 años en 2015 y volvió a 6 años en 2020.

5.2 Regresión lineal




Figura 4: Edad promedio al morir: datos reales (puntos) y rectas del modelo (líneas)

La regresión estima una edad promedio de defunción de 61.18 años para los hombres en 2005 y una brecha de 6.05 años, es decir, las mujeres tenían una edad promedio de defunción aproximadamente 6.05 años mayor. Además, la edad promedio de los hombres aumentó alrededor de 0.28 años por cada año transcurrido, mientras que la brecha aumentó aproximadamente 0.03 años anuales (Figura 4). La Tabla 1 resume la brecha estimada, su cambio anual y su cambio acumulado entre 2005 y 2024 para el modelo principal y para el análisis de sensibilidad.

Tabla 1: Brecha estimada y cambio de la brecha según la regresión lineal

Modelo	Medida	Valor (años)	IC (95 %)
Principal	Brecha en 2005	6.05	5.76 a 6.33
	Cambio anual de la brecha	0.03	0.01 a 0.06
	Cambio acumulado 2005-2024	0.6	0.16 a 1.05
Sin menores de un año	Brecha en 2005	6.55	6.29 a 6.80
	Cambio anual de la brecha	0.01	-0.01 a 0.04
	Cambio acumulado 2005-2024	0.28	-0.12 a 0.68

Brecha = mujeres menos hombres, en años. Edad promedio estimada por regresión lineal.

En el modelo principal, la brecha estimada en 2005 fue de 6.05 años y, según el modelo, aumentó aproximadamente 0.6 años entre 2005 y 2024. Aunque este incremento es pequeño, su intervalo de confianza del 95% va de 0.16 a 1.05 años y no incluye el cero, por lo que el modelo proporciona evidencia estadística de un ligero aumento de la brecha en la edad promedio de defunción.

Al excluir las defunciones de menores de un año, la brecha estimada para 2005 aumenta a 6.55 años. Sin embargo, el cambio acumulado entre 2005 y 2024 se reduce a aproximadamente 0.28 años, con un intervalo de confianza del 95% de −0.12 a 0.68 años. Como este intervalo incluye el cero, no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que la brecha haya cambiado durante el período de estudio, lo que indica que la conclusión del modelo principal es sensible a la inclusión de las defunciones infantiles.

6 Conclusiones

Los resultados muestran que las mujeres presentaron una edad de defunción mayor que los hombres durante todo el período 2005-2024, con una brecha en la edad mediana de 6 años en 2005 y de 7 años en 2024. La regresión lineal estima una brecha de 6.05 años en 2005 y un aumento acumulado de aproximadamente 0.60 años hasta 2024, cuyo intervalo de confianza no incluye el cero. Sin embargo, al excluir las defunciones de menores de un año, este aumento deja de ser estadísticamente distinguible de cero. Por lo tanto, la brecha persiste, pero no existe evidencia suficientemente sólida de que haya aumentado.

Estos resultados deben interpretarse con cuidado ya que la base contiene únicamente defunciones y no la población expuesta al riesgo, por lo que no se calculan tasas de mortalidad. Además, el modelo trata cada defunción como una observación independiente, lo que podría producir intervalos de confianza más estrechos de lo que corresponde. También el período incluye la pandemia de COVID-19, cuyo efecto no se analizó de manera separada.

Referencias

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (s. f.-a). *Catálogo de microdatos* [Sitio web]. https://sistemas.inec.cr/nada5.4/index.php/catalog/?page=1&sort_by=year&sort_order=desc&ps=15

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (s. f.-b). *Defunciones 2005-2024* [Conjunto de datos no publicado, proporcionado directamente por la institución].

Pennsylvania State University. (s. f.). STAT 501: *Regression Methods.* PennState Elberly College of Science. / https://online.stat.psu.edu/stat501/Lesson02

R Core Team. (2026a). *confint: Confidence intervals for model parameters*.* R Documentation. https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/confint.html

R Core Team. (2026b). *lm: Fitting linear models. R Documentation.* https://search.r-project.org/R/refmans/stats/html/lm.html

R Core Team. (2026c). *predict.lm: Predict method for linear model fits.* R Documentation. https://search.r-project.org/R/refmans/stats/html/predict.lm.html

Wickham, H., Chang, W., Henry, L., Lin Pendersen, T., Takahashi, K., Wilke, C., Woo, C., Yutani, H. y Dunnington, D. (2016). *ggplot2.* Copyright (s.f.) por Posit Solutions. https://ggplot2.tidyverse.org