





LAMINA 1

Las conchas de Moluscos ilustrados aquí proceden en su gran mayoría de la Plataforma de Margarita, y unos pocos, de su talud epicontinental. Se señala su cuadrante de origen (ver mapas). Muchas se representan del tamaño natural (x 1), pero otras han sido aumentadas (x 3) o reducidas (x 0,6) por conveniencia. La mayoría fueron capturadas vivientes o en estado de preservación muy buena. Se ilustran asimismo unos pocos fósiles que se recuperan en las redes de arrastre y dragados con frecuencia.

Figuras


- 1, 7.- **Turritella (Broderiptella) variegata paraguensis** F. Hodson, 1926. Cuadrante E-21, vista ventral y dorsal de un ejemplar adulto (x 1,2).
- 2, 6.- **Murex (Murex) cabritii** Bernardi, 1858. Cuadrante B-21, vista ventral y dorsal de un ejemplar adulto (x 1,5).
- 3, 4.- **Conus (Leptoconus) multiliratus** Böse, 1906. Cuadrante C-21, fósil de edad Plioceno, (x 1).
- 5, 9, 11, 14.- **Murex (Murex) recurvirostris recurvirostris** Broderip, 1832. Cuadrante B-21, vistas ventral y dorsal en dos variantes de la especie, (x 1).
- 8, 10.- **Murex (Murex) olssoni** Vokes, 1967. Cuadrante B-19, vista ventral y dorsal de un ejemplar adulto (x 1).
- 12, 13.- **Latirus (Polygona) angulatus** (Röding, 1798). Cuadrante C-21, vistas dorsal y ventral del mismo ejemplar adulto. Los epibiontos del coral ramoso **Cladocora arbuscula** Lesueur, conviven con *L. angulatus*, como comensales (x 0,8).



LAMINA 2

Figuras


- 1, 5.- *Fusinus (Fusinus) frailensis*, sp. n. Cuadrante C-20, (x 1).
- 2-4.- *Fusinus (Fusinus) closter* (Philippi, 1851). Cuadrante E-21, 2, 4: conchas juveniles; 3: adulto, vista dorsal, todos (x 1).
- 6, 9.- *Fusinus (Fusinus) carvalhoriosi* sp. n., Cuadrante E-21, conchas juveniles, vistas ventral y dorsal. (x 1).
- 7, 8.- *Fusinus (Fusinus) marensis* Weisbord, 1962. Cuadrante C-21. (x 1).
- 10.- *Cerithium (Theridium) eburneum* Bruguiere, 1792. Cuadrante G-17, ejemplar de crecimiento anómalo, en vista ventral. (x 1).
- 11.- *Nerita (Theliosyla) tessellata* Gmelin, 1791. Cuadrante F-19, costa oriental de la Isla de Coche. (x 1).
- 12.- *Olivella (Niteoliva) minuta* (Link, 1807). Cuadrante E-20, (x 4).
- 13.- *Cantharus (Pollia) tinctus* (Conrad, 1846). Cuadrante G-22, frente a la ensenada de Guatapanare (SU). Concha juvenil, vista dorsal. (x 2).
- 14.- *Olivella (Minioliva) cf. O. (M.) fundarugata* Weisbord, 1962. Cuadrante E-17, concha adulta, obtenida por dragado, de 28 m, en arenas limosas finas (x 2).



LAMINA 3

Figuras


- 1, 4.- **Fusinus (Fusinus?) eucosmius** (Dall, 1889). Cuadrante D-22, vistas ventral y dorsal de una concha adulta, biohoradado por el poliqueto *Polydora* sp. (x 1,3).
- 2.- **Fusinus (Fusinus) closter** (Philippi, 1861). Cuadrante C-19, vista ventral de un adulto de perfecta conservación. (x 1).
- 3, 8.- **Fusinus (Fusinus) carvalhoriosi** sp. n. Cuadrante C-20, del banco de Los Frailes, vistas ventral y dorsal. (x 1,3).
- 5, 11.- **Simnia** cf. **S. inflexa** (Sowerby, 1832). Cuadrante C-23, al oeste del banco de Cumberland. Vistas ventral y dorsal de un ejemplar inmaduro. (x 1).
- 6, 10.- **Oliva (Oliva) caribaeensis** Dall & Simpson, 1901. Cuadrante E-22, vistas ventral y dorsal de concha adulta. (x 1).
- 7.- **Oliva (Ispidula) reticularis** Lamarck, 1811. Cuadrante D-17, vista ventral de concha adulta, (x 1).
- 9, 12.- **Crassispira (Hindsiclava) jungi** sp. n., cuadrante B-22, vistas dorsal y ventral del Paratipo, (x 1).
- 13.- **Hastula hastata** (Gmelin, 1791). Cuadrante D-19, vista ventral de una concha adulta, (x 1).



L A M I N A 4

Figuras


- 1,4.- *Fusinus* (*Fusinus*?) *martinezi* sp. n. Cuadrante E-24, vistas dorsal y ventral del Holotipo. (x 1).
- 2,3.- *Fusinus* (*Fusinus*) *veatchi* (Maury, 1917). Cuadrante D-21, en el banco de Punta Moreno, (x 1,3).
- 5,12.- *Latirus* (*Polygona*) *infundibulum* (Gmelin, 1791). Cuadrante D-18 en los bancos de La Guardia, vistas dorsal y ventral, incrustados por *Serpula* sp. aún en vida, (x 0,8).
- 6,7.- *Nerita* (*Nerita*) *amplisulcata* sp. n. Cuadrante D-19, en las costas cercanas a Manzanillo, Paraguaychoa. Vistas ventral y dorsal del holotipo, (x 1).
- 8,9.- *Chicoreus* (*Chicoreus*) *vokesae* sp. n. Cuadrante D-21, en el banco de Punta Moreno, vistas dorsal y ventral, del Paratipo. (x 0,6).
- 10,11.- *Fusinus* (*Fusinus*) cf. *F. (F.) marmoratus* (Philippi, 1846). Cuadrante B-21, vistas ventral y dorsal, (x 1).
- 13,14.- *Natica* (*Glypheidium*) *cayennensis* Récluz, 1859, subsp. Cuadrante D-19, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto, con el labio externo fracturado, (x 0,8).
- 15.- *Amphissa* (*Cosmioconcha*) cf. *A. (C.) nitens* (C. B. Adams, 1850). Cuadrante E-16, en el banco de Punta Arenas de Macanao (N.E.), vista ventral de un ejemplar adulto, (x 3).
- 16.- *Nassarius* (*Uzita*) *nanus* Usticke, 1959. Cuadrante B-21, vista ventral de un ejemplar juvenil, (x 3).
- 17,18.- *Poirieria* (*Panamurex*) *velero* E. H. Vokes, 1970. Cuadrante A-20, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto, (x 1).
- 19,20.- *Siphocypraea* (*Muracypraea*) *mus* (Linné, 1758). Cuadrante G-22, en lodos negros de la ensenada del Lebranche (SU), (x 0,66), vistas dorsal y ventral.



L A M I N A 5

Figuras


- 1, 6.- **Tonna galea galea** (Linné, 1758). Cuadrante E-21, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto.
(x0,6).
- 2, 3.- **Conus (Lithoconus) spurius atlanticus** Clench, 1942. Cuadrante D-22, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto, (x1,2).
- 4.- **Fusinus (Fusinus) closter** (Philippi, 1851). Cuadrante C-19, concha adulta, en vista dorsal; vease la vista ventral en lamina 7, fig. 3, (x1).
- 5.- **Conus (Lithoconus) cf. C. (L.) floridanus** Gabb 1868, cuadrante B-22, vista dorsal de concha adulta, fósil de edad Plio-Pleistocena, (x1,2).
- 7.- **Pleuroliria (Polystira) albida** (Perry, 1811). Cuadrante E-22, vista dorsal de un ejemplar adulto, el cual en la penúltima vuelta, muestra un poliqueto parasitario; ambos organismos se hallaban vivos en el momento de su captura. (x1).
- 8, 9.- **Ancilla (Ancilla) tankervillei** (Swainson, 1825). Cuadrante F-20, vistas dorsal y ventral del mismo ejemplar, (x1).
- 10, 11.- **Ancilla (Eburna) glabrata** (Linné, 1801). Cuadrante F-18, vistas dorsal y ventral de una concha adulta, (x1).
- 12.- **Conus (Leptoconus) stimpsoni** Dall, 1902. Cuadrante B-21, vista ventral de una concha adulta, (x1,5).



LAMINA 6

Figuras


- 1, 4.- **Ancilla (Ancilla) tankervillei** (Swainson, 1825). Cuadrante C-18, vistas ventral y dorsal de dos ejemplares adultos, mostrando la variabilidad poblacional, (x 1).
- 5, 6.- **Ancilla (Ancilla) tankervillei**, subsp.? Cuadrante C-21, vista ventral y dorsal de un ejemplar adulto, (x 1).
- 7, 8.- **Pleurotomella** sp. indet., cuadrante B-22, vista ventral y dorsal (x 2).
- 9, 10.- **Morula (Trachypollia) gilbertharrisii** (Weisbord, 1962). Cuadrante F-20, vistas ventral y dorsal de ejemplares adultos, (x 1).
- 11, 13.- **Crassispira (Crassispira) fuscescens** (Reeve, 1843). Cuadrante D-21, dos vistas ventrales y una dorsal de 3 ejemplares adultos distintos, (x 1).
- 14, 15.- **Cymatium (Cymatium) etcheversi**, sp. n. Cuadrante D-21, vista ventral y dorsal del Holotipo, el cual fue capturado vivo; en el dorso y las vueltas tempranas, se hallan epibiontos de serpulidos.
- 16.- **Calliostoma adpersum** (Philippi, 1851). Cuadrante D-21, vista abertural-ventral de un ejemplar adulto (x 1).
- 17.- **Mazatlanina cosentini** (Philippi, 1836). Cuadrante D-17, vista lateral de un ejemplar inmaduro, (x 2). Esta es la forma que se llamó *M. nodosoplicata* (Dunker, 1853).
- 18, 19, 21.- **Cerithium (Theridium) lutosum** Menke, 1828. Cuadrante E-18, laguna de la Arestinga, (x 2).
- 20, 23.- **Dalium solidum** Dall, 1889a. Cuadrante A-16, dragado del talud meridional de la plataforma de La Blanquilla (DF), vista dorsal y ventral del mismo ejemplar adulto (x 1).
- 22.- **Thais (Vasula) cf. T. (V.) melones** (Duclos, 1832). Cuadrante F-19, vista ventral de un ejemplar adulto, (x 1).



LAMINA 7

Figuras


- 1.- **Mazatlanian** *cosentini* (Philippi, 1836). Cuadrante D-17, vista dorsal de un ejemplar adulto, con la ornamentación poco nodosa, (x2).
- 2, 8.- **Ficus** cf. *F. ventricosa* (Sowerby, 1825). Cuadrante E-20, vistas ventral y dorsal de un adulto en perfecto estado de preservación (x1).
- 3.- **Fusinus** (*Fusinus*) *closter* (Philippi, 1851). Cuadrante C-19, vista ventral del mismo ejemplar de la lamina 5, fig. 4, (x1).
- 4.- **Fusinus** (*Fusinus*) *carvalhoriosi* sp. n., cuadrante E-22, vista ventral de un ejemplar juvenil, donde una biohoradación de *Polydora* sp. ocasiona el torcimiento del canal anterior. (x1).
- 5.- **Olivella** (*Niteoliva*) *verreauxi* (Ducros, 1857), Cuadrante F-22, vista ventral de un ejemplar adulto, (x2).
- 6, 14.- **Chicoreus** (*Phyllonotus*) *margaritensis* (Abbott, 1958). Cuadrante F-20, vista ventral y dorsal de un ejemplar adulto, (x1).
- 7.- **Olivella** (*Olivella*) *kifos*, sp. n., cuadrante C-23, vista ventral del Holotipo, (x1;7).
- 9.- **Terebra** (*Paraterebra*) *taurina* (Lightfoot, 1786), Cuadrante C-20, vista lateral de un ejemplar adulto bien preservado, (x1).
- 10.- **Turritella** (*Broderiptella*) *variegata* (Linné, 1758). Cuadrante E-22, vista ventral de ejemplar adulto, mostrando los rasgos aberturales típicos, (x0,8).
- 11, 13.- **Prunum** (*Prunum*) *circumvittatum* (Weisbord, 1962). Cuadrante A-21, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto, (x2).
- 12, 15.- **Vasum** (*Vasum*) *ceramicum* (Linné, 1758). Cuadrante F-17, vista ventral de ejemplar adulto y uno juvenil, (x1).



LAMINA 8

Figuras


- 1, 4.- *Voluta musica* Linné, 1758. Cuadrante F-19, vista ventral y dorsal de un ejemplar adulto, (x 1).
- 2, 5, 7.- *Knefastia altenai* sp. n. cuadrante A-21; 2, 7: vistas ventral y dorsal del holotipo; 5, 6: las mismas del Paratipo. (x 1,1).
- 3.- *Oliva (Ispidula) schepmani* Weisbord, 1962. Cuadrante C-21, vista dorsal de un ejemplar adulto. (x 1).
- 8, 9, 15.- *Pleuroliria (Polystira) tellea* (Dall, 1889). Cuadrante A-21, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto, (x 1) y la escultura de la primera vuelta post-nuclear (x 9).
- 10, 11, 14.- *Conus (Dendroconus) ermineus* Born, 1778. Cuadrante C-19, vistas axial, ventral y dorsal de un ejemplar adulto (x 0,8).
- 12, 13.- *Crassispira (Hindsiclava) jungi*, sp. n., cuadrante B-22, vistas dorsal y ventral del Holotipo, (x 1).
- 16.- *Dentalium (Laevidentalium) cf. D. (L.) perlongum* Dall Cuadrante E-23, vistas lateral de un adulto preservado, muestreado de fondos limo-arcillosos, (x 4).



LAMINA 9

Figuras


- 1, 8 *Clathrodrillia gibbosa* (Born, 1778). Cuadrante D-18, vistas ventral y dorsal de un ejemplar adulto, el cual en vida, se hallaba cubierto en un 2/3 por briozoarios incrustantes. (x0,8).
- 2, 4.- *Charonia tritonis variegata* (Lamarck, 1816). Cuadrante C-21, vistas ventral y dorsal de un adulto (x0,6).
- 3, 5.- *Conus* (*Dendroconus*) *patricius* Hinds, 1843. Cuadrante D-22, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto, (x0,6).
- 6, 7.- *Conus* (*Lithoconus*) *centurio* Born, 1778. Cuadrante D-21, vistas ventral y dorsal de un ejemplar adulto, el cual ha sobrevivido un ataque letal, (x1).
- 9, 10.- *Cancellaria* (*Cancellaria*) *reticulata* (Linné, 1767). Cuadrante D-21, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto, (x0,8).
- 11, 12.- *Murex* (*Favartia*) *cellulosus* Conrad, 1846. Cuadrante B-21, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto, con la escultura característica bien preservada (x1).
- 13, 14, 16, 17.- *Umbraculum* cf. *U. plicatulum* (Von Martens, 1881). Cuadrante D-21, vistas dorsal (14, 16) y ventral (13, 17) de dos ejemplares adultos (x1).
- 15 A, B.- *Tralla ovula* (Bruguiere, 1789). Cuadrante F-19, vista ventral de dos variantes de forma; la 15A tiene la última vuelta mas dilatada (x1,5); la 15B es mas fusiforme (x1).
- 18, 19.- *Hydatina vesicaria* (Solander, 1786), Cuadrante F-20, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto, (x1).



L A M I N A 10

Figuras


- 1.- *Strioterebrum concavum* (Say, 1822). Cuadrante B-20, vista ventral de un ejemplar adulto (x 1).
2. 4.- *Lucapinella henseli* (Von Martens, 1890). Cuadrante G-22, vistas dorsal, lateral y ventral de un adulto, (x 1,2).
- 5, 7.- *Diodora cayenensis* (Lamarck, 1822). Cuadrante G-17, vistas dorsal, ventral y lateral de un ejemplar adulto (x 1).
- 8, 9.- *Diodora viridula* (Lamarck, 1822). Cuadrante D-21, vistas lateral y dorsal (x 1).
- 10, 15.- *Lottia antillarum* Sowerby, 1831. Cuadrante F-17, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto, (x 1).
- 11, 12.- *Strombina* (*Strombina*) *pumilio* (Reeve, 1859). Cuadrante F-20, vistas ventrales de dos ejemplares adultos típicos, una con las masas ovigeras propias, con algunas sin eclosionar, (x 5).
- 13, 14.- *Polieria* (*Panamurex*) *recticanalis* (Weisbord, 1962). Cuadrante B-21, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto, (x 2,5).
- 16, 17, 16, 27.- *Astele* (*Leiotrochus*) *bullisi* (Clench & Turner, 1960). Cuadrante D-17, vistas ventral y lateral de dos ejemplares adultos, mostrando diferencias de angulo pleural, (x 1).
- 18, 23.- *Modulus nodusus*, sp. n., cuadrante D-18, vistas dorsal, ventral y lateral del Holotipo (18, 19, 21) y del Paratipo (20, 22, 23) de ésta especie nueva. Epibiontos del género *Spirorbis* sp. frecuentes sobre los ejemplares vivientes. (x 1).
- 24.- *Columbella mercatoria* (Linné, 1758). Cuadrante E-20, vista ventral de un ejemplar adulto, (x 2).
- 25.- *Pallacera uncinata* (Say, 1826). Cuadrante F-20, vista dorsal de un ejemplar adulto, de la forma típica (x 1,5).
- 28.- *Modulus* cf. *M. cerodes* (A. Adams, 1851). Cuadrante F-22, vista lateral de un ejemplar adulto (x 1,5).
- 29, 36.- *Anachis* (*Costoanachis*) *sertularium* (d'Orbigny, 1843). Cuadrante E-21, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto, (x 1,5).
- 30, 31.- *Crepidula* cf. *C. incurva* (Broderip, 1834). Cuadrante D-18, vista dorsal y ventral de un ejemplar adulto, (x 1,3).
- 32, 33.- *Olssonella* cf. *O. smithii* (Dall, 1889). Cuadrante F-22, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto (x 1).
- 34.- *Agladrillia* sp. indet., cuadrante F-17, vista ventral de un ejemplar adulto, biohoradado por un Naticido, (x 1).
- 35.- *Syntomodrillia?* *biconica* Weisbord, 1962. Cuadrante B-22, un ejemplar adulto, en vista dorsal, (x 1,1).
- 37, 38.- *Mitrella* aff. *M. albella* (C. B. Adams, 1850). Cuadrante G-17, vistas ventral y dorsal, (x 1).
- 39, 40.- *Olivella* (*Dactylidia*) *dealbata* (Reeve, 1850). Cuadrante G-18, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto (x 1,5).
- 41.- *Conus* (*Conus*) *mus* Hwass, 1792. Cuadrante E-17, vista dorsal de un ejemplar adulto, (x 1).
- 42.- *Muricopsis praepauxillus* (Maury, 1917). Cuadrante F-17, vista ventral, (x 1,5).
- 43.- *Astraea* (*Lithopoma*) *tuber venezuelensis* Flores & Caceres, 1980. Cuadrante F-22, vista lateral abertural de un ejemplar adulto, (x 2).



L A M I N A 11

Figuras


- 1-6.- *Fasciolaria* cf. *F. papillosa reevei* Jonas in Philippi, 1851. Cuadrante C-21, vistas dorsal y ventral de un ejemplar en juventud temprana (1, 2, x 2,7), y de un adulto (3, 5, x 0,6). Las figuras 4 y 6 corresponden a las vistas interna y externa del operculo corneo del ejemplar adulto (x 1).
- 7,8.- *Haminoea antillarum guadalupensis* (Sowerby, ?). Cuadrante F-20, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto, (x 2).
- 9.- *Pallacera uncinata* (Say, 1826) forma *guadalupensis* (Petit 1852). Cuadrante E-20, vista ventral de un ejemplar adulto (x 2).
- 10.- *Pleuroliria* (*Polystira*) *albida* (Perry, 1811). Cuadrante D-22, vista dorsal de un ejemplar senil pero viviente, con epibiontos variados, como Serpulidos, Briozoarios y esponjas, (x 1).
- 11, 24, 25.- *Prunum* (*Prunum*) *circumvittatum* (Weisbord, 1962). Cuadrante A-21, vista dorsal mostrando detalles de la callosidad (11, x 2,6). Vistas ventral y dorsal de un ejemplar adulto (24, 25 x 1).
- 12.- *Prunum* (*Prunum*) *prunum* (Gmelin, 1791). Cuadrante F-20, vista ventral de un adulto (x 1,5).
- 13.- *Prunum* (*Prunum*) *marginatum* (Born, 1778). Cuadrante F-20, vista ventral de un ejemplar adulto, (x 1,6).
- 14.- *Conus* (*Leptoconus*) *stimpsoni* Dall, 1902. Cuadrante B-21, vista dorsal del mismo ejemplar de la lamina 5, fig. 12.
- 15.- *Acanthina* (*Acanthina*) cf. *A. (A.) angelica* l. Oldroyd, 1918. Cuadrante F-17, vista ventral de un ejemplar adulto, mostrando el denticulo característico a un lado del canal sifonal, (x 1,5).
- 16.- *Volvarina lactea* (Klener, 1841). Cuadrante F-18, vista ventral de un ejemplar adulto, (x 4).
- 17.- *Persicula muralis* (Hinds, 1844). Cuadrante F-19, vista dorsal de un ejemplar adulto, (x 3).
- 18.- *Crassispira* (*Hidsiclava*) *chazaliei* (Dautzenberg, 1900). Cuadrante D-21, vista dorsal de un ejemplar adulto, (x 2,5).
- 19, 22.- *Crepidula* (*Crepidula*) *convexa* Say, 1822. Cuadrante G-22, vistas ventrales de cuatro individuos adultos, para mostrar variabilidad. Figuras 19 al 21, (x 1,5), la 22 es (x 1).
- 23.- *Cymatium* (*Linatella*) *poulsenii* (Mörch, 1877). Cuadrante F-17, vista dorsal de un ejemplar juvenil, (x 1,5).
- 26.- *Crucibulum* (*Disputaea*) *striatum* (Say, 1826), Cuadrante E-16, vista dorsal de un ejemplar adulto, (x 1,5).
- 27.- *Nitidella nitida* (Lamarck, 1822). Cuadrante E-20, vista ventral de un ejemplar juvenil (x 1,5).
- 28, 29.- *Dentalium* (*Laevidentalium*) cf. *D. (L.) ceratum* Dall, 1881. Cuadrante E-22, vistas laterales de dos ejemplares adultos, mostrando variabilidad en curvatura, dentro de una población de 28, obtenidos dentro de limo, por dragado.



L A M I N A 12

Figuras


- 1,2.- **Modulus modulus** (Linné, 1758). Cuadrante F-17, vistas dorsal y ventral-lateral de un ejemplar adulto (x 1).
- 3.- **Tectarius (Cenchritis) muricatus** (Linné, 1758). Cuadrante F-20, vista ventral-lateral de un ejemplar adulto (x 1).
- 4.- **Cymatium (Cabestana) labiosum** Wood, 1828. Cuadrante A-20, vista ventral de un ejemplar no completamente adulto (x 1).
- 5.- **Cymatium (Cymatium) femorale** (Linné, 1758). Cuadrante B-24, vista ventral de un ejemplar adulto (x 0,6).
- 6.- **Thais (Mancinella) deltoidea** (Lamarck, 1822). Cuadrante B-24, vista ventral de un ejemplar adulto, completamente cubierto de algas calcáreas incrustantes y varios juveniles de **Ostrea (Ostrea) spreta** d'Orb., (x 1).
- 7.- **Nassarius (Phrontis) polygonatus** (Lamarck, 1822). Cuadrante F-18, vista dorsal de un ejemplar adulto (x 1).
- 8,10.- **Cerithium (Theridium) litteratum** (Born, 1778). Cuadrante F-19, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto, (x 0,8).
- 9.- **Cantharus (Pollia) auritulus** (Link, 1807). Cuadrante D-17, vista ventral de un ejemplar adulto, (x 1,7).
- 11.- **Dendropoma (Novostoa) irregulare** (d'Orbigny, 1842). Cuadrante D-19, vista parcial de una colonia, (x 0,8).
- 12,14.- **Melongena (Melongena) melongena** (Linné, 1758). Cuadrante F-20, vistas ventrales de dos etapas de juventud de la especie (x 1).
- 13,18,20.- **Mitra (Scabricola) nodulosa** (Gmelin, 1791). Cuadrante E-17, mostrando la variabilidad de la especie dentro de un lote capturado por buceo autónomo (x 1). Vistas ventrales (13,18) y vista dorsal (20).
- 15.- **Epitonium (Gyroscala) lamellosum** (Lamarck, 1822). Cuadrante G-17, ejemplar adulto en vista ventral; es frecuente la presencia de briozoarios como epibiontos (x 1,5).
- 16.- **Coralliophila abbreviata** (Lamarck, 1816). Cuadrante B-24, vista ventral de un ejemplar juvenil.
- 17.- **Strombus (Eustrombus) gigas** Linné, 1758. Cuadrante F-21, vista ventral de un ejemplar adulto, intensamente biohoradado en toda la superficie no callosa, (x 0,3). Entre sus epibiontos se hallan **Chama** sp., **Serpula** sp., **Clione** sp., y algas calcáreas incrustantes.
- 19.- **Strombus (Strombus) pugilis pugilis** Linné, 1758. Cuadrante C-19, vista ventral de un ejemplar adulto (x 0,8).
- 21.- **Coralliophila aberrans** (C. B. Adams, 1850). Cuadrante A-16, vista ventral de un ejemplar adulto (x 1,5).
- 22.- **Nodilittorina** cf. **N. tuberculata** (Menke, 1828). Cuadrante G-17, vista ventral de un ejemplar adulto, (x 1).
- 23.- **Coralliophila caribaea** Abbott, 1958. Cuadrante F-18, vista ventral de un ejemplar adulto (x 0,8).
- 24.- **Vasum (Vasum) capitellum** (Linné, 1758). Cuadrante B-24, vista ventral de un ejemplar adulto, ocupado por un pagúrido, (x 1).
- 25,26.- **Crepidula (Crepidula) cf. C. (C.) rostrata** C. B. Adams, 1852. Cuadrante F-22, vista dorsal y ventral de un ejemplar bien preservado, cuyo extremo distal se partió durante el proceso fotográfico, (x 1,2).
- 27.- **Nerita (Thelostyla) fulgurans** Gmelin, 1791. Cuadrante G-17, vista dorsal de un ejemplar adulto, (x 1).
- 28.- **Oliva (Oliva) sayana** Ravenel, 1834. Cuadrante B-21, vista dorsal de un ejemplar adulto, (x 1).
- 29.- **Conus (Leptoconus?) capricorni** Van Mol, Tursch & Kemp, 1967. Cuadrante C-18, vista dorsal de un ejemplar adulto (x 1).
- 30.- **Turritella (Broderiptella) malquetiana** Weisbord, 1962. Cuadrante C-20, vista dorsal de las últimas tres vueltas de un ejemplar adulto. Fósil Pleistoceno que se halla con frecuencia en los arrastres, (x 1).
- 31.- **Cymatium (Septa) pileare** (Linné, 1758). Cuadrante D-19, vista ventral de un ejemplar adulto, (x 0,7).
- 32.- **Pisania pusio** (Linné, 1758). Cuadrante D-19, vista ventral de un ejemplar adulto (x 1).



L A M I N A 13

Figuras


- 1.- **Planaxis nucleus** (bruguiere, 1798). Cuadrante E-20, vista ventral, (x 1), de un ejemplar adulto.
- 2.- **Turbo (Marmarostoma) castanea** Gmelin, 1791. Cuadrante F-18, vista ventral de un ejemplar adulto (x 0,8).
- 3-A, B, C.- **Batillaria minima** Gmelin, 1791). Cuadrante E-18-N, vistas dorsal y lateral de ejemplares adultos (x 1).
- 4, 7.- **Cymatium (Ranularia) caribbaeus** Clench & Turner, 1957. Cuadrante C-20, vistas ventral y dorsal de un ejemplar adulto, (x 1).
- 5.- **Bursa (Colubrellina) granularis cubaniana** (d'Orbigny, 1842). Cuadrante B-24,
- 6, 11.- **Siphonaria (Pachysiphonaria) cf. S. (P.) lineolata** (d'Orbigny, 1842). Cuadrante FF-17, vistas dorsal y ventral de un ejemplar adulto, (x 0,8).
- 8.- **Diodora minuta** (Lamarck, 1822). Cuadrante G-17, vista dorsal, de un ejemplar adulto, (x 1).
- 9, 10.- **Astela (Leiotrochus) hassler** (Clench & Aguayo, 1939). San Juan de los Galdona (SU) a 43 km al este de Carúpano, vistas lateral y ventral, (x 1).
- 12.- **Tonna galea abbotti**, sp. n., cuadrante E-21, vista ventral del Holotipo de la subespecie nueva.
- 13.- **Persicula interruptolineata** (von Mühlfeld, 1818). Cuadrante C-19, vista ventral de un ejemplar adulto, (x 2).
- 14.- **Chicoreus (Chicoreus) brevifrons** (Lamarck, 1822). Cuadrante C-21, vista dorsal de un ejemplar adulto (x 0,8).
- 15, 17.- **Morum (Cancellomorum) dennisoni** (Reeve, 1842). Cuadrante A-21, vistas ventral y dorsal de un ejemplar juvenil (x 1).
- 16.- **Natica (Naticarius) canrena** (Linné, 1758). Cuadrante E-22, vista ventral de un ejemplar adulto, (x 0,6).
- 18.- **Turritella (Broderipitella) gonostoma** Valenciennes, 1832. Cuadrante B-21, vista dorsal de un ejemplar adulto (x 0,9).
- 19, 21.- **Strombus (Tricornia) magoleccia** sp. n., cuadrante G-17, vistas dorsal y ventral del Holotipo; (19: 0,95; 21: 0,73).
- 20, 22.- **Thais (Stramonita) cruentata** (Gmelin, 1791). Cuadrante D-18, vistas ventral y dorsal de un ejemplar adulto (x 0,8). En la fig. 22 se observa biohoradación de *Polydora* sp.
- 23.- **Fasciolaria hollisteri** Weisbord, 1962. Cuadrante D-23, vista ventral de un ejemplar adulto (x 0,6).



LAMINA 14

Figuras


- 1, 2, 5, 6.- *Arca (Arca) zebra* (Swainson, 1831). Cuadrante E-21, vistas externa e interna de las valvas derecha (1, 2) e izquierda (5, 6) de un ejemplar adulto, que sustentaba una colonia de *Cladocora arbuscula* (Lesueur) como epibionto, ambas vivientes en el momento de la captura (x 1).
- 3, 4, 7, 11.- *Argopecten imitatus*, sp. n., cuadrante F-20, vistas externas del Holotipo, la valva izquierda (7), la valva derecha (11), vista posterior de ambas valvas (3), vista anterior de ambas valvas (4).
- 8, 10.- *Scallina mitchelli* (Dall, 1896). Cuadrante A-21, vista ventral y dorsal de un ejemplar adulto (x 1,2). -
- 9, 16.- *Crucibulum (Disputaea) waltonense* Gardner, 1947, vista dorsal y ventral de un ejemplar adulto (x 1).
- 12, 13, 19, 20.- *Pitar (Pitar) bermudezi* sp. n., cuadrante C-21, vistas interna y externa de la valva izquierda (12, 13) y las correspondientes de la valva derecha (19, 20) del Holotipo.
- 14, 18.- *Cyphoma roamoraesi* sp. n., cuadrante C-20, vista dorsal y ventral de un ejemplar adulto, (x 1), el Holotipo.
- 15, 17.- *Cyphoma roamoraesi* sp. n., cuadrante C-19, vista dorsal y ventral de un ejemplar juvenil (x 2).



LAMINA 15

Figuras







- 1, 4, 8.- *Scapharca (Scapharca) crassissima* sp. n., cuadrante D-21, vista interna y externa de la valva derecha del Holotipo ($\times 1,1$), y la valva derecha del Paratipo, en vista externa ($\times 1$). Ver lamina 16, figs. 2, 5.
- 2, 3, 9.- *Scapharca (Cunearca) chemnitzii* (Philippi, 1851). Cuadrante D-19, vista interna de valva derecha (2), vista interna y externa de valva izquierda (3, 9), ($\times 1$).
- 5, 10.- *Arcinella arcinella* (Linné, 1767). Cuadrante C-20, vista externa de las valvas izquierdas (5) y derecha (10) de un ejemplar adulto ($\times 0,5$).
- 6, 7.- *Chione (Lirophora) paphia* (Linné, 1767). Cuadrante C-21, vistas externa e interna de una valva izquierda, fósil de edad Pleistoceno Superior.



LAMINA 16

Figuras


- 1, 8.- **Clausinella cf. C. gayi** (Hupé, 1854). Cuadrante G-17, vista externa e interna de una valva derecha (x1).
- 2, 5.- **Scapharca (Scapharca) crassissima** sp. n., cuadrante D-21, vista interna y externa de la valva izquierda del Holotipo, (x1,1). Ver lamina 15 por la otra valva.
- 4, 6, 7.- **Pteria attilatomasi** sp. n., cuadrante C-20, vista interna y externa de la valva derecha (6, 7) y la externa de la valva izquierda (4) del Holotipo. Epibiontos de serpulidos y balanidos juveniles son frecuentes. Véase lamina 31, fig. 25.
- 3.- **Saccella jamaicensis** (d'Orbigny, 1845). Cuadrante G-17, vista interna de una valva izquierda adulta (x).
- 9.- **Scapharca (Scapharca) cf. S. (S.) baughmani** (Hertlein, 1951). Cuadrante F-20, vista externa de una valva izquierda, en la cual los epibiontos consisten en balanidos y algunos *Spirorbis* sp., todos vivientes en el momento de la pesca, (x1,2).



LAMINA 17

Figuras


- 1-4.- **Scapharca (Scapharca) lienosa floridaña** (Conrad, 1869). Cuadrante F-18, vistas externa e interna de una valva izquierda (1, 3) y de la correspondiente valva derecha (2, 4). (x0,8).
- 5-8.- **Eucrassatella (Hybolophus) antillarum montserratensis** (Maury, 1925). Cuadrante F-20, vistas externa e interna de la valva derecha (5, 7), y de la valva izquierda (6, 8) de un ejemplar hallado muerto, pero de valvas unidas aún por el ligamento. (x0,9).
- 9, 10.- **Nucula (Ielonucula) dalmasi** Dautzenberg, 1900. Cuadrante C-18, vista interna y externa de una valva izquierda (x2).
- 11.- **Saccella jamaicensis** (d'Orbigny, 1845). Cuadrante G-17, vista externa de la valva de lamina 16, fig. 3, (x3).



LAMINA 18

Figuras


- 1,2.- **Scapharca (Scapharca) llenosa** (Say, 1832). Cuadrante E-18-S, vista interna y externa de una valva derecha (x 1).
- 3-6.- **Glycymeris cf. G. tessellata** (Sowerby, 1833). Cuadrante F-18, vistas interna y externa de la valva izquierda (3, 5) y de la valva derecha (4, 6) correspondientes (x 2).
- 7, 8, 10, 14.- **Entodesma (Agriodesma) welsbordi** sp. n., cuadrante F-22, vistas interna y externa de la valva derecha (7, 14), y de la valva izquierda (8, 10), articuladas, (x 1,6).
- 9, 11, 13, 15.- **Modiolus cf. M. squamosum** (Beauperthuy, 1967). Cuadrante F-20, vistas internas y externas de la valva izquierda (9, 11) y derecha (13, 15) correspondientes (x 1).
- 12, 16.- **Glycymeris (Glycymeris) cf. G. (G.) maculata** (Broderip, 1832). Cuadrante F-19, vista externa e interna de una valva derecha (x 1,25). Véase lamina 19, figs. 18, 20.



LAMINA 19

Figuras


- 1, 3.- **Pterla colymbus** (Röding, 1758). Cuadrante F-17, vista interna de la valva derecha (1) y de la izquierda (3), de un ejemplar adulto (x 1).
- 2.- **Chione (Chione) cancellata** (Linné, 1767). Cuadrante E-21, vista externa de la valva izquierda aún articulada, de un ejemplar juvenil (x 2). Ver lamina 22, figs. 7, 10, 13;
- 4-7.- **Isognomon vulsella** (Lamarck, 1818). Cuadrante G-22, vistas externa e interna de valvas derecha (4, 5) e izquierda (6, 7) cuyo periostraco ha sido completamente removido (x 1).
- 8-17.- **Cochlodesma (C.) cf. C. (C.) leanum** (Conrad, 1831). Cuadrante G-19, vistas internas y externas de varias valvas izquierdas (8, 13, 16, 17) y derecha (14, 15), mostrando el grado de variabilidad de la especie, procedente de una misma muestra.
- 18, 20.- **Glycymeris (Glycymeris) cf. G. (G.) maculata** (Broderip, 1832). Cuadrante F-19, vista externa e interna de la valva izquierda correspondiente a la de la lamina 18, figs. 12, 16. (x 1,25).
- 19.- **Anomalocardia cuneimeris** (Conrad, 1846). Cuadrante G-17, vista externa de valva izquierda (x 2,5), de un ejemplar adulto.
- 21.- **Corbula (Juliacorbula) aequivallis** Philippi, 1836. Cuadrante E-17, vista interna de valva derecha de ejemplar adulto (x 2).



L A M I N A 20

Figuras

- 1, 6.- **Modiolus americanus** (Leach, 1815). Cuadrante F-20, vistas externas de valva derecha (1) e izquierda (6) de un ejemplar adulto (x 1). Los opibiontos consisten en **Serpula** sp., y balanidos.
- 2 - 5.- **Amusium laurenti** (Gmelin, 1791). Cuadrante D-18, vistas interna y externa de una valva derecha (2, 3) e izquierda (4, 5) de un ejemplar adulto (x 1).
- 7, 8.- **Chama sarda** Reave, 1847. Cuadrante F-20, vista interna de valvas derecha e izquierda articuladas, adulta (x 1).




L A M I N A 21


Figuras

- 1-6.- **Modiolus americanus** (Leach, 1815). Cuadrante F-20, vista interna de la valva izquierda (1) y derecha (6) del mismo ejemplar adulto de la lamina 20, figs. 1, 6.
- 2-5.- **Amusium laurenti** (Gmelin, 1791). Cuadrante B-21, vistas interna y externa de la valva derecha (2, 3) e izquierda (4, 5) de un ejemplar adulto, (x 1,2).
- 7.- **Pododesmus (Pododesmus) rudis** (Broderip, 1834). Cuadrante F-20, vista interna de valva derecha de un ejemplar adulto, (x 1).


21




1




3



2




5



4




6



LAMINA 22

Figuras


- 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12.- *Scapharca (Cunearca) axeloissoni* sp. n. Cuadrante E-18-N, vistas externa e interna de la valva izquierda (1, 4) y de la valva derecha (2, 5) del Holotipo (x 1,2). Vistas externa e interna de la valva izquierda (8, 11) y de la valva derecha (9, 12) del Paratipo (x 1,2).
- 3, 6.- *Isognomon vulselloides* sp. n., Cuadrante F-19, vistas internas de la valva izquierda (3) y derecha (6) del Holotipo (x 2).
- 7, 10, 13.- *Chione (Chione) cancellata* (Linné, 1767). Cuadrante G-20, vistas axial (7) y lateral de una valva derecha (10) y una, izquierda (13) (x 1) no correspondientes.
- 14.- *Ostrea (Ostrea) spreta* d'Orbigny, 1845. Cuadrante D-20, vista interna de una valva izquierda adulta (x 0,8).



LAMINA 23

Figuras


- 1, 3-5.- **Pecten (Euvola) amusoides** sp. n., cuadrante B-20, vistas externa e interna de la valva izquierda (1, 4) de la valva derecha (3, 5) del Holotipo, (x1).
- 2, 7, 11, 12.- **Ostrea (Ostrea) puelchana** (D'Orbigny, 1842). Cuadrante E-20, vistas externa e interna de la valva izquierda (2, 12) y de la valva derecha (7, 11) de un ejemplar adulto.
- 6, 8, 9.- **Modiolus (Modiolus) ficoides** sp. n., cuadrante F-20, vistas externa e interna de la valva izquierda, y la externa de la derecha (6) (x1). Como epibiontos, presenta algas calcáreas incrustantes y serpulidos pequeños.
- 10, 13.- **Eucrassatella (Hybolophus) antillarum** (Reeve, 1842). Cuadrante E-21, vista interna de la valva derecha (13) y de la izquierda (10) (x1).



LAMINA 24

Figuras


- 1-4.- **Perna perna** (Linné, 1758). Cuadrante F-20, vista externa e interna de la valva derecha (1, 2) y de la izquierda (3, 4) de un ejemplar juvenil (x 1).
- 5.- **Corbula** (**Notocorbula**) **disparilis** d'Orbigny, 1842. Cuadrante F-17, vista externa de una valva derecha (x 2,5).
- 6, 7.- **Aequipecten muscosus** (Wood, 1828). Cuadrante D-21, vista externa de valva derecha (6) e izquierda (7) de un ejemplar adulto (x 2,5).
- 8.- **Tellina** sp. indet. Cuadrante E-24, vista interna de una valva derecha, supuestamente adulta (x 2).
- 9.- **Pitar** (**Lamelliconcha**) **circinata** (Born, 1780). Cuadrante G-17, vista externa de una valva izquierda (x 1).
- 10.- **Tellina** (**Angulus**) **camacho** sp. n., cuadrante C-18, vista externa de una valva izquierda adulta (x 2) del Holotipo.
- 11, 13.- **Tellina** (**Merisca**) **juttingae** (Altena, 1956). Cuadrante G-22, vista interna y externa (11, 13) de una valva izquierda adulta (x 1).
- 12.- **Tellina** (**Eurytellina**) **alternata** Say, 1822. Cuadrante F-17, vista externa de una valva derecha (x 1,2).
- 14.- **Arcopagia** (**Johnsonella**) **fausta** (Pulteney, 1799). Cuadrante F-18, vista externa de una valva izquierda adulta (x 1).



LAMINA 25

Figuras


- 1-4.- **Isognomon vulsellia** (Lamarck, 1818). Cuadrante E-20, vista externa e interna de valvas derecha (1,2) e izquierda (3,4) de un ejemplar juvenil (x1).
- 5-8.- **Carditamera (Carditamera) gracilis** (Shuttleworth, 1856). Cuadrante F-20, vistas interna y externa de una valva izquierda (5,7), y derecha (6,8) correspondientes (x1).
- 9, 14 - 16.- **Pecten (Euvola) ziczag caboblanquensis** Druckerman en Weisbord, 1964. Cuadrante E-21, vista externa e interna de una valva derecha (9, 14) y de la izquierda (15, 16) correspondiente (x0,6).
- 10, 13.- **Pterla hirundo** (Linné, 1758). Cuadrante C-20, vistas interna y externa de una valva izquierda (10, 11), y de la valva derecha (12, 13) correspondiente (x1,2).
- 18, 21, 22, 25.- **Laevicardium laevigatum** (Linné, 1758). Cuadrante C-20, vistas externa e interna de una valva derecha (18, 22) y de la valva izquierda (21, 25) correspondiente (x1).
- 19.- **Corbula (Caryocorbula) contracta** Say, 1822. Cuadrante F-17, vista externa de la valva izquierda (x2,5).
- 20, 23.- **Cyclinella tenuis** (Récluz, 1852a). Cuadrante C-21, vistas externa e interna de una valva izquierda (x1).
- 24, 26.- **Chione (Lirophora) riomaturensis** Maury, 1925. Cuadrante C-18, vista interna y externa de una valva derecha (x0,8).



LAMINA 26

Figuras


- 1, 3, 5, 8.- *Lopha* (?) *gibsonsmithi* sp. n., Cuadrante C-21, vistas externa e interna de la valva derecha (1, 8) y de la izquierda (3, 5) del Holotipo (x 1).
- 2, 4.- *Plicatula gibbosa* Lamarck, 1801. Cuadrante F-20, vista interna de una valva derecha, con pliegues numerosos en margen distal (2), y vista interna e externa de un ejemplar juvenil, libre, con pocas costillas radiales (x 1,5).
- 6, 15.- *Lopha frons* (Linné, 1758). Cuadrante D-18, vista externa de una valva derecha (6) e interna de una izquierda (15), mostrando la variabilidad de la ornamentación de plicaciones comisurales, (x 1).
- 7, 12.- *Ostrea* (*Ostrea*) *libella* Weisbord, 1964. Cuadrante F-19, vistas interna y externa de una valva izquierda, (x 1), exhibiendo epibiontos de sus propios juveniles y serpulidos pequeños.
- 9.- *Ostrea* (*Ostrea*) *cristata* Born, 1778. Cuadrante D-17, vista externa de una valva izquierda (x 1,2).
- 10, 11, 13, 14.- *Ostrea* (*Ostrea*) *lixula* Weisbord, 1964. Cuadrante E-21, vistas interna y externa de la valva derecha (10, y de la izquierda (11, 14) de un ejemplar adulto, articulado (x 1). C = catachomata y A = anachomata. Los epibiontos consisten en juveniles de la especie, balanidos y briozoarios.



LAMINA 27

Figuras


- 1.- **Chione (Chione) pallasana constricta** Macsotay, 1968-a. Cuadrante F-19, vista externa de valva izquierda (x 1.5).
- 2-5.- **Chlamys (Chlamys) benedicti** Verrill & Bush, 1891. Cuadrante C-20, vista externa e interna de la valva izquierda (2,4) y de la derecha (3,5) de un ejemplar adulto (x 1).
- 6.- **Protothaca (Leukoma) granulata** (Gmelin, 1791). Cuadrante G-18-S, vista externa de la valva derecha, (x 2).
- 7,8.- **Papyridea hiatus** (Meuschen, 1787). Cuadrante F-17, vista externa de las valvas izquierda y derecha de un ejemplar adulto (x 1).
- 9.- **Chione (Chione) mazyckii** Dall, 1902-b. Cuadrante G-17, vista externa de una valva derecha adulta (x 2).
- 10,11.- **Scapharca (Scapharca) notabilis** (Röding, 1798). Cuadrante F-18, vista externa de una valva derecha (10) y vistas externa e interna de una valva izquierda (11) (x 0,8).
- 12.- **Mactrellona cf. M. lheringi** (Dall, 1897). Cuadrante F-17, vista interna de una valva izquierda adulta (x 1).
- 13.- **Tagelus (Tagelus) plebeius** (Solander, 1786). Cuadrante F-17, vista interna de una valva derecha (x 1,2).
- 14, 15, 17, 20.- **Petricola (Rupellaria) inversa** sp. n., cuadrante G-22, vista interna y externa de la valva derecha (14,15) e izquierda (17,20) del Holotipo (x 1).
- 16, 18, 19, 22.- **Petricola (Rupellaria) typica** (Jonas, 1844). Cuadrante F-20, vistas externa e interna de la valva izquierda (16,19) y de la valva derecha (18,22) (x 1). Los senos paleales se han invertido, por error.
- 21.- **Trachycardium (Trachycardium) isocardia** (Linné, 1758). Cuadrante F-20, vista externa de una valva derecha (x 1).
- 23,24.- **Glyptoactis (Glyptoactis) cf. G. (G.) wendellwoodringi** (Weisbord, 1964). Cuadrante D-19, vista externa e interna de una valva izquierda (x 1).
- 25.- **Mulinia** sp. indet. Cuadrante F-20, vista interna de una valva derecha.



L A M I N A 28

Figuras


- 1.- **Lima** cf. **L. lima** (Linné 1758). Cuadrante D-16, vista externa de una valva derecha (x 1,5).
- 2.- **Macoma** (**Psammacoma**) cf. **M. (P.) tagelifornis** Dall, 1900. Cuadrante F-20, vista externa de una valva derecha (x 1).
- 3.- **Ctenoides scabra scabra** (Born, 1870). Cuadrante F-18, vista interna de una valva izquierda (x 1,5).
- 4, 5.- **Acesta** cf. **A. bullisi** (H. E. Vokes, 1970). Obtenido por dragado del talud meridional de La Blanquilla (DF), vista externa e interna de una valva izquierda (x 1).
- 6, 10.- **Semele proficua** (Pulteney, 1799). Cuadrante G-17, vista externa de valvas derecha e izquierda, (x 1,1).
- 7, 11, 12.- **Cyathodonta magnifica** (Jonas, 1850). Cuadrante G-18, vista interna y externa de la valva izquierda (7, 12) y la vista externa de la derecha (x 1).
- 8.- **Tellina** (**Merisca**) **crystallina** Spengler, 1798. Cuadrante G-18, vista externa de la valva izquierda (x 2).
- 9.- **Tellina** (**Scissula**) **similis** Sowerby, 1806. Cuadrante G-18, vista externa de una valva derecha, (x 2,5).



LAMINA 29

Figuras


- 1, 7.- **Spondylus americanus** Hermann, 1781. Cuadrante F-20, vista externa de una valva derecha, e interna de una izquierda, correspondiente, (x0,5).
- 2, 6, 8.- **Ventricolaria rigida** (Dillwyn, 1817). Cuadrante E-18-S, vista interna de una valva izquierda (2) y vista externa e interna de una valva derecha (6, 8), (x0,5).
- 3, 15.- **Chama macerophylla** Gmelin, 1791. Cuadrante F-20, vista interna de valva izquierda (3), y externa de la derecha (15). (x0,5).
- 4, 5.- **Trachycardium (Dallocardia) muricatum** (Linné, 1758). Cuadrante E-21, vista externa e interna de una valva derecha (x0,5).
- 9, 13.- **Codakia (Codakia) orbicularis** (Linné, 1758). Cuadrante F-18, vista externa de valva izquierda (9) y derecha (13) (0,5).
- 10.- **Plicatula gibbosa** (Lamarck, 1801), Cuadrante D-21, vista externa de valva izquierda, biohoradado e incrustado de balanidos. (x1).
- 11.- **Plicatula cf. P. penicillata** Carpenter, 1856. Cuadrante G-22, vista externa de la valva izquierda (x1).
- 12.- **Pinctada imbricata** Röding, 1798. Cuadrante F-19, vista interna de la valva derecha (x0,7).
- 14.- **Trachycardium (Trachycardium) iscardia** (Linné, 1758). Cuadrante C-20, vista posterior de las valvas articuladas (0,6).
- 16- 18.- **Solena (Solena) obliqua** (Spengler, 1794). Cuadrante E-16, aspecto interno y externo de una valva izquierda (16, 17); extremo hialte posterior de las valvas articuladas (18), (x1).
- 19.- **Chama congregata** Conrad, 1833. Cuadrante G-17, vista externa de valva izquierda, adherida a un fragmento de Arca (Arca) zebra (S.).



L A M I N A 30

Figuras


- 1,2.- *Argopecten gibbus* (Linné, 1758). Cuadrante F-19, vista externa e interna de una valva derecha de edad Pleistocena, incrustado por poliquetos vivientes (x 1).
- 3,4,5.- *Argopecten* cf. *A. noronhensis* (E. A. Smith, 1885). Cuadrante B-24, vistas externas (3, 4) e interna (5) de valvas izquierdas. (x 1).
- 6,7.- *Transennella culebrana* (Dall & Simpson, 1901). Cuadrante G-17, vista externa e interna de una valva derecha (x 2).
- 8,9.- *Papyridea hiatus* (Meuschen, 1787). Cuadrante F-19, vista externa e interna de una valva izquierda juvenil (x 1,5).
- 10,11.- *Periploma compressa* d'Orbigny, 1846, Cuadrante G-22, vista externa e interna de una valva izquierda, (x 1).
- 12.- *Protothaca (leukoma) intapurplea* (Conrad, 1849). Cuadrante F-17, vista interna de valva derecha, (x 1).
- 13.- *Amusium* cf. *A. glyptus* (Verrill, 1882). Cuadrante B-24, vista interna de una valva izquierda adulta (x 4).



LAMINA 31

Figuras


- 1,4.- **Nodipecten nodosus** (Linné, 1758). Cuadrante D-17, vista externa e interna de una valva izquierda con los nodulos característicos (x0,7). Epibiontos frecuentes.
- 2,3.- **Anomalocardia brasiliana** (Gmelin, 1791). Cuadrante G-21, vista externa de valva izquierda y derecha de un ejemplar adulto (x1).
- 5,6,7,9.- **Pitar (Pitar) albida** (Gmelin, 1791). Cuadrante F-20, vistas interna y externa de la valva derecha (6, 7) y la izquierda (5, 9) de un ejemplar adulto
- 8.- **Parvilucina ephraimi** (Weisbord, 1964). Cuadrante D-21, vista interior de la valva derecha (x4).
- 10, 11, 15, 16.- **Clausinella cf. C. fasciata** (Da Costa, 1778). Cuadrante G-18-N, vistas externa e interna de una valva derecha (10, 11) y de una izquierda (15, 16) no correspondientes (x0,8).
- 12, 14.- **Mulinia cleryana** (d'Orbigny, 1835). Cuadrante F-20, vista externa e interna de una valva izquierda (x0,8).
- 13.- **Trigoniocardia antillarum** (d'Orbigny, 1842). Cuadrante D-21, vista externa de una valva derecha (x2).
- 17, 18.- **Lucina (Lucina) pectinata** (Gmelin, 1791). Cuadrante F-20, vistas externa e interna de una valva derecha, de un ejemplar adulto (x1,2).
- 19, 20.- **Tivela mactroides** (Born, 1778). Cuadrante G-17, vista interna y externa de una valva izquierda (x0,6).
- 21, 22, 24.- **Spondylus ictericus** Reeve, 1856. Cuadrante F-19, vistas externas de la valva izquierda (21), derecha (22) ambas valvas articuladas, en vista posterior (x0,7).
- 23.- **Heterodonax bimaculatus** (Linné, 1758). Cuadrante G-18-N, vista externa de valva derecha (x2).
- 25.- **Pteria attilatomasi** sp. n., cuadrante C-20, vista interna de la valva izquierda, del Holotipo. (x1). Ver: lamina 16, figs. 4, 6, 7.



LAMINA 32

Figuras

- 1, 2.- **Semipallium antillarum** (Recluz, 1853). Cuadrante G-17, vista externa de la valva izquierda y de la derecha de ejemplares adultos (x 2,5).
- 3, 4, 7, 8.- **Chlone (Chlone) subrostrata** (Lamarck, 1818). Cuadrante F-20, vistas externas de las valvas derecha e izquierda (3, 4) vistas dorsales del coselete (7) y la lunula de ejemplares articulados, (x 1).
- 5.- **Tellina (Eurytellina) nitens** C. B. Adams, 1853. Cuadrante G-17, valva izquierda de un ejemplar adulto (x 1,5).
- 6.- **Transennella caboblanquensis** Weisbord, 1964, cuadrante A-20, vista interna de la valva derecha (x 3).
- 9.- **Adrana tellinoides** (Sowerby, 1823). Cuadrante G-18-N, vista interna de la valva izquierda (x 2).
- 10, 15.- **Agriopoma aresta** (Dall & Simpson, 1901). Cuadrante F-20, vista interna de la valva izquierda (10) y derecha (15) de un ejemplar adulto (x 1).
- 11, 13.- **Isognomon obliqua** (Lamarck, 1818). Cuadrante G-18-N, vista interna de las valvas izquierda (11) y derecha (13) de un ejemplar adulto (x 2).
- 12, 14.- **Anomia simplex** d'Orbigny, 1842. Cuadrante C-20, vista externa de dos valvas derechas de ejemplares adultos, con la escultura radial característica (x 0,7). El ejemplar de la fig. 12, posee juveniles de la misma especie como epibiontos - valvas izquierdas - y biohoradación de naticido.



REFERENCIAS CITADAS

- ABBOTT, R.T.** 1944. The genus *Modulus* in the Western Atlantic. *Johnsonia* 1 (14), p. 1-6.
- ABBOTT, R.T.** 1950. The genera *Xancus* and *Vasum* in the Western Atlantic. *Johnsonia* 2 (28), p. 201-219.
- ABBOTT, R.T.** 1954. American Seashells. Primera edición, D. van Nostrand Company, Inc. New York. XXVI + 541 pp.
- ABBOTT, R.T.** The marine mollusks of Grand Cayman Island, British West Indies. *Acad. Nat. Sci., Philadelphia, Monographs*, no. 11, 64 pp.
- ALMEIDA, P. P.** 1974. Distribución de los moluscos de la costa centrooccidental (Patanemo-Punta Tucacas) de Venezuela: comparación de los habitats litorales. *Mem. Soc. Cienc. La Salle*, 34(97) 24-52.
- ALTENA, C. O. van REGTEREN**, 1969. The marine mollusca of Suriname (Dutch Guiana) Holocene and Recent. Pt. 1. General introduction. *Zool. Verh.*, 101: 1-49;
- ALTENA, C.D. van REGTEREN**. 1971b. The marine mollusca of Suriname (Dutch Guiana) Holocene and Recent. Pt. II, Bivalvia and Scaphopoda. *Zool. Verh.*, 119, 1-100 p.
- ALTENA, C.D. van REGTEREN**. 1975. *Ibid.*, pt. III, Gastropoda and Cephelopoda. *Zool. Verh.*, 139, 1-104 pp.
- ANDREWS, J.** 1971. Sea shells of the Texas coast. University of Texas Press, Austin. 295 pp.
- ARMAS, A., M. LLANO & P. I. GUEVARA**. 1991. Sedimentos superficiales y micromoluscos bentónicos de la Bahía de Garantón, Isla La Blanquilla, Venezuela. *Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle*, 135-136, 73-85.
- BANDEL, K.** 1974B. Studies on Littorinidae from the Atlantic. *Veliger*, 17 (2): 92-114.
- BANDEL, K. & D. KADOLSKY**. 1982. Western Atlantic species of *Nodilittorina*, (Gastropoda: Prosobranchia): comparative morphology and its functional, ecological, phylogenetic and taxonomical implications. *Veliger*, 25(1): 1-42.
- BARATTINI, L. P., & E. H. URETA**. 1960. La fauna de las costas Uruguayas del Este. 208 pp., Montevideo.
- BARRIOS, M.** 1960. Algunos moluscos del Terciario Medio de Colombia. *Bol. Geológico*, 6(1-3): 213-306.
- BAYER, F. M.** 1971. New and unusual mollusks collected by R/V John Elliot and R/V Gerda, in Tropical Western Atlantic. *Bull. Mar. Sci.* 21 (1): 111-236.
- BAYER, F. M., G. L. VOSS & C. R. ROBINS**. 1970. Report on the marine fauna and benthic shelf-slope communities of the Isthmian Region. Bioenvironmental and radiological safety feasibility studies Atlantic-Pacific interoceanic canal. Univ. of Miami (Fla.) Processed Report.
- BEAUPERTHUY, I.** 1967. Los mitílidos de Venezuela (Mollusca: Bivalvia). *Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente*, 6(1): 7-115.
- BONILLA RUIZ, J.** 1969. Notas sobre los aspectos biológicos de las ostras. *Lagena*, nos. 23-24; 48-68.

- BOSS, K. J.** 1966. The subfamily Tellininae in the Western Atlantic. The genus *Tellina*. (part I) *Johnsonia* 4 (45): 217-272.
- BOSS, K. J.** 1968. *ibid.* The genera *Tellina* (part II) and *Tellidora*. *Johnsonia* 4 (46): 273-344.
- BOSS, K. J.** 1969. *ibid.* The genus *Strigilla*. *Johnsonia*, 4 (47): 345-366.
- BOSS, K. J.** 1972. The genus *Semela* in the western Atlantic. *Johnsonia*, 5 (49): 1-32.
- BROOKES KNIGHT, J., L. R. COX, A. MYRA KEEN, R. L. BATTEN, E. L. YOCHELSON & R. ROBERTSON**, 1960. Gastropoda-Archeogastropoda, Systematic Descriptions, p. 1169-1351, in: Raymond C. MOORE, (ed.) Treatise on Invertebrate Paleontology, part I, Mollusca I. Univ. Kansas Press.
- BITRIAGO, J. & J. CAPELO**, 1993. Los moluscos bentónicos de la región suroriental de la bahía de Pozuelos, Puerto La Cruz, Venezuela. *Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle*, 103 (140): 27-37.
- BULLIS, R. H.** 1964. Muricidae (Gastropoda) from the northeast coast of South America, with descriptions of four new species. *Tulane Stud. Zool.* 11(4): 99-108;
- BULLOCK, R. C.** 1974. A. contribution to the systematics of some West Indian *Latirus* (Gastropoda:Fascioliidae). *Nautilus* 88(3): 69-79.
- CACERES HERNANDEZ, R.** 1972. Contribución al conocimiento taxonómico de las Superfamilias Neritacea y Trochacea en las aguas costeras de Venezuela. Univ. Oriente, Esc. De Ciencias, Tesis de Licenciatura inédito. 74 pp., Cumaná.
- CAMACHO, H.** 1979. Invertebrados fósiles. XVI + 706 pp., Eudeba Manuales. Rivadavia, Argentina.
- CAMPOS VILLAROEL, R. & O. MACSOTAY.** 1973. Estudio sobre algunos moluscos de la plataforma Araya-Los Testigos, Venezuela, con descripción de especies nuevas. *Acta Cient. Ven.*, 24(1): 87;
- CAMPOS VILLAROEL, R. & O. MACSOTAY.** 1984. Existencia de dos provincias zoogeográficas en la plataforma submarina Araya-Los Testigos. *Acta Cient. Ven.*, 35(1): 468.
- CARBONELL, L., S. ARIAS, & R. ACEVEDO.** 1949. Contribución al conocimiento de los moluscos de Tacarigua. *Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle, (Venezuela).* 9: 223-236.
- CASTAGNA, M. & P. CHANLEY.** 1973. Salinity tolerance of some marine bivalves from inshore and estuarine environments in Virginia waters on the Western Mid-Atlantic coast. *Malacologia*, 12(1): 47-96.
- CASTELLANOS: Z. J. Ageitos de**, 1967. Catálogo de moluscos marinos bonaerenses. *An. Com. Invest. Cient. Prov. Buenos Aires*, 8: 9-365.
- CARVAJAL, F. & J. C. CAPELO.** 1993. Los moluscos de la plataforma Margarita-Coche-tierra firme (Venezuela). Su distribución y abundancia. *Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle*, 53(140): 159-175.
- CARVAJAL ROJAS J.** 1968. Fluctuación mensual de las larvas y crecimiento del mejillon *Perna perna* (L.), en Guatapanare, Estado Sucre, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente*, 8(1-2): 13-20.
- CAUQUOIN, M.** 1970. Mollusques Prosobranches: Hipponiacea, Calyptracea, Strombacea at Naticacea. *Ann. Inst. Oceanogr. Monaco*, 47(23): 137-143.
- CLENCH, W.** 1944. The genera *Casmaria*, *Galeodea*, *Phalium* and *Cassis* in the Western Atlantic. *Johnsonia*, 16: 1-16.

- CLENCH, W. 1947. The genera **Purpura** and **Thais** in the Western Atlantic. *Johnsonia*, 2(23): 61-91.
- CLENCH, W. 1953. The genus **Conus** in the Western Atlantic. *Johnsonia*, 2(32): 360-376.
- CLENCH, W. & R. T. ABBOTT. 1942. The genera **Tectarius** and **Echininus** in the Western Atlantic. *Johnsonia* 1(4): 1-4;
- CLENCH, W. & R. T. ABBOTT. 1943. The genera **Cypræacassis**, **Morum**, **Sconsia** and **Dolium** in the Western Atlantic. *Johnsonia*, 1(9): 1-18.
- CLENCH, W. & I. PEREZ FARFANTE. 1945. The genus **Murex** in the Western Atlantic. *Johnsonia*, 1(19): 1-28.
- CLENCH, W. & L. C. SMITH, 1944. The Family **Cardiidae** in the Western Atlantic. *Johnsonia*, 1(19): 1-28.
- CLENCH, W. & R. TURNER. 1950. The western Atlantic marine mollusca described by C. B. Adams, *Occ. Papers Moll.* 1(15): 233-404.
- CLENCH, W. & R. TURNER. 1951. The Genus **Epitonium** in the Western Atlantic. *Johnsonia* 2(30): 249-356.
- CLENCH, W. & R. TURNER, 1953. The genera **Epitonium**, **Opalia** and **Cylindriscala** in the Western Atlantic. *Johnsonia* 2(32): 361-362.
- CLENCH, W. & R. TURNER, 1956. The family **Melongenidae** in the Western Atlantic. *Johnsonia* 3(35): 161-187.
- CLENCH, W. & R. TURNER, 1957. The family **Cymatidae** in the Western Atlantic. *Johnsonia* 3(36): 189-244.
- CLENCH, W. & R. TURNER, 1960. The genus **Calliostoma** in the Western Atlantic. *Johnsonia* 4(40): 1-80.
- COOMANS, H. J. 1958. A survey of the littoral Gasteropoda of the Netherland Antilles and other Caribbean Islands. *Stud. Fauna Curacao and other Caribb. Islands.* 8(31): 42-111.
- COOMANS, H. J. 1963. The marine Mollusca of Sint Martin, Lesser Antilles, especially from the French part. *Jour. Concy.* 103:113-186.
- COSEL, R. Von, 1986. Moluscos de la región de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Costa del Caribe de Colombia). *An. Inst. Inv. Marinas Puunta de Betún*, 15-16: 79-370. Santa Marta, Colombia.
- COX, L. R., N. D. NEWELL, D. W. BOYD, et al., 1969. Bivalvia, vols. 1-3: N1-N1224, in: Raymond C. MOORE, (ed.) *Treatise on Invertebrate Paleontology*, part N, Mollusca 6. Univ. Kansas Press.
- DALL, W. H. & CH. S. SIMPSON. 1901. The Mollusca of Puerto Rico. *U.S. Fish. Comm. Bull.* For 1900, 20: 351-524.
- DAUTZENBERG, P. 1900. Croisieres du yacht Chazalie dans l'Atlantique. Mollusques. *Mem. Soc. Zool. France*, 13: 145-265.
- ESPINOSA, J. 1984. Adiciones al género **Diodora** (Mollusca: Archaeogastropoda) en Cuba. *Poeyana* 270:1-22;
- ETCHEVERS, S. L. 1976. Notas ecológicas y cuantificación de la población de guacuco. **Tivela mactroides** (Born, 1778) (Bivalvia-Veneridae) en la Ensenada de La Guardia, Isla de Margarita, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente*, 15(1): 57-64.
- FIGUEIRAS, A. & O. SICARDI, 1968. Catálogo de los Moluscos Marinos del Uruguay. *Com. Soc. Mal. Uruguay*, (II) 2(15): 255-273, (III) 2(16-17): 355-375.

- FLORES, C.** 1964. Notas sobre el género *Nerita* Linnaeus, 1758, para algunas localidades de Venezuela. Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle, 24 (67): 78-90.
- FLORES, C.** 1964b. Contribución al conocimiento del género *Strombus* Linnaeus, 1758 (Mollusca: Mesogastropoda) en las aguas costeras de Venezuela. Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle, 24(69): 261-276.
- FLORES, C.** 1966. La familia Cassididae (Mollusca: Mesogastropoda) en las costas nororientales de Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente, 5(1-2): 7-37.
- FLORES, C.** 1968. Algunos gastrópodos de las Islas Las Aves, Venezuela; y su distribución. Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente, 7(1): 73-106.
- FLORES, C.** 1972. La maricultura y su futuro en Venezuela. Lagena, 30: 43-56.
- FLORES, C.** 1973. La familia Littorinidae (Mollusca: Mesogastropoda) en las aguas costeras de Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente, 12(1): 3-22.
- FLORES, C. & R. CACERES.** 1980. El género *Astraea* Roding, 1798 (Archaeogastropoda: Turbinidae) en las aguas costeras de Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente, 19(1 & 2): 59-72.
- FLORES, C. & R. CACERES.** 1981. *Cittarium pica* (Linnaeus, 1758) (Archaeogastropoda: Trochidae) en las aguas costeras de Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente, 20 (1-2): 57-62.
- FRANZ, C. F., R. C. BULLOCK, R. J. VARELA, & E. D. FLAIL.** 1994. The marine limpets ("lapas") (Mollusca: Gastropoda) of Isla La Blanquilla. Venezuela. Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle, 54(141):107-144.
- FUKUOKA, J.** 1965. Hydrography of the adjacent area: (II) Some characteristic of the oceanographical conditions in the Caribbean Sea, especially in the region adjacent to Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente, 4(2):234-245.
- GIBSON SMITH, J.** 1973. The genus *Voluta* (Mollusca: Gastropoda) in Venezuela, with description of two new species. Geos. 20:65-73.
- GIBSON SMITH, J.** 1976. A new taxon of the genus *Charonia* (Mollusca: Gastropoda) from the Pliocene of Venezuela. Assoc. Venez. Geol. Min. Patrol., Bol. Inf. 19(1):1-17.
- GIBSON SMITH, J. & W. GIBSON SMITH.** 1972. A collection of Molluscs from Isla de Aves, Venezuela. VI Conferencia Geol. Caribe, Margarita, 1969, Mem. 1:470-478.
- GIBSON SMITH, J. & W. GIBSON SMITH.** 1974. The genus *Strombina* (Mollusca: Gastropoda) in Venezuela, with descriptions of a new recent and some fossil species. Assoc. Venez. Geol. Min. Petrol. Bol. Inf. 17 (4-5-6-): 49-70.
- GIBSON SMITH, J. & W. GIBSON SMITH.** 1979. The genus *Arcinella* (Mollusca: Bivalvia) in Venezuela and some associated faunas. Geos, 24: 11-32.
- GIBSON SMITH, J. & W. GIBSON SMITH.** 1982. The sub-family Melampinae (Pulmonata:Basommatopora) in Venezuela, with descriptions of two new species. The Nautilus 96(3): 116-120.
- GIBSON SMITH, J. & W. GIBSON SMITH.** 1984. A revision of the terebrid gastropods of the Mare Formation, Cabo Blanco, Venezuela. Tulane Stud. Geol. Paleont. 18(1-2): 61-66.
- GINES, M.** 1947. La Comisión de Zoología en la extensión al Golfo de Cariaco. Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle, 6(17): 279-291.
- GONZALEZ, A. R. & C. FLORES,** 1972. Notas sobre los géneros *Thais*, *Purpura* y *Murex* (Neogastropoda:Muricidae) en las aguas costeras de Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente, 11(2): 67-82.
- GUPPY, R. J. L.** 1877. First sketch of a marine invertebrate fauna of the Gulf of Paria and its neighborhood. Pt. 1. Mollusks. Proc. Sci. Ass. Trinidad, 2(11): 143-157.

- GUPPY, R. J. L.** 1895b. The mollusca of Gulf of Paria. Proc. Vict. Inst. Trinidad, 2: 116-152.
- HODSON, F.** 1926. Venezuelan and Caribbean Turritellas. Bull. Amer. Paleont. 11(45):173-220.
- HODSON, F. & M. K. HODSON.** 1931a. Some Venezuelan Mollusks. Bull. Amer. Paleont., 16(59): 1-94.
- HODSON, F. & M. K. HODSON.** 1931b. Some Venezuelan Mollusks. Part 2, *ibid.*, 16(60): 1-39.
- HODSON, F. H. K. HODSON & G. D. HARRIS.** 1927. Some Venezuelan and Caribbean Mollusks. Bull. Amer. Paleont., 13(49): 1-160.
- HOSKINS, C. W.** 1964. Molluscan biofacies in calcareous sediments, Gulf of Batabano, Cuba. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol., 48(10): 1680-1704.
- HOUBRICK, R. S.** 1974. The Genus *Cerithium* in the Western Atlantic. *Johnsonia*, 5(50): 33-84.
- HOUBRICK, R. S.** 1977. Reevaluation and new description of the genus *Bittium* (Cerithiidae). *The Veliger*, 25(3): 177-181.
- HUMFREY, M.** 1975. Sea Shells of the West Indies. 351 pp. W. Collins Sons, & Co., London.
- JONG, K. M. de, & H. E. COOMANS.** 1988. Marine gastropods from Curacao Aruba and Bonaire. *Stud. Fauna Curacao*, 47:1-261.
- JONG, K. M. & I. KRISTENSEN,** 1965. Gegevens over mariene gastropoden van Curacao. *Correspond. Bl. Nederl. Malacol. Ver., Suppl.* 1965: 1-56.
- JUNG, P.** 1965. Miocene Mollusca from the Paraguaná Peninsula, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 46 (223): 387-652.
- JUNG, P.** 1969a. Miocene and Pliocene molluska from Trinidad. *Bull. Amer. Paleont.* 55(247): 293-657.
- JUNG, P.** 1969b. A pliocene molluscan faunule from Trinidad. *Tulane Studies in Geology and Paleontology*. 7(2):85-89.
- KEEN, A. M.** 1971. Sea Shells of tropical West America. Marine mollusks from California to Perú. Stanford University Press, Stanford (Cal.), 2nd. Edit. 1064 pp.
- KEMPF, M. & H. R. MATTHEWS.** 1968. Marine mollusks from North and Northeast Brazil. I.- Preliminary list. *Arq. Est. Biol. Mar., Univ. Fed. Ceará*, 8(1): 87-94.
- KIMBERLEY, M. M., M. S. NIEDERREITHER & M. LLANO.** 1988, Effect of marine currents, tides, wind, and Pleistocene sea-level changes on sedimentation in the Margarita-Araya region of Venezuela. *Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle, Supl.* 3, vol. 48: 125-154.
- KRISTENSEN, I.** 1971. Preference of euryhaline species for brackish and supersaline waters. "Vie et Milieu", 30. *Simp. Biol. Mar. Eur. Suppl.* 22: 811-826.
- LINDNER, G.** 1976. *Guides des Coquillages Marins*. Traduit et adapté par Michel CUISIN, 155 pp., Delacroix & Niestlès Edits. Neuchatel - Paris.
- MACSOTAY, O.** 1967b. Estudio de las Donacidae vivientes y fósiles y su significado paleoecológico en Venezuela. *Geominas*, 5: 33-56. Ciudad Bolívar.
- MACSOTAY, O.** 1968. Formaciones cenozoicas de Paria: secciones detalladas correlaciones, paleontología y paleoecología con descripción de especies nuevas. *Geos*, 17: 52-107.

MACSOTAY, O. 1975. Geología submarina y fauna de micrometazoarios del Golfo de Santa Fe, Venezuela nororiental. Bol. Geología (Caracas) 12(23): 443-492.

MACSOTAY, O. 1982. Intervalos batimetabólicos y batimétricos de algunos moluscos bentónicos marinos de Venezuela. Soc. Venez. Cienc. Nat. Bol., 37(140): 149-203.

MACSOTAY, O. & W. SCHERER. 1972. Clasificación numérica de las Turritellidae (Moluscos) del Oligoceno al Holoceno, correspondientes a la Paleo-provincia del Caribe. Mem. IV Congr. Geol. Venez., Caracas, 1969, t. 3: 1715-1734.

MACLEOD, I. C. & M. BEERMAN, 1977. Schelpen van Aruba. P. 20-42, in: W. BOOI, L. CROES, I. KRISTENSEN, J. MADURO & V. ROOZE, Aruba: zijn voorgeschiedenis zijn dieren. Stinapa No. 14. Aruba.

MALONEY, N. J. 1967. Geomorphology of the Continental Margin of Venezuela. Part II: Continental terrace off Carúpano (64° W to 62° W longitude). Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente, 6(1): 147-1955.

MALONEY, N. J. 1971. Análisis de Sedimentos Marinos. Registro de Datos Oceanogr. Y Meteorológicos 1: 1-24.

MARELLI, D. C. & S. GRAY, 1983. Conchological redescrptions of Mytilopsis sallei and Mytilopsis leucophaeata of the brackish western Atlantic (Bivalvia: Dreissenidae). Veliger, 25(3): 185-193.

MARTINEZ, RENE J. 1966. Segunda contribución al estudio del Golfo de Cariaco y de la Bahía de Mochima, Venezuela. ASOVAC, XVI Conv. Anual, resúmenes, p. 116-117. (multigrafiado).

MARTINEZ, RENE J. 1970. Estudio sistemático de algunos moluscos marinos del Golfo de Venezuela. ASOVAC, XX Conv. Anual, resúmenes, p. 89.

MATTHEWS, R. H. & M. KEMPF. 1970. Moluscos marinhos do Nordeste do Brasil. II. Moluscos do Arquipélago do Fernando do Noronha (con algunas referencias ao atol das rocas). Arq. Cienc. Mar., 10(1): 53 pp.

MATTHEWS, H. R. & E. C. RIOS. 1968. Terceira contribuicao ao inventário dos moluscos marinhos do Nordeste Brasileiro. Arq. Cienc. Mar., 9(1): 27-35.

MAURY, C. J. 1912. A contribution to the paleontology of Trinidad. Jour. Acad. Nat. Sci. Philad., 2n ser, 15: 25-112.

MAURY, C. J. 1925. A further contribution to the paleontology of Trinidad (Miocene horizon). Bull. Amer. Paleont. 19 (42): 1-250 p.

MCLEAN, R. A. 1951. The pelecypoda or bivalve mollusks of Porto Rico and the Virgin Islands. Sci. Pto. Rico & Virgin Isl., 17(1): 1-183.

METIVIER, B. 1970. Mollusques Prosobranches: Fissurellidae, Acmaeidae et Patellidae. In: Campagne de la Calypso au large des Cotes Atlantiques de l'Amérique du Sud, (1961-1962). Ann. Inst. Oceanogr. Monaco, 47: 115-128.

MIRO ORELL, M. de, 1974. Morfología submarina y sedimentos marinos recientes del margen continental del Nororiente de Venezuela. Cuadernos Azules, Publ. De la Com. org. de la III Conferencia de las NN.UU. sobre el Derecho del Mar. 230 pp.

MOLL, J. J. van, 1973. Les Conidae du Surinam. Zool. Meded. Leiden, 46: 262-268.

MOLL, J. J. van, B. TURSCH & M. KEMPF. 1967. Les Conidae du Brasil. Annls. Inst. Oceanogr., Monaco, 45: 233-255.

MOORE, D. R. 1961. The marine and brackish water mollusca of the State of Mississippi. Gulf. Res. Rep., 1(1): 1-58.

MORELOCK, J., N. J. MALONEY & W. R. BRYANT. 1972-b. Structure and sediments of the Continental shelf of Central Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr., Univ. Oriente, 11(2): 127-136.

MULLER-KARGER, F. E. & R. J. VARELA. 1988. Variabilidad de la biomasa de fitoplancton en aguas superficiales del mar Caribe: una perspectiva desde el espacio con el CZCS. Soc. Cienc. Nat. La Salle, Mem., supl. 3, vol. 48: 179-201.

NICKLES, M. 1950. Mollusques testacés marins de la cote occidentale de Afrique. P. Lechevalier, Paris, Manuels ouest-Africaines, 2: 1-269.

NICOL, D. 1950. Origin of the Pelecypod family Glycymeridae. Jour. Paleont. 24(1): 89-98.

NICOL, D. 1952. Revision of the pelecypod genus Echinochama. Jour. Paleont. 26(5): 803-917.

NOWELL-USTICKE, G. W. N. 1959. A check list of the marine shells of St. Croix, U. S. Virg Islands. 90 pp., Burlington, Lane Press.

NOWELL-USTICKE, G. W. N. 1968. Caribbean cones from St. Croix and the Lesser Antilles. Livingston Publishing Co., Narberth. 30 pp.

OKUDA, T. BENITEZ, A., J. M. SELLIER DE CIVRICUX, J. FUKUOKA & B. GAMBOA. 1974. Revision de los datos oceanograficos en el mar Caribe Sur-oriental, especialmente el margen continental de Venezuela. III Conf. N. N. U.U. sobre el derecho del mar, Caracas, Cuadernos Azules, 15: 1-177.

OKUDA, T. 1974. Caracteristicas oceanograficas generales de la costa suroriental del Mar Caribe. en OKUDA, T. et al., Revision de los datos oceanograficos ... III Conf. N. N. U. U. sobre el derecho del mar, Caracas. Cuadernos Azules 15: 58-69.

OLSSON, A. A. 1922. The Miocene of northern Costa Rica, with notes on its general stratigraphic relations. Bull. Amer. Paleont., 9(39), p. 174-482.

OLSSON, A. A. 1956. Studies on the genus Olivella. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 108- 155-225.

OLSSON, A. A. 1965. Review of the genus Voluta, and the description of a new species. Bull. Amer. Paleont. 49 (224): 658-671.

OLSSON, A. A. & A. HARBISON. 1953. Pliocene Mollusca of southern Florida, with special reference to those from the North Saint Petersburg. Acad. Nat. Sci. Phila., Mon. 8, 457 pp.

OLSSON, A. A. & MCGINTY, T. L. 1958. Recent marine mollusks from the Caribbean coast of Panamá, with the descriptions of some new genera and species. Bull. Amer. Paleont. 38(177): 1-58.

OLSSON, A. A. R. E. PETIT. 1968. Notes on the Siphocypraea. Bull. Amer. Paleont. 54(242): 279-288.

PAREZAN, P. 1970-1976. Carta d'identit  delle conchiolia del Mediterraneo. Bios, Taranto, Italia.

1970, vol. 1, Gasteropodi, p. 1-283.

1974, vol. 2, Bivalvi, prima parte, p. 1-227.

1976, vol. 3, Bivalvi, seconda parte, p. 283-546.

PASTEUR-HUMBERT, Ch. 1962. Les mollusques marins testac s du Maroc. Catalogue non critique. I. Les Gast opodes. Travaux de l'Institut Sci. Cherifien, serie Zoologique, 23: 1-225. Rabat. Maroc.

PERCHARDE, P. 1974. Underwater observations on Conus ermineus Born, 1778 in Trinidad and Tobago. Verh. Nat. Ges. Basel, 84(1): 501-507.

PEREZ FARFANTE, I. 1943a. The genera Fissurella, Lucapina and Lucapinella in the Western Atlantic. Johnsonia 1(10)*20 40.

- PEREZ FARFANTE, I.** 1943b. The genus *Diodora* in the Western Atlantic. *Johnsonia* 1(10): 1-20.
- PEREZ FARFANTE, I.** 1945. The genera *Lucapina* and *Diodora* in the Western Atlantic. *Johnsonia*, 1(18): 4-5.
- PERRY, L. M. & J. S. SCHWENGEL.** 1955. Marine shells of the Western coast of Florida. 198 pp., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York.
- PETUCH, E. J.** 1976. An unusual molluscan assemblage from Venezuela. *Veliger*, 18(3): 322-325.
- PRINCZ, D.** 1973. Moluscos gastropodos y pelecipodos del Estado Nueva Esparta, Venezuela. *Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle*, 33(96): 169-222.
- PRINCZ, D.** 1978. Los Moluscos marinos del Golfo de Venezuela. *Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle*, 38(109): 51-76.
- PRINCZ, D.** 1982. Lista y bibliografía de los Gastropodos marinos vivos de los mares de Venezuela, Trinidad e Islas de Sotavento. *Soc. Venez. Cienc. Nat.*, Caracas, 37(140): 103-147.
- RADWIN, G. E.** 1977. The family Columbellidae in the Western Atlantic. *Veliger*, 19(4): 403-417, part II: *Veliger*, 20(2): 119-133; part III: *Veliger*, 20(4): 328-344.
- RAMOS, G. H., G. ROBAINA G.** 1994. Contribución al conocimiento de los moluscos gasteropodos y pelecipodos de la bahía de Mochima, Edo. Sucre, Venezuela. *Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle*, 54(141): 95-106.
- REHDER, H. A.** 1962. Contribución al conocimiento de los moluscos marinos del Archipiélago de Los Roques y La Orchila. *Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle*, 22(6)2: 116-138.
- REHDER, H. A. & R. T. ABBOTT**, 1951. Some new and interesting mollusks from the deeper water of the Gulf of Mexico. *Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, Rev. 8(2): 53-66.
- RICE, W. H. & L. S. KORNICKER.** 1962. Mollusks of Alacran Reef, Campeche Bank, Mexico. *Publ. Inst. Mar. Sci. Univ. Texas*, 8: 366-403.
- RICE, W. H. & L. S. KORNICKER.** 1965. Mollusks from the deeper waters of the northwestern Campeche Bank, Mexico. *Publ. Inst. Mar. Sci. Univ. Texas*, 10: 108-172.
- RIOS, E. C.** 1970. Coastal Brazilian Seashells. *Museu Oceanografico de Rio Grande, Rio Grande (Rio Grande do Sul)*. 255 pp.
- RIVERO, F. Ch.** 1962. Paleontología, Paleoecología y Ecología Marina. *Geos*, 7: 5-97, Univ. Central de Venezuela, Caracas.
- ROBERTSON, R.** 1958. The family Phasianellidae in the Western Atlantic. *Johnsonia*, 3(37): 245-278.
- RODRIGUEZ, G.** 1959. The marine communities of Margarita Island, Venezuela. *Bull. Mar. Sci. Gulf Carib.*, 9(3): 237-280.
- RODRIGUEZ, G.** 1963. The intertidal estuarine communities of Lake Maracaibo, Venezuela. *Bull. Mar. Sci. Gulf. Carib.* 13(2): 197-218.
- SANDER, F. & C. M. LALLI.** 1984. A comparative study of Mollusk Communities on the Shelf-Slope Margin of Barbados, W. I. *The Veliger*, 24(4): 309-318.
- SCHERER, W. & O. MACSOTAY.** 1972. Ecologic analysis and facies distribution of Lecherias-Manare platform area, Northeastern Venezuela. *IV Carib. Geol. Conf., Porlamar, 1969, Mem.* 1: 418-422.

- SEIGLIE, G. A.** 1968. Distribution of foraminifers in the sediments of Araya-Los Testigos shelf. *Caribb. Jour. Sci.*, 6(3-4): 103-127.
- SMITH, MAXWELL.** 1951. East Coast Marine shells. 4th edition; Edw. Bros. Ann Arbor, Mich., 150 pp.
- STOLL, N. R.** (Chairman) et al., 1961. International Code of Zoological Nomenclature. Intern. Comm. Zool. Nomencl., 1-176 pp., London.
- TABB, D. C. & R. B. MANNING.** 1961. A check list of the flora and fauna of Northern Florida bay and adjacent brackish waters of the Florida mainland collected during the period July 1957 through September, 1960. *Bull. Mar. Sci. Gulf. Caribb.* 11(4): 552-649.
- TAYLOR, D. W. & N. F. SOHL.** 1962. An outline of gasteropod classification. *Malacologia*, 1(1): 7-32.
- TESTUD, A. M.,** 1970. Mollusques Prosobranches: Volutidae. *Ann. Inst. Oceanogr. Monaco*, 47(21): 129-132; 1970a, Olividae, *Ann. Inst. Oceanogr. Monaco*, 47(22): 133-136.
- THIELE, J.** 1931. Handbuch der Systematischen Weichtierkunde. Verlag von Gustav Fischer, Jena. 778 pp.
- TURNER, R. D.** 1948. The family Tonnidae in the Western Atlantic. *Johnsonia*, 2(26): 165-192.
- TURNER, R. D.** 1959a. The genera *Hemitoma* and *Diodora* in the Western Atlantic. *Johnsonia*, 3(39): 334-344.
- TURNER, R. D.** 1959b. The genera *Amaea* and *Epitonium* in the Western Atlantic. *Johnsonia*, 3(39): 334.
- TURNER, R. D. & J. ROSEWATER.** 1958. The family Pinnidae in the Western Atlantic. *Johnsonia*, 3(38): 285-326.
- UROSA, L. J.** 1972. Algunos depredadores del mejillon comestible *Perna perna* (L.). *Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente*, 11(1): 3-18.
- VAN ANDEL, T. & H. POSTMA.** 1954. Recent sediments of the Gulf of Paria. Reports of the Orinoco Shelf Expedition, v. 1, deel 20, 244 pp.
- VELEZ ROJAS, A.** 1972. Fijación de la valva de la ostra de los bancos naturales de Bahía de Mochima y Laguna Grande. *Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente*, 11(2): 97-106.
- VELEZ ROJAS, A.** 1976. Crecimiento, edad y madurez sexual del ostion *Crassostrea rhizophorae* de Bahía de Mochima. *Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente*, 15(1): 65-72.
- VOKES, E. H.** 1964. The genus *Turbinella* (Mollusca: Gastropoda) in the New World. *Tulane Studs. Geology*, 2(2): 39-68.
- VOKES, E. H.** 1966. The genus *Vasum* (Mollusca: Gastropoda) in the New World. *Tulane Studs. Geology*, 5(1): 1-36.
- VOKES, E. H.** 1967. Observations on *Murex messorius* and *Murex tryoni* with description of two new species of *Murex*. *Ibid.*, 5(2): 81-90.
- VOKES, H. E.** 1970. Cenozoic Muricidae of the Western Atlantic region. Part V. *Pterynotus* and *Poirieria*. *Ibid.*, 8(1): 1-50.
- VOKES, H. E. & E. H. VOKES.** 1983. Distribution of shallow-water marine mollusca, Yucatan Peninsula, Mexico. Middle American Research Institute Publ. 54 (Tulane Univ.) 183 pp.
- WAGNER, R. J. L. & R. T. ABBOTT,** Van Nostrand's Standard Catalog of Shells. 2nd. E., 303 pp., Van Nostrand Co., Inc., Princeton, N. J.

WALLER, T. R. 1969. The evolution of the Argopecten gibbus stock (Mollusca:Bivalvia). With emphasis on the Tertiary and Quaternary species of Eastern North America. Paleont. Memoir, 3(1): 1-125.

WALLER, T. R. 1973. The habits and habitats of some Bermudian Marine mollusks. The Nautilus, 87(2): 31-52.

WARMKE, G. L. & R. T. ABBOTT. 1961. Caribbean Seashells. Dover Publications: New York, 348 pp.

WEISBORD, N. E. 1962. Late Cenozoic gastropods from Northern Venezuela. Bull. Amer. Paleont., 42(193): 1-672.

WEISBORD, N. E. 1964. Late Cenozoic pelecypods from Northern Venezuela. Bull. Amer. Paleont., 45(204): 1-564.

WORK, R. C. 1969. Systematics, ecology and distribution of the mollusks of Los Roques, Venezuela. Bull. Mar. Sci. 19(3): 614-711.

WOODRING, W. P. 1957-1982. Geology and Paleontology of Canal Zone and adjoining parts of Panamá. U. S. Geol. Surv. Prof. Paper 306-A/F, pp. 1-759.

FE DE ERRATA: En la sección de "Observaciones" de numerosas especies de este libro, se halla referencia a la salinidad medida, como "%". En realidad se trata, de "por mil" y no "por ciento".

MOLUSCOS REPRESENTATIVOS DE LA PLATAFORMA DE MARGARITA - VENEZUELA -

DESCRIPCION DE 24 ESPECIES NUEVAS

MACSOTAY, Oliver & CAMPOS VILLARROEL, Regulo



Oliver MACSOTAY.



Venezolano nacido en Budapest, Hungría (1940). Cursó estudios de Geología en la Universidad Central de Venezuela (Caracas).

Submarinista profesional, colectó moluscos marinos desde su juventud, lo que continuó al trabajar en el Instituto Oceanográfico de la Universidad de Oriente (Cumaná) entre 1967 y 1972. Allá tuvo como labor la distinción de los moluscos vivientes de los fósiles, contenidos en los millares de muestras de dragado del departamento de Oceanografía Geológica. Allí fué donde decidió aunar estudios y muestras con el co-autor. Trabajó como Geólogo de Exploración y Paleontólogo, y ha publicado un centenar de estudios sobre estos temas entre 1963 y 1998. A finales de siglo, ambos decidieron la preparación de este libro.



Régulo A. CAMPOS VILLAROEEL.

Venezolano nacido en Santiago, Chile (1940). Cursó estudios de Biología en la Universidad Central de Venezuela (Caracas). Miembro

fundador del Instituto de Zoología Tropical (1965), siempre estuvo activo como investigador en el campo de los invertebrados marinos de Venezuela. Submarinista Profesional, Científico y fotógrafo submarino laboró en la Oficina Nacional de Pesca (Ministerio de Agricultura y Cria), Publicó varias docenas de estudios sobre moluscos y corales entre 1966 y 1985. Colector de mas de los 15.000 ejemplares de moluscos que formaron el nucleo de este estudio, su objeto fué la realización del primer libro de Malacologias marina Venezolana.