FOSILES DE LA LOCALIDAD DE GÜINIMITA, COSTA SUR DE LA PENINSULA DE PARIA, VENEZUELA.

Recopilación realizada por

Wolfgang Scherer y Tulio Peraza, 1999

La localidad de Gűinimita está situada en la costa sur de la Península de Paria, sector occidental de la ensenada Güinimita, estado Sucre. La geología del área fue levantada por estudiantes de la UCV en el año 1964. Scherer (1964) refiere una secuencia de 269 metros incompletos y un espesor mayor de 300 metros en la parte occidental de metasedimentos y calizas fosilíferas donde reportó especies de bivalvos, colonias de corales, icnofósiles y algas calcáreas.





FOSILES DE LA LOCALIDAD DE GÜINIMITA, COSTA SUR DE LA PENINSULA DE PARIA, VENEZUELA.

Recopilación realizada por Wolfgang Scherer y Tulio Peraza, 1999


La fauna está caracterizada por las especies:


Bivalvos

- Pterotrigonia cf. tocaimana (Lea)
- Trigonia hondaana Lea

Corales


- Actinastrea cf. guantanamensis
- Stylina (Stylina) sucrensis Wells
- Myriophyllia sp.
- Calamophyllia sandbergeri Felix
- Diploastrea harrisi
- Periseris irregularis (Felix)
- Thecosmilia cumanensis Wells







Pterotrigonia cf. tocaimana Lea










© W. SCHERER, 1964
DETALLE DE LA COLONIA DE CORALES
EN LA LOCALIDAD FOSILIFERA ENTRE
YACUA Y GÜINIMITA






EJEMPLAR DE Stylina (Stylina) sucrensis Wells







FOSILES DE LA LOCALIDAD DE GÜINIMITA, COSTA SUR DE LA PENINSULA DE PARIA, VENEZUELA.




EJEMPLAR DE Diploastrea harrisi Wells






SECCION PULIDA DE ALGA CALCAREA CONCRECIONARIA





ESPECIE DE CORAL



NO IDENTIFICADA



ESPECIE DE CORAL NO IDENTIFICADA

