

CURS 1

2+1+1

Nota: 1 punct LCS
1 punct LCL
8 puncte LS-examen.

Bibliografie.

- 1) I.A. Rus, Ecuații diferențiale, ecuații integrale și sisteme dinamice, Ed. Transilvania Press, 1996
- 2) M.A. Seibau, Ecuații și sisteme de ecuații diferențiale, Pusa Univ. Clujana, 2009.
- 3) D. Trif, Metode numerice în teoria sistemelor dinamice, Transilvania Press, 1997.
- 4) Gh. Micula, P. Pavel, Ecuații dif. și integrale prin probleme și exerciții, Ed. Dacia, 1989.
- 5) Gh. Moroșanu, Ecuații dif. Aplicații, Ed. Acad., 1989.

Sage Math.

P. Zimmermann & Co. , Computational Mathematics with
Sage Math , Guative Commeurs , 2018.

Introducere în teoria ecuațiilor diferențiale

1. Notiunea de ecuație dif. și soluție

ecuație algebrică

$$x^2 - x = 0$$

$$x(x-1) = 0$$

$$x_1 = 0, x_2 = 1$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{2}$$

Ecuație diferențială: ecuație funcțională (necunoscuta este o funcție) în care pe lângă funcția necunoscută apar și derivatele acesteia.

Example.

1) $y'(x) = y(x)$ $y' = y$

$y(x) \equiv 0$ este sol.

$y(x) = e^x$ este soluție

$y(x) = ce^x, c \in \mathbb{R}$ - toate sol. ecuației
soluție generală

$$(ce^x)' = c \cdot (e^x)' = c \cdot e^x$$
$$y' = \dots = y.$$

2) Problema primitivelor

$f \in C[a, b]$. - fct. dată

să se det $y \in C^1[a, b]$ aî $y'(x) = f(x), x \in [a, b]$.

$y(x) = \int_a^x f(t) dt + c, c \in \mathbb{R}$ - soluția generală a
ecuației

În general în expresia unei ecuații diferențiale pot să apară și derivate de ordin superior a funcției necunoscute

$$y'' + y = 0$$

$$y''' \cdot y' + y + x \cdot y'' = x^2$$

Forma generală a unei ecuații dif.

$$(1) \quad \boxed{F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0}$$

ecuație dif.
în formă implicită

y - funcția necunoscută

x - variabila indep.

n - ordinul ecuației dif.

$$(2) \quad \boxed{y^{(n)}(x) = f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))}$$

ecuație dif. în
formă explicită
(formă normală,
formă Cauchy).

$$f: D_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad D_f \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

D_f - domeniul ecuației dif.

Def. O funcție $y \in C^n(I)$ este o soluție a ec. (2) dacă:

- (i) $I \subseteq \mathbb{R}$ interval nedegenerat.
- (ii) $(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x)) \in D_f, \forall x \in I.$
- (iii) $y^{(n)}(x) = f(x, y(x), \dots, y^{(n-1)}(x)), \forall x \in I.$

$n=1.$

Ecuația dif. de ord. 1.


$$(3) \quad \boxed{y'(x) = f(x, y(x))}, \quad f: D_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad D_f \subseteq \mathbb{R}^2$$

Def. O funcție $y \in C^1(I)$ este sol. a ec. (3) dacă:

- (i) $I \subseteq \mathbb{R}$ interval nedeg.
- (ii) $(x, y(x)) \in D_f, \forall x \in I.$
- (iii) $y'(x) = f(x, y(x)), \forall x \in I.$

$$G_y = \{ (x, y(x)) : x \in I \}$$

$$(ii) \Leftrightarrow G_y \subseteq D_f.$$




Probleme cu valori initiale (probl. Cauchy)

$$f: D_f \rightarrow \mathbb{R}, (x_0, y_0) \in D_f$$

$$(4) \begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \rightarrow \text{condiție inițială}$$

$$(x_0, y_0) \in G_y.$$



Dacă probl. Cauchy (4) are soluție unică atunci
 spunem că (x_0, y_0) este pot de existență și unicitate.
 Dacă probl. Cauchy (4) are mai multe soluții atunci
 spunem că (x_0, y_0) este punct singular.

Exemple

$$1) \quad y' = -\frac{x}{y}$$


$$f(x, y) = -\frac{x}{y}$$

$$D_f = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$$

$$D_f = U_1 \cup U_2$$

$$U_1 = \mathbb{R} \times (-\infty, 0)$$

$$U_2 = \mathbb{R} \times (0, +\infty)$$



$$y' = -\frac{x}{y} \Rightarrow y \cdot y' = -x \cdot 2.$$

$$2y \cdot y' = -2x$$

$$(y^2)' = -2x$$

$$y^2 = -\int 2x dx + c$$

$$\boxed{y^2 = -x^2 + c, c \in \mathbb{R}} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = c.$$

$$\boxed{y(x) = \pm \sqrt{-x^2 + c}, c \in \mathbb{R}}$$

Problema Cauchy:

$$\begin{cases} y' = -\frac{x}{y} \\ y(1) = 1 \end{cases} \quad x_0 = 1, y_0 = 1 \quad (x_0, y_0) = (1, 1) \in U_2$$

$$(1, 1) \in U_2 \Rightarrow y(x) = \sqrt{-x^2 + c}$$

$$y(1) = 1 \Rightarrow \sqrt{-1 + c} = 1$$

$$-1 + c = 1 \Rightarrow c = 2.$$

\Rightarrow soluția probl. Cauchy $y(x) = \sqrt{2-x^2}$

$$y: (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$\underline{I} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ este cel mai mare interval pe care poate fi considerată soluția probl. Cauchy.
(soluție saturată)

$(1,1)$ este punct de existență și unicitate.

$$2) \begin{cases} y' = \sqrt{y} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$f(x, y) = \sqrt{y}$$


$$f: D_f \rightarrow \mathbb{R}$$

$$D_f = \mathbb{R} \times [0, +\infty)$$

$$y' = \sqrt{y}$$

$y(x) \equiv 0$ este o sol.
a ec. dif., chiar
o sol. a probl.
Cauchy

$$y \neq 0$$



$$\frac{y'}{\sqrt{y}} = 1 \quad | \cdot \frac{1}{2}.$$

$$\frac{y'}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2}$$

$$(\sqrt{y})' = \frac{1}{2} \Rightarrow \sqrt{y} = \int \frac{1}{2} dx + c.$$

$$\sqrt{y} = \frac{1}{2}x + c.$$

$$\boxed{y(x) = \left(\frac{1}{2}x + c\right)^2, c \in \mathbb{R}}$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow c^2 = 0 \Rightarrow c = 0$$

$$y(x) = \left(\frac{1}{2}x\right)^2 = \frac{x^2}{4}.$$


prob. Cauchy are două soluții

$$y(x) \equiv 0$$

$$y(x) = \frac{x^2}{4}$$

$\Rightarrow (0,0)$ este pct. singular.


$$y(x) = \left(\frac{1}{2}x + c\right)^2 = \left(\frac{x+2c}{4}\right)^2 = \left(\frac{x+c_1}{4}\right)^2$$



$$\alpha > 0$$

Interpretare geometrică

$$y' = f(x, y) \quad f: D_f \rightarrow \mathbb{R}$$



$$(x_0, y_0) \in D_f.$$


$$f(x_0, y_0) = y'(x_0)$$

valoarea $f(x, y)$ returnează
panta tangentei la graficul
unei soluții

$$y_\alpha(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \alpha \\ \frac{(x-\alpha)^2}{4}, & x > \alpha. \end{cases}$$

y_α sunt soluții ale probl.
Cauchy

Rezolvarea unei ecuații dif. revine la determinarea unei funcții $y=y(x)$ care se acordă la punctele tangențelor la grafic, det. de val. $f(x,y)$.



câmp de direcții

$$D_f = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$$

$M(x_0, y_0) \in$ primei bisect.
 cu $x_0 = y_0$

$$f(x_0, y_0) = -\frac{x_0}{y_0} = -\frac{x_0}{x_0} = -1$$

pe axa Oy : $x=0$

$$M \in Oy$$

$$f(x,y) = -\frac{0}{y} = 0.$$

pe a doua bisect $y=-x$

$$f(x,y) = -\frac{x}{y} = -\frac{x}{-x} = 1$$

Sisteme de ecuații diferențiale

y_1, y_2, \dots, y_n — fct. necunoscute

$x \rightarrow$ variabila indep.

$$y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x).$$

$$(5) \quad \begin{cases} y_1'(x) = f_1(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \\ \vdots \\ y_n'(x) = f_n(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \end{cases}$$
$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad Y' = \begin{pmatrix} y_1' \\ \vdots \\ y_n' \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

$$(6) \quad \boxed{Y' = f(x, Y)} \quad \text{forma vectorială a sist. (5).}$$

$$f: D_f \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad D_f \subseteq \mathbb{R}^{n+1}.$$

Def. O funcție $\gamma \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ este sol. a sist (5) dacă:

- (i) $I \subseteq \mathbb{R}$ interval nedeg.
- (ii) $(x, \gamma(x)) \in D_f$, $\forall x \in I$
- (iii) $\gamma'(x) = f(x, \gamma(x))$, $\forall x \in I$

Obs: Orice ecuație dif. de ord. n poate fi scrisă în mod echivalent în forma unui sist. de n ecuații dif. de ord. 1.

$$\gamma^{(n)} = f(x, \gamma, \gamma', \dots, \gamma^{(n-1)})$$

$$\begin{aligned} \gamma &= y_1 \\ \gamma' &= y_2 \\ \gamma'' &= y_3 \\ &\vdots \\ \gamma^{(n-1)} &= y_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_2 = \gamma' = y_1' &\Rightarrow \\ y_3 = \gamma'' = (\gamma')' = y_2' &\Rightarrow \end{aligned} \begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \vdots \\ y_{n-1}' = y_n \\ y_n' = f(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases}$$