

2.

$$\int_0^{\infty} e^{-t^2} f(t) dt = A_1 f(t_1) + A_2 f(t_2) + R(f)$$

Observam ca intervalul este $[0, \infty]$, deci integrala sigur nu este de tip Gauss-Hermite si ar putea fi de tip Gauss-Laguerre.

Facem substitutia $t = u^2 \rightarrow dt = 2u du; t^2 = u^4$

$$\int_0^{\infty} e^{-t^2} f(t) dt = \int_0^{\infty} e^{-u^4} f(u^2) 2u du$$

Acum integrala se incadreaza in tipul Gauss-Laguerre

$$\int_0^{\infty} e^{-u^4} f(u^2) 2u du = A_1 f((u_1)^2) + A_2 f((u_2)^2) + R(f)$$

$n = 2$

u_1 si u_2 sunt radacinile polinomului Laguerre $L_2(u) = \frac{u^2 - 4u + 2}{2}$, adica

$$u_1 = 2 - \sqrt{2}, u_2 = 2 + \sqrt{2}$$

A_1 si A_2 se calculeaza cu formula

$$A_i = \frac{1}{(n+1)[L_{n+1}(u_i)]^2}$$

In urma calculelor, rezulta

$$A_1 = \frac{1}{(-1 + \sqrt{2})^2}, \quad A_2 = \frac{1}{(1 + \sqrt{2})^2}$$

Daca $f(t)$ este un polinom de grad maxim $2n-1$, adica 3, restul este 0.

$$R_n(f) = \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} \int_a^b w(x) \pi_n^2(x) dx.$$

Altfel, se poate calcula cu formula