

PRUEBA SALIDAS

María José Zúñiga


2023-01-04

Table 1: Estimaciones de biomásas utilizadas en la evaluación de stock de anchoveta provenientes de los cruceros de Verano (RECLAS), Otoño (PELACES) y crucero de huevos (MPDH).

Año calendario	Biomasa crucero de verano (toneladas)	Biomasa crucero de otoño (toneladas)	Biomasa desovante MPDH (toneladas)
1.997	0	0	0
1.998	0	0	0
1.999	0	0	0
2.000	370.054	0	0
2.001	412.103	0	0
2.002	1.494.270	0	112.323
2.003	250.295	0	0
2.004	1.289.820	0	153.150
2.005	931.140	0	637.223
2.006	785.840	2.062.540	0
2.007	897.777	1.500.000	255.016
2.008	1.040.060	0	313.432
2.009	184.774	1.874.560	73.983
2.010	17.550	323.000	77.613
2.011	25.797	250.000	109.348
2.012	100.020	174.000	50.772
2.013	73.551	83.755	17.779
2.014	82.996	137.374	17.303
2.015	120.727	0	59.886
2.016	218.422	501.740	28.197
2.017	84.188	490.994	0
2.018	347.160	745.055	207.744
2.019	605.670	786.931	136.588
2.020	569.463	1.005.240	643.089
2.021	516.374	1.338.010	65.757
2.022	1.084.160	1.417.890	0
2.023	1.084.160	0	0

Table 2: Desembarques en toneladas, porcentaje de descarte supuesto, captura descartada (toneladas) y captura total (toneladas) estimadas en año biológico para anchoveta de las regiones de Valparaíso a Los Lagos.

Año biológico	Desembarques (toneladas)	Porcentaje Descarte	Captura descartada (toneladas)	Captura total (toneladas)
1996/97	350.755	0%	0	350.755
1997/98	77.701	0%	0	77.701
1998/99	442.110	0%	0	442.110
1999/00	56.441	0%	0	56.441
2000/01	13.986	4%	559	14.545
2001/02	226.307	4%	9.052	235.359
2002/03	259.572	4%	10.383	269.955
2003/04	345.847	4%	13.834	359.681
2004/05	415.290	4%	16.612	431.902
2005/06	316.159	4%	12.646	328.805
2006/07	614.773	4%	24.591	639.364
2007/08	395.911	4%	15.836	411.747
2008/09	348.914	4%	13.957	362.871
2009/10	299.548	4%	11.982	311.530
2010/11	161.306	4%	6.452	167.758
2011/12	64.116	4%	2.565	66.681
2012/13	57.910	4%	2.316	60.226
2013/14	56.524	4%	2.261	58.785
2014/15	54.919	4%	2.197	57.116
2015/16	70.367	4%	2.815	73.181
2016/17	49.016	4%	1.961	50.977
2017/18	66.757	1,4%	935	67.692
2018/19	135.804	2,1%	2.852	138.656
2019/20	157.646	1,8%	2.838	160.484
2020/21	205.398	2%	4.108	209.506
2021/22	199.343	2%	3.987	203.330
2022/23	NA	2%	NA	NA






Figure 1: Serie de desembarques y biomاسas estimadas por la evaluación hidroacústica de verano y otoño utilizadas como datos de entrada al modelo de evaluación de stock de anchoveta de las regiones de Valparaíso a Los Lagos.





Figure 2: Variabilidad interanual de la proporción de la captura de la flota (panel superior izquierdo) y pesos medios (panel superior derecho) de cada grupo de edad (edad 0 a 4). Composición de edad de la captura de la flota (panel inferior izquierdo) y pesos medios (panel inferior derecho) utilizados en la evaluación de stock de anchoveta de las regiones de Valparaíso a Los Lagos.






Figure 3: Variabilidad interanual de la proporción de la captura del crucero de verano (panel superior izquierdo) y crucero de otoño (panel superior derecho) de cada grupo de edad (edad 0 a 4). Composición de edad de la captura de los cruceros de verano (panel inferior izquierdo) y otoño (panel inferior derecho) utilizados en la evaluación de stock.




Figure 4: Ajustes del modelo anual en edades a los valores de biomasas de cruceros de verano, otoño y desembarques. Las barras corresponden al intervalo de confianza asintótico y el círculo al valor del estimador.




Figure 5: Residuales (escala log) del ajuste del modelo base actual a los datos observados.