

Partager une série !

Les anacondas sont des serpents aquatiques d'Amérique du Sud.
Dans le tableau ci-dessous, on a relevé la taille de 100 femelles adultes.

Taille (en m)	4	5	6	7	8	9
Effectif	7	22	14	20	19	18

1. Donner les effectifs et les fréquences cumulées de cette série.
2. On veut trouver une valeur, notée **Me**, telle que la moitié des valeurs de la série soit inférieure à cette valeur et telle que la moitié des valeurs de la série soit supérieure à cette valeur. Une telle valeur est appelée la **médiane** de la série statistique.
Proposer une valeur pour Me.
3. On veut trouver une valeur de la série, notée **Q₁** telle que au moins 25% des valeurs de la série soit inférieure à cette valeur. Une telle valeur est appelée le **premier quartile** de la série statistique.
Proposer une valeur pour Q₁.
4. On veut trouver une valeur de la série, notée **Q₃** telle que au moins 75% des valeurs de la série soit inférieure à cette valeur. Une telle valeur est appelée le **troisième quartile** de la série statistique.
Proposer une valeur pour Q₃.

Partager une série !

Les anacondas sont des serpents aquatiques d'Amérique du Sud.
Dans le tableau ci-dessous, on a relevé la taille de 100 femelles adultes.

Taille (en m)	4	5	6	7	8	9
Effectif	7	22	14	20	19	18

1. Donner les effectifs et les fréquences cumulées de cette série.
2. On veut trouver une valeur, notée **Me**, telle que la moitié des valeurs de la série soit inférieure à cette valeur et telle que la moitié des valeurs de la série soit supérieure à cette valeur. Une telle valeur est appelée la **médiane** de la série statistique.
Proposer une valeur pour Me.
3. On veut trouver une valeur de la série, notée **Q₁** telle que au moins 25% des valeurs de la série soit inférieure à cette valeur. Une telle valeur est appelée le **premier quartile** de la série statistique.
Proposer une valeur pour Q₁.
4. On veut trouver une valeur de la série, notée **Q₃** telle que au moins 75% des valeurs de la série soit inférieure à cette valeur. Une telle valeur est appelée le **troisième quartile** de la série statistique.
Proposer une valeur pour Q₃.

Partager une série !

Les anacondas sont des serpents aquatiques d'Amérique du Sud.
Dans le tableau ci-dessous, on a relevé la taille de 100 femelles adultes.

Taille (en m)	4	5	6	7	8	9
Effectif	7	22	14	20	19	18

1. Donner les effectifs et les fréquences cumulées de cette série.
2. On veut trouver une valeur, notée **Me**, telle que la moitié des valeurs de la série soit inférieure à cette valeur et telle que la moitié des valeurs de la série soit supérieure à cette valeur. Une telle valeur est appelée la **médiane** de la série statistique.
Proposer une valeur pour Me.
3. On veut trouver une valeur de la série, notée **Q₁** telle que au moins 25% des valeurs de la série soit inférieure à cette valeur. Une telle valeur est appelée le **premier quartile** de la série statistique.
Proposer une valeur pour Q₁.
4. On veut trouver une valeur de la série, notée **Q₃** telle que au moins 75% des valeurs de la série soit inférieure à cette valeur. Une telle valeur est appelée le **troisième quartile** de la série statistique.
Proposer une valeur pour Q₃.

Partager une série !

Les anacondas sont des serpents aquatiques d'Amérique du Sud.
Dans le tableau ci-dessous, on a relevé la taille de 100 femelles adultes.

Taille (en m)	4	5	6	7	8	9
Effectif	7	22	14	20	19	18

1. Donner les effectifs et les fréquences cumulées de cette série.
2. On veut trouver une valeur, notée **Me**, telle que la moitié des valeurs de la série soit inférieure à cette valeur et telle que la moitié des valeurs de la série soit supérieure à cette valeur. Une telle valeur est appelée la **médiane** de la série statistique.
Proposer une valeur pour Me.
3. On veut trouver une valeur de la série, notée **Q₁** telle que au moins 25% des valeurs de la série soit inférieure à cette valeur. Une telle valeur est appelée le **premier quartile** de la série statistique.
Proposer une valeur pour Q₁.
4. On veut trouver une valeur de la série, notée **Q₃** telle que au moins 75% des valeurs de la série soit inférieure à cette valeur. Une telle valeur est appelée le **troisième quartile** de la série statistique.
Proposer une valeur pour Q₃.