

Mathématiques – Première spécialité

Corrigés des exercices

Table des matières

1	Le second degré : équations et paraboles	2
2	Probabilités	11
3	Suites numériques	18
4	Le second degré : signe et factorisation	26
5	Trigonométrie	35
6	Dérivation	45
7	Variables aléatoires	53
8	Produit scalaire	60
9	Variations des fonctions	74
10	Suites arithmétiques, suites géométriques	83
11	Géométrie repérée	95
12	Fonction exponentielle	106
13	Programmation	111

1 Le second degré : équations et paraboles

Dans chaque exercice, on note \mathcal{S} l'ensemble des solutions des équations.

Exercice 1 1. On résout l'équation $x^2 + 2x = 0$:

On factorise :

$$x(x+2) = 0.$$

Un produit de facteurs est nul lorsque l'un des facteurs est nul, donc il y a deux possibilités :

$$\begin{aligned}x = 0 \quad \text{ou} \quad x + 2 &= 0 \\x + \cancel{2} - \cancel{2} &= 0 - 2 \\x &= -2\end{aligned}$$

Conclusion : l'équation a deux solutions : $x = 0$ et $x = -2$. Autrement dit :

$$\mathcal{S} = \{0; -2\}.$$

2. On résout l'équation $x^2 - 16 = 0$:

On « isole » x^2 :

$$\begin{aligned}x^2 - 16 &= 0 \\x^2 - \cancel{16} + \cancel{16} &= 0 + 16 \\x^2 &= 16\end{aligned}$$

Comme 16 est positif, il y a deux solutions :

$$x = \sqrt{16} = 4 \quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{16} = -4.$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \{4; -4\}.$$

3. On résout l'équation $(2x - 1)(x - 5) = 0$:

$$\begin{aligned}2x - 1 &= 0 \quad \text{ou} \quad x - 5 = 0 \\2x - \cancel{1} + \cancel{1} &= 0 + 1 \quad \text{ou} \quad x - \cancel{5} + \cancel{5} = 0 + 5 \\ \frac{\cancel{2}x}{\cancel{2}} &= \frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad x = 5 \\x &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{1}{2}; 5 \right\}.$$

4. On résout l'équation $x^2 + 7 = 0$:

$$\begin{aligned}x^2 + 7 &= 0 \\x^2 + \cancel{7} - \cancel{7} &= 0 - 7 \\x^2 &= -7\end{aligned}$$

Il n'y a pas de solution, car un carré est positif (donc aucun nombre x ne peut avoir un carré égal à -7).

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

(On rappelle que \emptyset désigne l'ensemble vide : l'ensemble qui ne contient aucun élément.)

Exercice 2 Dans chaque cas, on note Δ le discriminant.

1. On résout l'équation $x^2 - 3x - 4 = 0$:

- $a = 1, b = -3, c = -4$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) - \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{3 - 5}{2} = -1,$$
$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) + \sqrt{25}}{2} = \frac{3 + 5}{2} = 4.$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \{-1; 4\}.$$

2. On résout l'équation $2x^2 - 12x = -18$:

On se ramène d'abord à la situation du cours (équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$) en « transposant -18 » :

$$2x^2 - 12x + 18 = -18 + 18$$
$$2x^2 - 12x + 18 = 0$$

- $a = 2, b = -12, c = 18$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4 \times 2 \times 18 = 144 - 144 = 0$.
- $\Delta = 0$, donc il y a une seule solution :

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-12)}{2 \times 2} = \frac{12}{4} = 3.$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \{3\}.$$

3. On résout l'équation $x^2 - 4x + 5 = 0$:

- $a = 1, b = -4, c = 5$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 16 - 20 = -4$.
- $\Delta < 0$, donc il n'y a pas de solution.

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

4. On résout l'équation $x^2 + 2x - 4 = 0$:

- $a = 1, b = 2, c = -4$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 4 + 16 = 20$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 - \sqrt{20}}{2 \times 1} = \frac{-2 - \sqrt{20}}{2},$$
$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 + \sqrt{20}}{2 \times 1} = \frac{-2 + \sqrt{20}}{2}.$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{-2 - \sqrt{20}}{2}; \frac{-2 + \sqrt{20}}{2} \right\}.$$

Remarque : On peut écrire les solutions de façon plus élégante : sachant que

$$\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = \sqrt{4} \times \sqrt{5} = 2 \times \sqrt{5},$$

on trouve

$$x_2 = \frac{-2 + \sqrt{20}}{2} = \frac{-2 + 2\sqrt{5}}{2} = \frac{\cancel{2}(-1 + \sqrt{5})}{\cancel{2}} = -1 + \sqrt{5}.$$

De même, $x_1 = -1 - \sqrt{5}$.

5. On résout l'équation $x^2 = -6x$:

À partir de maintenant, on s'autorise à aller un peu plus vite : on transpose directement le « $-6x$ » dans le membre de gauche, qui devient « $+6x$ ».

$$\begin{aligned}x^2 &= -6x \\x^2 + 6x &= 0.\end{aligned}$$

Ici, il y a deux méthodes possibles :

- soit on utilise le discriminant, avec $a = 1$, $b = 6$ et $c = 0$ (puisque $x^2 + 6x = 1x^2 + 6x + 0$) ;
- soit on factorise.


On utilise la deuxième méthode, qui est plus rapide¹ :

$$\begin{aligned}x(x+6) &= 0 \\x = 0 \quad \text{ou} \quad x+6 &= 0 \\x &= -6.\end{aligned}$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \{0; -6\}.$$

Exercice 3 On commence par un schéma indicatif, qui n'est bien sûr pas à l'échelle puisqu'on ne connaît pas x .



D'après le théorème de Pythagore :

$$x^2 + (x+7)^2 = 17^2.$$

On développe $(x+7)^2$ avec l'identité remarquable

$$(a+b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2.$$

L'équation se réécrit :

$$\begin{aligned}x^2 + x^2 + 2 \times x \times 7 + 7^2 &= 289 \\2x^2 + 14x + 49 - 289 &= 0 \\2x^2 + 14x - 240 &= 0.\end{aligned}$$

- $a = 2$, $b = 14$, $c = -240$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = 14^2 - 4 \times 2 \times (-240) = 196 + 1920 = 2116$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-14 - \sqrt{2116}}{2 \times 2} = \frac{-14 - 46}{4} = -15, \\x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-14 + \sqrt{2116}}{2 \times 2} = \frac{-14 + 46}{4} = 8.\end{aligned}$$

Or x désigne une longueur, donc la première solution (x_1) est impossible. On a donc $x = 8$.

Remarque : Ce n'est pas demandé, mais on peut donner la longueur des trois côtés :


$$x = 8, \quad x+7 = 8+7 = 15 \quad \text{et} \quad 17.$$

On peut alors vérifier que

$$8^2 + 15^2 = 17^2.$$

1. De plus, il y a un gros risque d'erreur de résolution lorsqu'on utilise la méthode avec Δ dans le cas où b ou c valent 0.

Exercice 4 1. Voici un schéma du terrain en notant x la largeur de la pelouse (donc la longueur est $2x$) :



2. La longueur du terrain (en m) est

$$2x + 3 + 3 = 2x + 6,$$

sa largeur est

$$x + 3 + 3 = x + 6.$$

Donc la surface du terrain (en m^2) est

$$\text{longueur} \times \text{largeur} = (2x + 6) \times (x + 6).$$

Or on sait que cette surface vaut 360 m^2 , donc

$$(2x + 6) \times (x + 6) = 360.$$

3. On résout l'équation obtenue dans la question précédente² :

$$\begin{aligned} (2x + 6) \times (x + 6) &= 360 \\ \Leftrightarrow 2x \times x + 2x \times 6 + 6 \times x + 6 \times 6 &= 360 \\ \Leftrightarrow 2x^2 + 12x + 6x + 36 &= 360 \\ \Leftrightarrow 2x^2 + 18x + 36 - 360 &= 0 \\ \Leftrightarrow 2x^2 + 18x - 324 &= 0. \end{aligned}$$

Il s'agit d'une équation du second degré.


- $a = 2$, $b = 18$, $c = -324$.
- $\Delta = 18^2 - 4 \times 2 \times (-324) = 2916$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-18 - \sqrt{2916}}{2 \times 2} = \frac{-18 - 54}{4} = \frac{-72}{4} = -18, \\ x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-18 + \sqrt{2916}}{2 \times 2} = \frac{-18 + 54}{4} = \frac{36}{4} = 9. \end{aligned}$$

Or x désigne une longueur, donc x ne peut pas être négatif et seule la solution $x_2 = 9$ est valable.

Conclusion : $x = 9$, donc la longueur du terrain (en m) est $2 \times 9 + 3 + 3 = 24$, sa largeur est $9 + 3 + 3 = 15$.

Exercice 5 On utilise le mètre comme unité de longueur, le mètre carré comme unité de surface. On note x et y les dimensions du champ.



2. Les « \Leftrightarrow » que l'on place entre les lignes se lisent « équivalent à ». Cela signifie que la résolution de l'équation écrite à une ligne est équivalente à la résolution de l'équation écrite à la ligne suivante.

- Le périmètre est 54, donc la moitié du périmètre est

$$x + y = 27.$$

- L'aire est 180, donc

$$x \times y = 180.$$

On obtient ainsi le système

$$\begin{cases} x + y = 27 & L_1 \\ xy = 180 & L_2 \end{cases}$$

On multiplie L_1 par x :

$$(x + y) \times x = 27 \times x, \quad \text{soit} \quad x^2 + xy = 27x.$$

Or d'après L_2 , $xy = 180$, donc

$$x^2 + 180 = 27x, \quad \text{et ainsi} \quad x^2 - 27x + 180 = 0.$$

On aboutit à une équation du 2^d degré. En utilisant la méthode habituelle, on trouve deux solutions (je ne détaille pas) : $x_1 = 12$, $x_2 = 15$.

On sait que $x + y = 27$, donc si $x = 12$, alors $y = 27 - x = 27 - 12 = 15$; et si $x = 15$, alors $y = 27 - x = 27 - 15 = 12$.

Dans les deux cas, on obtient un champ qui mesure 12 m sur 15 m.

Exercice 6 On note n le nombre d'amis initialement présents, et p le prix à payer par chacun (en euros).

- Le montant total de la location est 2 400 €, donc

$$n \times p = 2400. \quad (1)$$

- Si deux amis s'en vont, le montant individuel augmente de 40 €. On a donc dans ce cas $(n - 2)$ amis, et chacun paye alors $(p + 40)$ €. En revanche, le montant total de la location ne change pas, il vaut toujours 2 400 €. On en déduit

$$(n - 2) \times (p + 40) = 2400.$$

En développant, cela donne encore

$$np + 40n - 2p - 80 = 2400. \quad (2)$$

On compare (1) et (2) : comme les membres de droite valent 2400 dans les deux cas, on obtient l'égalité

$$np = np + 40n - 2p - 80,$$

soit

$$40n - 2p - 80 = 0.$$

Finalement, le couple (n, p) est solution du système

$$\begin{cases} n \times p = 2400 \\ 40n - 2p - 80 = 0. \end{cases}$$

On résout ce système comme dans l'exercice 5 (je ne détaille pas) et l'on obtient

$$n = 12, \quad p = 200.$$

Conclusion : comme $12 - 10 = 2$, ce sont 10 amis qui sont finalement partis.

Exercice 7 1. $P_1 : y = x^2 - 6x + 5$.

- $a = 1$, $b = -6$, $c = 5$.
- a est \oplus , donc P_1 est vers le haut.
- On note S le sommet de P_1 . D'après le cours

$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2 \times 1} = \frac{6}{2} = 3.$$

On en déduit

$$y_S = 3^2 - 6 \times 3 + 5 = 9 - 18 + 5 = -4.$$

On a donc $S(3; -4)$.

Venons-en au tracé de la parabole. On fait un tableau de valeurs sur $[0; 6]$, avec un pas de 1³. Pour cela, on utilise la calculatrice :


3. Nous choisissons un intervalle symétrique par rapport à l'abscisse du sommet, et qui ne soit ni trop court, ni trop long. On choisit un pas de 1 par facilité, mais le graphique serait bien sûr plus précis avec un pas plus petit.

Calculatrices collège

- **MODE** ou **MENU**
- 4 : TABLE ou 4 : Tableau
- $f(X)=X^2-6X+5$ **EXE**
(si on demande $g(X)=$, ne rien rentrer)
- Début? 0 **EXE**
- Fin? 6 **EXE**
- Pas? 1 **EXE**

NUMWORKS

x s'obtient avec les touches

- **alpha** **x**
- 
- Fonctions **EXE** puis choisir Fonctions **EXE**
- $f(x)=x^2-6x+5$ **EXE**
- choisir Tableau **EXE** puis Régler l'intervalle **EXE**
- X début 0 **EXE**
- X fin 6 **EXE**
- Pas 1 **EXE**
- choisir Valider

TI graphiques

X s'obtient avec la touche

- x, t, θ, n
- $f(x)$
- $Y_1 = X^2 - 6X + 5$ **EXE**
- 2nde **déf table**
- DébTable=0 **EXE**
- PasTable=1 **EXE**
ou $\Delta Tbl=1$ **EXE**
- 2nde **table**

CASIO graphiques


X s'obtient avec la touche **X,θ,T**

- **MENU** puis choisir TABLE **EXE**
- $Y_1 : X^2 - 6X + 5$ **EXE**
- **F5** (on choisit donc SET)
- Start : 0 **EXE**
- End : 6 **EXE**
- Step : 1 **EXE**
- **EXIT**
- **F6** (on choisit donc TABLE)

On obtient le tableau de valeurs :

x	0	1	2	3	4	5	6
y	5	0	-3	-4	-3	0	5

Enfin on construit le graphique (j'ai un peu « écrasé » l'axe des ordonnées pour gagner de la place) :



Remarque : On peut avoir intérêt à ajouter des points près du sommet pour obtenir un tracé plus précis. C'est ce que l'on a fait ci-dessus avec les deux losanges rouges, correspondant au tableau de valeurs ci-dessous.

x	2,5	3,5
y	-3,75	-3,75

2. $P_2 : y = -0,5x^2 - x + 4$.

- $a = -0,5$, $b = -1$, $c = 4$.
- a est \ominus , donc P_2 est vers le bas.
- On note S le sommet de P_2 . D'après le cours

$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{-1}{2 \times (-0,5)} = \frac{1}{-1} = -1.$$

On en déduit


$$y_S = -0,5 \times (-1)^2 - (-1) + 4 = -0,5 + 1 + 4 = 4,5.$$

On a donc $S(-1 ; 4,5)$.

Tableau de valeurs :


x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	0	2,5	4	4,5	4	2,5	0

Tracé de la parabole :



Exercice 8 1. On trace la parabole P :

- qui coupe l'axe des abscisses en $x_1 = -1$ et en $x_2 = 3$.
- dont le sommet est le point $S(1;2)$.




Remarque : Il est difficile de faire un tracé hyper précis avec si peu d'informations. L'élève intéressé peut essayer de prouver – en faisant un bel effort – que $f(x) = -0,5x^2 + x + 1,5$. Auquel cas, il pourra faire un tableau de valeurs et obtenir une courbe presque aussi parfaite que celle dessinée ci-dessus avec l'ordinateur.

2. On pose $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Comme P est vers le bas, a est du signe \ominus .
- Comme P coupe l'axe des abscisses en deux points, il y a deux racines et Δ est du signe \oplus .

Exercice 9 La trajectoire de la balle en fonction du temps est la parabole $P : y = -0,525t^2 + 2,1t + 1,9$, tracée ci-dessous :



1. Clément commence sa passe à la hauteur

$$h(0) = -0,525 \times 0 + 2,1 \times 0 + 1,9 = 1,9 \text{ mètres.}$$

Cela correspond au point bleu sur la figure.

2. La hauteur maximale de la balle est l'ordonnée du sommet S de la parabole, en rouge sur la figure.

- $a = -0,525$, $b = 2,1$, $c = 1,9$.
- On calcule avec la formule :

$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{2,1}{2 \times (-0,525)} = \frac{-2,1}{-1,05} = 2.$$

On en déduit

$$y_S = -0,525 \times 2^2 + 2,1 \times 2 + 1,9 = 4,$$

et donc la hauteur maximale de la balle est de 4 mètres.

3. Pour déterminer le temps de vol de la balle, on cherche à quel moment elle retombe au sol (point vert sur la figure). On résout donc l'équation

$$-0,525t^2 + 2,1t + 1,9 = 0.$$

- $\Delta = 2,1^2 - 4 \times (-0,525) \times 1,9 = 8,4$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :


$$t_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2,1 - \sqrt{8,4}}{2 \times (-0,525)} \approx 4,76,$$

$$t_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2,1 + \sqrt{8,4}}{2 \times (-0,525)} \approx -0,76.$$

La deuxième solution est impossible, car le temps cherché est positif.

Conclusion : la balle retombe au sol après 4,76 secondes environ.

Exercice 10 On a tracé une parabole $P : y = ax^2 + bx + c$.



- $a > 0$, car P est vers la haut.
 - Si $x = 0$, alors $y = a \times 0^2 + b \times 0 + c = c$, donc la P passe par le point de coordonnées $(0; c)$ – autrement dit, elle coupe l'axe des ordonnées en c .
Par lecture graphique, on obtient donc $c < 0$.
 - Il y a deux racines, car P coupe l'axe des abscisses deux fois. On a donc $\Delta > 0$.
2. D'après le cours, $x_S = -\frac{b}{2a}$, donc

$$x_S \times 2a = -\frac{b}{2a} \times 2a$$

$$x_S \times 2a = -b$$

$$-x_S \times 2a = b.$$

On sait que $x_S < 0$ et $a > 0$, donc $b = \underbrace{-x_S}_{\ominus} \times \underbrace{2a}_{\oplus}$ est du signe \oplus : $b > 0$.

Exercice 11 Soit $P : y = ax^2 + bx + c$ une parabole et S son sommet. On sait que $x_S = -\frac{b}{2a}$, donc

$$y_S = a \times \left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b \times \left(-\frac{b}{2a}\right) + c = \cancel{a} \times \frac{b^2}{4\cancel{a}^2} - \frac{b^2 \times \cancel{2}}{2\cancel{a} \times \cancel{2}} + \frac{c \times 4\cancel{a}}{1 \times 4\cancel{a}}$$

$$= \frac{b^2}{4a} - \frac{2b^2}{4a} + \frac{4ac}{4a} = \frac{b^2 - 2b^2 + 4ac}{4a} = \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}.$$

Exercice 12 1. Le coût de fabrication des x objets est

$$C(x) = x^2 + 230x + 325.$$

Chaque objet est vendu 300 €, donc la recette issue de la vente des x objets est

$$R(x) = 300x.$$

On en déduit que le bénéfice est

$$B(x) = \text{Recette} - \text{Coût} = R(x) - C(x) = 300x - (x^2 + 230x + 325) = 300x - x^2 - 230x - 325 = -x^2 + 70x - 325.$$

2. Le bénéfice est une expression du second degré, avec $a < 0$. Il est donc représenté par une parabole orientée vers le bas. Maximiser le bénéfice revient donc à trouver le (l'abscisse du) sommet de cette parabole :

- $a = -1$, $b = 70$, $c = -325$.
- $x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{70}{2 \times (-1)} = \frac{-70}{-2} = 35$.

Conclusion : le bénéfice est maximal lorsqu'on produit et vend 35 objets.

Remarque : Le bénéfice maximal est

$$-35^2 + 70 \times 35 - 325 = 900 \text{ €}.$$

Exercice 13 1. On résout l'équation :

$$\begin{aligned} & x^3 = 2x \\ \Leftrightarrow & x^3 - 2x = 0 \\ \Leftrightarrow & x(x^2 - 2) = 0 \\ \Leftrightarrow & x = 0 \quad \text{ou} \quad x^2 - 2 = 0 \\ \Leftrightarrow & x^2 = 2 \\ \Leftrightarrow & x = \sqrt{2} \quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{2} \end{aligned}$$

Conclusion : il y a trois solutions :

$$\mathcal{S} = \{0; \sqrt{2}; -\sqrt{2}\}.$$

2. (a) Pour démontrer l'égalité, on développe et on réduit le membre de droite : pour tout nombre x ,

$$\begin{aligned} (x+1)(x^2+3x-4) &= x \times x^2 + x \times 3x + x \times (-4) + 1 \times x^2 + 1 \times 3x + 1 \times (-4) \\ &= x^3 + 3x^2 - 4x + x^2 + 3x - 4 \\ &= x^3 + 4x^2 - x - 4. \end{aligned}$$

Conclusion : on a bien

$$x^3 + 4x^2 - x - 4 = (x+1)(x^2+3x-4).$$

- (b) On utilise la factorisation de la question 2.(a) pour résoudre l'équation :

$$\begin{aligned} & x^3 + 4x^2 - x - 4 = 0 \\ \Leftrightarrow & (x+1)(x^2+3x-4) = 0 \\ \Leftrightarrow & x+1 = 0 \quad \text{ou} \quad x^2+3x-4 = 0 \end{aligned}$$

On résout chaque équation séparément :

$$x+1=0 \Leftrightarrow x=-1.$$

L'autre équation est du second degré, on utilise le discriminant :

$$x^2 + 3x - 4 = 0.$$

- $a = 1$, $b = 3$, $c = -4$.
- $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$.

- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 - \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{-3 - 5}{2} = -4,$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 + \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{-3 + 5}{2} = 1.$$

Conclusion : l'équation $x^3 + 4x^2 - x - 4 = 0$ a trois solutions :

$$\mathcal{S} = \{-1; -4; 1\}.$$

2 Probabilités

Exercice 14 1. On traduit les données de l'énoncé par un tableau d'effectif :

	Abonnés au soir	Pas abonnés au soir	Total
Abonnés au matin	50	20	70
Pas abonnés au matin	50	160	210
Total	100	180	280

2. (a) $P(S) = \frac{100}{280} = \frac{5}{14}$ et $P(\overline{M}) = \frac{210}{280} = \frac{3}{7}$.

- (b) • L'événement « le pensionnaire est abonné aux deux journaux » s'écrit $S \cap M$ ⁴. On a

$$P(S \cap M) = \frac{50}{280} = \frac{5}{28}.$$

- L'événement « le pensionnaire est abonné à au moins un journal » s'écrit $S \cup M$ ⁵. Il y a plusieurs façons de dénombrer les cas favorables à cet événement :

- ▶ ajouter les pensionnaires qui sont abonnés au *Soir* et ceux qui sont abonnés au *Matin*, puis retrancher ceux qui sont abonnés aux deux journaux (sinon ils sont comptés deux fois) : $100 + 70 - 50 = 120$.
- ▶ ajouter ceux qui ne sont abonnés qu'au *Soir*, ceux qui ne sont abonnés qu'au *Matin*, et ceux qui sont abonnés aux deux journaux : $50 + 20 + 50 = 120$.
- ▶ retrancher l'effectif de pensionnaires qui ne sont abonnés à aucun journal de l'effectif total : $280 - 160 = 120$.

Quelle que soit la méthode de calcul, on obtient :

$$P(S \cup M) = \frac{120}{280} = \frac{3}{7}.$$

- (c) On choisit au hasard un pensionnaire abonné au *Matin*. La probabilité qu'il soit aussi abonné au *Soir* est⁶

$$P_M(S) = \frac{50}{70} = \frac{5}{7}.$$

Exercice 15 1. Le candidat connaît 3 des questions d'histoire, donc $P(H) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; et il connaît 2 des 5 questions de géographie, donc $P(G) = \frac{2}{5}$.

2. Pour simplifier et sans rien enlever à la généralité du raisonnement, on suppose que les questions sont numérotées de 1 à 6 en histoire et de 1 à 5 en géographie, et que le candidat connaît les questions n°1, 2, 3 en histoire, n°1 et 2 en géographie. Dans le tableau ci-dessous, les questions connues sont écrites en bleu, les questions inconnues sont écrites en rouge.

On a colorié les cases de trois couleurs :

- en vert : le candidat connaît les deux questions ;
- en orange : le candidat connaît une seule des deux questions ;
- en magenta : le candidat ne connaît aucune des deux questions.

4. On rappelle que \cap se lit « inter » et correspond au mot français « ET ».

5. On rappelle que \cup se lit « union » et correspond au mot français « OU ».

6. On utilise la notation des probabilités conditionnelles, qui sera vue dans le paragraphe 2 du cours.

Hist \ Géo	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						

6 des 30 cases sont coloriées en vert, donc la probabilité que le candidat connaisse les deux questions est

$$P(G \cap H) = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}.$$

3. $6 + 15 = 21$ des 30 cases sont coloriées en vert ou en orange, donc la probabilité que le candidat connaisse au moins l'une des deux questions est

$$P(G \cup H) = \frac{21}{30} = \frac{7}{10}.$$

Remarque : On peut aussi obtenir 21 avec le calcul $30 - 9$, ou utiliser la formule du cours de 2^{de} :

$$P(G \cup H) = P(G) + P(H) - P(G \cap H) = \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{5} = \frac{5}{10} + \frac{4}{10} - \frac{2}{10} = \frac{7}{10}.$$


Exercice 16 On utilise un tableau à double entrée. On place un symbole dans chacune des cases favorable à l'événement

A : « les deux dés montrent la même couleur ».

Dé n°2 \ Dé n°1	■	■	■	■	□	□
■	★	★				
■	★	★				
■			★	★		
■			★	★		
□					★	★
□					★	★

Il y a 12 cases favorables à A sur 36, donc $P(A) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$.

Exercice 17 1. On représente la situation par un arbre pondéré :




2. D'après l'arbre :

- $P(M \cap T) = 0,60 \times 0,95 = 0,57$;
- D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que le test soit positif est :

$$\begin{aligned}
 P(T) &= P(M \cap T) + P(\overline{M} \cap T) \\
 &= 0,60 \times 0,95 + 0,40 \times 0,10 = 0,61.
 \end{aligned}$$


Exercice 18 1. On représente la situation par un arbre pondéré :



2. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que la pièce ait un défaut est :

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A \cap D) + P(\bar{A} \cap D) \\ &= 0,70 \times 0,02 + 0,30 \times 0,03 = 0,023. \end{aligned}$$


Exercice 19 Rappelons pour commencer que 6 des 26 lettres de l'alphabet sont des voyelles : A – E – I – O – U – Y. Venons-en à l'arbre pondéré. Notons que si une première voyelle a été tirée, il reste 25 jetons dans le sac, parmi lesquels ne figurent plus que 5 voyelles. Cela explique le $\frac{5}{25}$ ci-dessous; et avec un raisonnement similaire, on justifie tous les nombres sur les branches de droite.



L'événement A : « on tire une voyelle et une consonne (dans n'importe quel ordre) » est réalisé quand on prend l'un des deux chemins $V_1 \cap \bar{V}_2$, ou bien $\bar{V}_1 \cap V_2$, donc

$$P(A) = P(V_1 \cap \bar{V}_2) + P(\bar{V}_1 \cap V_2) = \frac{6}{26} \times \frac{20}{25} + \frac{20}{26} \times \frac{6}{25} = \frac{120}{650} + \frac{120}{650} = \frac{240}{650} = \frac{24}{65}.$$


Exercice 20 Une urne contient 8 boules blanches et 2 boules noires, indiscernables au toucher. On tire sans remise et successivement 3 boules de cette urne.



Pour $i = 1, 2, 3$, on considère l'événement

A_i : « la i -ème boule tirée est blanche ».

1. On représente la situation par un arbre pondéré :



2. Le contraire de

B : « on a tiré au moins une boule noire »

est

\overline{B} : « on n'a tiré que des boules blanches ».


D'après l'arbre (chemin tout en haut)

$$P(\overline{B}) = \frac{8}{10} \times \frac{7}{9} \times \frac{6}{8} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15},$$


donc

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15}.$$

Exercice 21 1. On rappelle les zones de tir à 2 et 3 points :



On représente la situation par un arbre pondéré :



Remarque : \overline{D} signifie « Stephen Curry tire à 3 points ».

2. La probabilité que Stephen Curry tire à 2 points et marque est

$$P(D \cap M) = 0,53 \times 0,52 = 0,2756.$$


3. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que Stephen Curry marque est :

$$\begin{aligned}
 P(M) &= P(D \cap M) + P(\overline{D} \cap M) \\
 &= 0,53 \times 0,52 + 0,47 \times 0,44 = 0,4824.
 \end{aligned}$$

4. Stephen Curry a marqué. La probabilité qu'il ait tiré à deux points est

$$P_M(D) = \frac{P(M \cap D)}{P(M)} = \frac{0,2756}{0,4824} \approx 0,57.$$

Exercice 22 1. On commence par faire un arbre pondéré. Comme un appareil en parfait état de fonctionnement est toujours accepté à l'issue du test, il y a un 1 et un 0 sur les branches en haut à droite.



On en vient au calcul des probabilités demandé par l'énoncé :


- $P(\overline{F} \cap T) = \frac{1}{10} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{110}$;
- d'après la formule des probabilités totales :

$$P(T) = P(F \cap T) + P(\overline{F} \cap T) = \frac{9}{10} \times 1 + \frac{1}{10} \times \frac{1}{11} = \frac{9}{10} + \frac{1}{110} = \frac{99}{110} + \frac{1}{110} = \frac{100}{110} = \frac{10}{11}.$$

2. Sachant qu'un appareil a été accepté à l'issue du test, la probabilité qu'il ne fonctionne pas parfaitement est

$$P_T(\overline{F}) = \frac{P(\overline{F} \cap T)}{P(T)} = \frac{\frac{1}{110}}{\frac{10}{11}} = \frac{1}{110} \times \frac{11}{10} = \frac{11}{1100} = \frac{1}{100}.$$

Exercice 23 1. On construit l'arbre et on le complète à partir des données de l'énoncé :



2. $P(R \cap J) = 0,17 \times 0,32 = 0,0544.$

3. L'énoncé donne $P(J) = 0,11$. On utilise la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}
 P(J) &= P(R \cap J) + P(\overline{R} \cap J) \\
 0,11 &= 0,0544 + P(\overline{R} \cap J) \\
 0,11 - 0,0544 &= P(\overline{R} \cap J) \\
 0,0556 &= P(\overline{R} \cap J)
 \end{aligned}$$

Conclusion : $P(\overline{R} \cap J) = 0,0556.$


4. La proportion de jeunes de 18 à 24 ans parmi les utilisateurs non réguliers des transports en commun est égale à la probabilité qu'un utilisateur non régulier soit un jeune. Cette proportion vaut donc

$$P_{\overline{R}}(J) = \frac{P(\overline{R} \cap J)}{P(\overline{R})} = \frac{0,0556}{0,83} \approx 0,0670.$$

C'est le point d'interrogation rouge de l'arbre pondéré du début.

Exercice 24 Il faut prendre l'initiative de nommer des événements et de construire un arbre pondéré. On pose ainsi :

- E : « le dé est équilibré »,
- \overline{E} : « le dé est pipé »,
- S : « on obtient 6 ».



La probabilité qu'il faut calculer est $P_S(\overline{E})$. On utilise la formule des probabilités conditionnelles :

$$P_S(\overline{E}) = \frac{P(\overline{E} \cap S)}{P(S)}.$$

Or $P(\overline{E} \cap S) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ et $P(S) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{24} + \frac{1}{8} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ (formule des probabilités totales), donc :

$$P_S(\overline{E}) = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{8} \times \frac{4}{1} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

Exercice 25 Il faut calculer $P_B(\overline{A_1})$. On utilise la formule du cours :

$$P_B(\overline{A_1}) = \frac{P(\overline{A_1} \cap B)}{P(B)}.$$

L'événement $\overline{A_1} \cap B$ est égal à $\overline{A_1}$, puisque si la première boule tirée est noire, alors on en a au moins une noire. On a donc $P(\overline{A_1} \cap B) = P(\overline{A_1}) = \frac{2}{10}$, puis finalement ⁷ :

$$P_B(\overline{A_1}) = \frac{P(\overline{A_1} \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{2}{10}}{\frac{8}{15}} = \frac{2}{10} \times \frac{15}{8} = \frac{30}{80} = \frac{3}{8}.$$

Exercice 26 • Les nombres pairs sont 2, 4, 6, ..., 100. Il y en a 50, donc

$$P(A) = \frac{50}{100} = 0,5.$$

7. On rappelle que $P(B)$ a été calculé dans l'exercice 20.

- Les multiples de 5 sont

$$5 = 5 \times 1, 10 = 5 \times 2, 15 = 5 \times 3, \dots, 100 = 5 \times 20.$$

Il y en a 20, donc

$$P(B) = \frac{20}{100} = 0,2.$$

- L'événement $A \cap B$ s'écrit « le nombre est pair et multiple de 5 », ou de façon plus simple (et plus explicite) « le nombre est multiple de 10 ». Or les multiples de 10 sont 10, 20, 30, ..., 100, et comme il y en a 10,

$$P(A \cap B) = \frac{10}{100} = 0,1.$$

- On calcule le produit

$$P(A) \times P(B) = 0,5 \times 0,2 = 0,1.$$


On constate que

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0,1,$$

donc A et B sont indépendants.

Remarque : La raison profonde de l'indépendance de A et B est que 100 est un multiple de 2 et de 5 d'une part, et que 2 et 5 sont premiers entre eux d'autre part.

Exercice 27



- D'un côté $P(R) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ et $P(U) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, donc

$$P(R) \times P(U) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

D'un autre côté, $R \cap U$ est réalisé quand on tire le jeton 1, donc

$$P(R \cap U) = \frac{1}{6}.$$

Conclusion : $P(R \cap U) \neq P(R) \times P(U)$, donc les événements R et U ne sont pas indépendants.

- D'un côté $P(R) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ et $P(D) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, donc

$$P(R) \times P(D) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

D'un autre côté, $R \cap D$ est réalisé quand on tire le jeton 2, donc

$$P(R \cap D) = \frac{1}{6}.$$

Conclusion : $P(R \cap D) = P(R) \times P(D)$, donc les événements R et U sont indépendants.

Exercice 28 Les trois questions sont indépendantes.

1. D'après une formule du cours de 2^{de},

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,4 + 0,6 - 0,9 = 0,1.$$

D'un côté $P(A) \times P(B) = 0,4 \times 0,6 = 0,24$, de l'autre $P(A \cap B) = 0,1$; donc $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$.

Conclusion : A et B ne sont pas indépendants.

2. D'après la formule du cours de 2^{de} déjà utilisée dans la question 1 et la propriété d'indépendance :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \times P(B) \quad (\text{on utilise l'indépendance})$$

$$0,7 = 0,4 + P(B) - 0,4 \times P(B)$$

$$0,7 = 0,4 + x - 0,4x \quad (\text{on pose } x = P(B))$$

$$0,7 = 0,4 + 0,6x$$

$$0,7 - 0,4 = 0,6x \quad (\text{on résout l'équation})$$

$$\frac{0,3}{0,6} = \frac{0,6x}{0,6}$$

$$0,5 = x.$$

Conclusion : $P(B) = 0,5$.

3. Un événement A est indépendant de lui-même si, et seulement si

$$P(A \cap A) = P(A) \times P(A). \quad (3)$$

Or $A \cap A = A$, donc $P(A \cap A) = P(A)$, et l'égalité (3) ci-dessus se réécrit

$$P(A) = (P(A))^2.$$

On pose $x = P(A)$, on est ramené à résoudre l'équation $x = x^2$:

$$x = x^2 \iff x - x^2 = 0 \iff x(1 - x) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 1.$$

Conclusion : A est indépendant de lui-même lorsque $P(A) = 0$ (A est alors un événement impossible) ou lorsque $P(A) = 1$ (A est alors un événement certain).

3 Suites numériques

Exercice 29 1. $u_n = 0,5n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} u_0 &= 0,5 \times 0 - 3 \\ u_0 &= -3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_1 &= 0,5 \times 1 - 3 \\ u_1 &= -2,5. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= 0,5 \times 2 - 3 \\ u_2 &= -2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_3 &= 0,5 \times 3 - 3 \\ u_3 &= -1,5. \end{aligned}$$

2. $v_n = 1 - \frac{1}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} v_1 &= 1 - \frac{1}{1} \\ v_1 &= 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_2 &= 1 - \frac{1}{2} \\ v_2 &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_3 &= 1 - \frac{1}{3} \\ v_3 &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_4 &= 1 - \frac{1}{4} \\ v_4 &= \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

3. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 10 - u_n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}. \end{cases}$

Avec $n = 0$:

$$\begin{aligned} u_{0+1} &= 10 - u_0 \\ u_1 &= 10 - 2 \\ u_1 &= 8. \end{aligned}$$

Avec $n = 1$:

$$\begin{aligned} u_{1+1} &= 10 - u_1 \\ u_2 &= 10 - 8 \\ u_2 &= 2. \end{aligned}$$

Avec $n = 2$:

$$\begin{aligned} u_{2+1} &= 10 - u_2 \\ u_3 &= 10 - 2 \\ u_3 &= 8. \end{aligned}$$

Avec $n = 3$:

$$\begin{aligned} u_{3+1} &= 10 - u_3 \\ u_4 &= 10 - 8 \\ u_4 &= 2. \end{aligned}$$

On obtient la suite périodique $(2; 8; 2; 8; 2; \dots)$.

4. $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 4u_n.$$

Avec $n = 0$:

$$u_{0+1} = 4u_0$$

$$u_1 = 4 \times 1$$

$$u_1 = 4.$$

Avec $n = 1$:

$$u_{1+1} = 4u_1$$

$$u_2 = 4 \times 4$$

$$u_2 = 16.$$

Avec $n = 2$:

$$u_{2+1} = 4u_2$$

$$u_3 = 4 \times 16$$

$$u_3 = 64.$$

Avec $n = 3$:

$$u_{3+1} = 4u_3$$

$$u_4 = 4 \times 64$$

$$u_4 = 256.$$

5. $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \frac{v_n}{v_n + 2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Avec $n = 0$:

$$v_{0+1} = \frac{v_0}{v_0 + 2}$$

$$v_1 = \frac{1}{1 + 2}$$

$$v_1 = \frac{1}{3}.$$

Avec $n = 1$:

$$v_{1+1} = \frac{v_1}{v_1 + 2}$$

$$v_2 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + 2}$$

$$v_2 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{6}{3}}$$

$$v_2 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{7}{3}}$$

$$v_2 = \frac{1}{3} \times \frac{3}{7}$$

$$v_2 = \frac{1}{7}.$$

Avec $n = 2$:

$$v_{2+1} = \frac{v_2}{v_2 + 2}$$

$$v_3 = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{1}{7} + 2}$$

$$v_3 = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{1}{7} + \frac{14}{7}}$$

$$v_3 = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{15}{7}}$$

$$v_3 = \frac{1}{7} \times \frac{7}{15}$$

$$v_3 = \frac{1}{15}.$$

Avec $n = 3$:

$$v_{3+1} = \frac{v_3}{v_3 + 2}$$

$$v_4 = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{15} + 2}$$

$$v_4 = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{15} + \frac{30}{15}}$$

$$v_4 = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{31}{15}}$$

$$v_4 = \frac{1}{15} \times \frac{15}{31}$$

$$v_4 = \frac{1}{31}.$$

6. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout entier naturel n , où $f(x) = (x + 1)^2$.

Autrement dit, $u_{n+1} = (u_n + 1)^2$.

Avec $n = 0$:

$$u_{0+1} = (u_0 + 1)^2$$

$$u_1 = (0 + 1)^2$$

$$u_1 = 1.$$

Avec $n = 1$:

$$u_{1+1} = (u_1 + 1)^2$$

$$u_2 = (1 + 1)^2$$

$$u_2 = 4.$$

Avec $n = 2$:

$$u_{2+1} = (u_2 + 1)^2$$

$$u_3 = (4 + 1)^2$$

$$u_3 = 25.$$

Avec $n = 3$:

$$u_{3+1} = (u_3 + 1)^2$$

$$u_4 = (25 + 1)^2$$

$$u_4 = 676.$$

7. $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = u_n + n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

⚠ Il y a un gros risque de décalage dans les indices!!

Avec $n = 0$:

$$u_{0+1} = u_0 + 0 - 3$$

$$u_1 = 4 + 0 - 3$$

$$u_1 = 1.$$

Avec $n = 1$:

$$u_{1+1} = u_1 + 1 - 3$$

$$u_2 = 1 + 1 - 3$$

$$u_2 = -1.$$

Avec $n = 2$:

$$u_{2+1} = u_2 + 2 - 3$$

$$u_3 = -1 + 2 - 3$$

$$u_3 = -2.$$

Avec $n = 3$:

$$u_{3+1} = u_3 + 3 - 3$$

$$u_4 = -2 + 3 - 3$$

$$u_4 = -2.$$

8. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, avec $f(x) = x^2 - 2x$.

Autrement dit, $u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n$.

Avec $n = 0$:

$$\begin{aligned}u_{0+1} &= u_0^2 - 2u_0 \\u_1 &= 2^2 - 2 \times 2 \\u_1 &= 0.\end{aligned}$$


Avec $n = 1$:

$$\begin{aligned}u_{1+1} &= u_1^2 - 2u_1 \\u_2 &= 0^2 - 2 \times 0 \\u_2 &= 0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u_{2+1} &= u_2^2 - 2u_2 \\u_3 &= 0^2 - 2 \times 0 \\u_3 &= 0.\end{aligned}$$

La suite est constante égale à 0 à partir du rang 1 : $(2; 0; 0; 0; \dots)$.

Exercice 30 1. $100\% - 15\% = 85\% = 0,85$, donc pour diminuer un nombre de 15 %, il faut le multiplier par 0,85. Ainsi, dans le schéma ci-dessous, l'intensité lumineuse est-elle multipliée par 0,85 à chaque nouvelle plaque :



Remarque : Le lumen est une unité de mesure du flux lumineux, utilisée notamment pour indiquer la capacité d'éclairage des ampoules électriques.

2. La relation de récurrence est

$$u_{n+1} = 0,85 \times u_n \text{ pour tout entier naturel } n.$$

3. L'intensité lumineuse est divisée par 10 lorsqu'on descend en dessous de $12 \div 10 = 1,2$ lm. Pour savoir le nombre minimal de plaques à superposer pour qu'il en soit ainsi, on rentre les valeurs initiales 0 et 12 dans la colonne B, puis on rentre les formules ci-dessous dans la colonne C, que l'on étire vers la droite jusqu'à obtenir une intensité lumineuse inférieure à 1,2.

	A	B	C	...	P	Q
1	Nb de plaques	0	=B1+1	...	14	15
2	Intensité (lm)	12	=B2*0,85	...	1,23	1,05

Conclusion : il faut superposer au moins 15 plaques pour que l'intensité lumineuse soit divisée par 10.

Exercice 31 On administre à un patient un médicament par injection intraveineuse. On programme une machine de façon que :

- à l'instant 0, elle injecte 10 mL de médicament ;
- toutes les minutes, elle injecte 1 mL de médicament.

On estime que 20 % du médicament présent dans le sang est éliminé par minute.

Pour tout entier naturel n , on note w_n la quantité de médicament, en mL, présente dans le sang du patient au bout de n minutes.

1. $w_0 = 10$. C'est la quantité injectée à l'instant 0.

D'une minute à la suivante, 20% du médicament présent dans le sang est éliminé (multiplication par 0,80), puis on injecte 1 mL, donc :

$$\begin{aligned}w_1 &= 0,8 \times w_0 + 1 = 0,8 \times 10 + 1 = 9 \\w_2 &= 0,8 \times w_1 + 1 = 0,8 \times 9 + 1 = 8,2 \\w_3 &= 0,8 \times w_2 + 1 = 0,8 \times 8,2 + 1 = 7,56.\end{aligned}$$

2. D'une manière générale, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$w_{n+1} = 0,8 \times w_n + 1.$$

3. On entre :

	A	B	C	...	AO	AP
1	Temps (min)	0	=B1+1	...	39	40
2	Qtité de médic. (mL)	10	=B2*0,8+1	...	5,0006...	5,0005...

Sur le long terme, la quantité de médicament se rapproche d'une valeur limite : 5 mL (elle s'en rapproche très rapidement, car elle est presque stable au bout de 30 min).

Exercice 32 Le 01/01/2020, on emprunte 10 000 € à la banque au taux d'intérêt mensuel de 2 %. À chaque fin de mois on rembourse 300 €.

Comment ça marche?... Le 01/01/2020 on emprunte 10 000 € au taux d'intérêt mensuel de 2 %, donc à la fin du mois de janvier 2020 la somme à rembourser est passée à


$$1,02 \times 10\,000 = 10\,200 \text{ €}.$$

À ce moment on rembourse 300 €, donc le 01/02/2020 il reste à rembourser

$$10\,200 - 300 = 9\,900 \text{ €}.$$

On note u_n la somme à rembourser le 1^{er} jour du n^{e} mois (en convenant que janvier 2020 est le mois 0, février 2020 le mois 1, etc.). On a donc $u_0 = 10\,000$ et $u_1 = 9\,900$.

1. On complète le schéma ci-dessous pour calculer les termes u_1 et u_2 . Les sommes écrites dans chaque case sont les sommes restant à rembourser aux dates indiquées.



Pour passer d'un terme de la suite au terme suivant, on multiplie par 1,02 (ajout des intérêts) puis on retranche 300 (remboursement mensuel). On peut donc continuer plus rapidement :

$$u_3 = 9\,798 \times 1,02 - 300 = 9\,693,96 \quad (\text{somme à rembourser le 01/04/20}),$$

$$u_4 = 9\,693,96 \times 1,02 - 300 = 9\,587,84 \quad (\text{somme à rembourser le 01/05/20}).$$

Et plus généralement, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = u_n \times 1,02 - 300.$$

2. On entre les formules

$$=B1+1$$

et

$$=B2*1,02-300$$

dans les cellules C1 et C2, puis on étire vers la droite :

	A	B	C	...
1	Nombre de mois	0	=B1+1	...
2	Reste à rembourser	10000	=B2*1,02-300	...

On continue jusqu'à ce que la somme à rembourser soit nulle. En réalité, au bout d'un moment, elle est négative :

	A	...	BD	BE	BF
1	Nombre de mois	...	54	55	56
2	Reste à rembourser	...	432,69	141,35	-155,83

À la fin du 55^e fois, il reste 141,35 € à rembourser; et si on rembourse 300 € au début du 56^e mois, la banque nous devra 155,83 €.

Conclusion :

- le crédit dure 56 mois;
- on rembourse 56 fois 300 €, mais à la fin on a dépassé de 155,83 € ce que l'on devait à la banque;
- la somme totale remboursée est donc

$$56 \times 300 - 155,83 = 16664,17 \text{ €};$$

- le « coût du crédit » est la différence entre ce que l'on a remboursé et ce que la banque nous a prêté :

$$\text{Coût du crédit} = \text{Somme remboursée} - \text{Somme empruntée} = 16664,17 - 10000 = 6664,17 \text{ €}.$$


Exercice 33 La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $u_0 = 0,25$ et pour tout entier naturel n : $u_{n+1} = f(u_n)$, avec $f(x) = -x^2 + 2x$.

1. et 2.

La droite d'équation $y = x$ est tracée en noir.

La fonction f est du second degré, donc sa courbe représentative est une parabole. On la trace (en bleu) à partir d'un tableau de valeurs :

x	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
$f(x)$	0	0,36	0,64	0,84	0,96	1



Parallèlement au graphique, calculons les premiers termes de la suite :

$$u_0 = 0,5$$

$$u_1 = f(u_0) = f(0,5) = -0,5^2 + 2 \times 0,5 = 0,75$$

$$u_2 = f(u_1) = f(0,75) = -0,75^2 + 2 \times 0,75 = 0,9375$$

$$u_3 = f(u_2) = f(0,9375) = -0,9375^2 + 2 \times 0,9375 \approx 0,996$$

($u_3 \approx 0,996$ et $\ell = 1$ se confondent presque.)

3. Un escalier se dessine, qui monte vers le point de coordonnées (1;1). Par conséquent, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ semble converger vers la valeur limite $\ell = 1$. On note :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1.$$

Exercice 34 La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $u_0 = 3$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = -0,5u_n + 1.$$

1.

Avec $n = 0$:

$$u_{0+1} = -0,5 \times u_0 + 1$$

$$u_1 = -0,5 \times 3 + 1$$

$$u_1 = -0,5.$$

Avec $n = 1$:

$$u_{1+1} = -0,5 \times u_1 + 1$$

$$u_2 = -0,5 \times (-0,5) + 1$$

$$u_2 = 1,25.$$

Avec $n = 2$:

$$u_{2+1} = -0,5 \times u_2 + 1$$

$$u_3 = -0,5 \times 1,25 + 1$$

$$u_3 = 0,375.$$


2. et 3. On trace la droite d'équation $y = x$ (en noir), puis la droite d'équation $y = -0,5x + 1$ grâce à un tableau de valeurs (en bleu) :

x	-1	3
y	1,5	-0,5

Calculs correspondants :

$$-0,5 \times (-1) + 3 = 1,5$$

$$-0,5 \times 3 + 3 = -0,5$$



4. On voit se dessiner une spirale, qui s'enroule autour du point d'intersection des deux droites. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ semble donc converger vers une limite ℓ , abscisse de ce point d'intersection. On obtient sa valeur en résolvant l'équation :

$$x = -0,5x + 1 \iff x + 0,5x = 1 \iff 1,5x = 1 \iff x = \frac{1 \times 2}{1,5 \times 2} = \frac{2}{3}.$$

Conclusion : $\ell = \frac{2}{3}$, c'est-à-dire que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{2}{3}.$$

Exercice 35 La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $u_0 = 3$ et pour tout entier naturel n : $u_{n+1} = 1,5u_n - 1$.

1.

Avec $n = 0$:

$$u_{0+1} = 1,5 \times u_0 - 1$$

$$u_1 = 1,5 \times 3 - 1$$

$$u_1 = 3,5.$$

Avec $n = 1$:

$$u_{1+1} = 1,5 \times u_1 - 1$$

$$u_2 = 1,5 \times 3,5 - 1$$

$$u_2 = 4,25.$$

Avec $n = 2$:

$$u_{2+1} = 1,5 \times u_2 - 1$$

$$u_3 = 1,5 \times 4,25 - 1$$

$$u_3 = 5,375.$$


2. et 3. On trace la droite d'équation $y = x$ (en noir), puis la droite d'équation $y = 1,5x - 1$ grâce à un tableau de valeurs (en bleu) :

x	2	6
y	2	8

Calculs correspondants :

$$1,5 \times 2 - 1 = 2$$

$$1,5 \times 6 - 1 = 8$$



4. On voit se dessiner un escalier, qui « monte vers l'infini » :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$$

Exercice 36 1. Pour tout entier naturel n :

$$u_n = 2n + 5.$$

On a donc

$$u_{n+1} = 2(n+1) + 5 = 2n + 2 + 5 = 2n + 7.$$

2. Pour tout entier naturel n :

$$u_n = n^2 + 3n - 5.$$

On a donc

$$u_{n+1} = (n+1)^2 + 3(n+1) - 5 = n^2 + 2n + 1 + 3n + 3 - 5 = n^2 + 5n - 1.$$

3. Pour tout entier naturel n :

$$u_n = \frac{2n-1}{n+1}.$$

On a donc


$$u_{n+1} = \frac{2(n+1)-1}{(n+1)+1} = \frac{2n+2-1}{n+1+1} = \frac{2n+1}{n+2}.$$

Exercice 37 1. Pour tout entier naturel n : $u_{n+1} = -2(n+1) + 4 = -2n - 2 + 4 = -2n + 2$, donc

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (-2n + 2) - (-2n + 4) \\ &= -2n + 2 + 2n - 4 \\ &= \underbrace{-2}_{\ominus}. \end{aligned}$$

Conclusion : $u_{n+1} - u_n \leq 0$, donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

C'est bien naturel, puisque les points sont alignés sur la droite d'équation $y = -2x + 4$ (tracée en pointillés verts), et que cette droite « descend » (son coefficient directeur ($a = -2$) est négatif).




2. Pour tout entier naturel n : $v_{n+1} = (n+1)^2 - (n+1) = n^2 + 2n + 1 - n - 1 = n^2 + n$, donc

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= (n^2 + n) - (n^2 - n) \\ &= n^2 + n - n^2 + n \\ &= \underbrace{2n}_{\oplus}. \end{aligned}$$

Conclusion : $v_{n+1} - v_n \geq 0$, donc $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

C'est à nouveau visible sur la représentation graphique de la suite (points en bleu sur la parabole d'équation $y = x^2 - x$, tracée en pointillés verts).



Exercice 38 Pour tout entier naturel n :

$$x_{n+1} - x_n = (x_n + n) - x_n = x_n + n - x_n = \underbrace{n}_{\oplus}.$$

$x_{n+1} - x_n \geq 0$, donc $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

Exercice 39 La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $w_n = \frac{n}{n+2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Pour tout entier naturel n : $w_{n+1} = \frac{(n+1)}{(n+1)+2} = \frac{n+1}{n+3}$, donc

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= \frac{n+1}{n+3} - \frac{n}{n+2} \\ &= \frac{(n+1) \times (n+2)}{(n+3) \times (n+2)} - \frac{n \times (n+3)}{(n+2) \times (n+3)} \\ &= \frac{n^2 + 2n + n + 2}{(n+2)(n+3)} - \frac{n^2 + 3n}{(n+2)(n+3)} \\ &= \frac{n^2 + 3n + 2 - n^2 - 3n}{(n+2)(n+3)} \\ &= \frac{2}{(n+2)(n+3)}. \end{aligned}$$

2. Soit n un entier naturel. Les trois nombres 2, $(n+2)$ et $(n+3)$ sont positifs, donc d'après la question précédente,

$$w_{n+1} - w_n = \frac{\overbrace{2}^{\oplus}}{\underbrace{(n+2)}_{\oplus} \underbrace{(n+3)}_{\oplus}} \geq 0.$$

La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc croissante.

Exercice 40 La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est définie par $u_n = \frac{2^n}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $u_{n+1} = \frac{2^{n+1}}{n+1}$, donc

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{2^{n+1} \times n}{(n+1) \times n} - \frac{2^n \times (n+1)}{n \times (n+1)} \\ &= \frac{2^n \times 2^1 \times n}{n(n+1)} - \frac{2^n \times (n+1)}{n(n+1)} \quad (\text{rappel : } a^n \times a^m = a^{n+m}) \\ &= \frac{2^n \times 2n}{n(n+1)} - \frac{2^n \times (n+1)}{n(n+1)} \\ &= \frac{2^n \times (2n - n - 1)}{n(n+1)} \\ &= \frac{2^n \times (n-1)}{n(n+1)}. \end{aligned}$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les nombres 2^n , $(n-1)$, n et $(n+1)$ sont positifs, donc d'après la question précédente,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{\overbrace{2^n}^{\oplus} \overbrace{(n-1)}^{\oplus}}{\underbrace{n}_{\oplus} \underbrace{(n+1)}_{\oplus}} \geq 0.$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est donc croissante.

4 Le second degré : signe et factorisation

Dans chaque exercice où on résout une inéquation, on note \mathcal{S} l'ensemble des solutions.

Exercice 41 1. On résout l'équation :

$$2x - 6 = 0 \iff 2x = 6 \iff x = \frac{6}{2} = 3$$

$a = 2 \oplus \implies +$ à droite :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$2x - 6$	$-$	0	$+$

2. On résout l'équation :

$$-2x - 3 = 0 \iff -2x = 3 \iff x = \frac{3}{-2} = -1,5$$

$a = -2 \ominus \implies +$ à gauche :

x	$-\infty$	-1.5	$+\infty$
$-2x - 3$	$+$	0	$-$

3. D'abord on factorise : $x^2 - 3x = x(x-3)$.

On résout :

$$x = 0$$

rien à résoudre!

$a = 1 \oplus$, puisque $x = 1x + 0 \implies +$ à droite

$$x - 3 = 0 \iff x = 3$$

$a = 1 \oplus$, puisque $x - 3 = 1x - 3 \implies +$ à droite

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
x	$-$	0	$+$	$+$	
$x-3$	$-$	$-$	0	$+$	
$x^2-3x=$ $x(x-3)$	$+$	0	$-$	0	$+$

4. D'abord on factorise : $16x^2 - 25 = (4x)^2 - 5^2 = (4x+5)(4x-5)$.
(C'est l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$.)

On résout :

$$4x+5=0 \iff 4x=-5 \iff x=-\frac{5}{4}$$

$a=4 \oplus \implies +$ à droite

$$4x-5=0 \iff 4x=5 \iff x=\frac{5}{4}$$

$a=4 \oplus \implies +$ à droite

x	$-\infty$	$-\frac{5}{4}$	$\frac{5}{4}$	$+\infty$	
$4x+5$	$-$	0	$+$	$+$	
$4x-5$	$-$	$-$	0	$+$	
$16x^2-25$	$+$	0	$-$	0	$+$

Exercice 42 1. Tableau de signe de $x^2 - 5x + 7$.

- $a=1, b=-5, c=7$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 7 = 25 - 28 = -3$;
- $\Delta < 0$, donc il n'y a pas de racine ;
- $a=1, a$ est \oplus .

D'après le théorème 1, $x^2 - 5x + 7$ est positif (c.-à-d. du signe de a) partout. On obtient donc le tableau :

x	$-\infty$	$+\infty$
x^2-5x+7	$+$	

2. Tableau de signe de $-x^2 + 6x - 8$.

- $a=-1, b=6, c=-8$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = 6^2 - 4 \times (-1) \times (-8) = 36 - 32 = 4$;
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 - \sqrt{4}}{2 \times (-1)} = \frac{-6 - 2}{-2} = \frac{-8}{-2} = 4,$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 + \sqrt{4}}{2 \times (-1)} = \frac{-6 + 2}{-2} = \frac{-4}{-2} = 2.$$

- $a=-1, a$ est \ominus .

D'après le théorème 1, $-x^2 + 6x - 8$ est négatif (c.-à-d. du signe de a), sauf entre les racines 2 et 4. On obtient donc le tableau :

x	$-\infty$	2	4	$+\infty$	
$-x^2+6x-8$	$-$	0	$+$	0	$-$

Exercice 43 1. On résout l'inéquation $x^2 \leq -2x + 1$.

On transpose :

$$x^2 \leq -2x + 1 \iff x^2 + 2x - 1 \leq 0.$$

On construit le tableau de signe de $x^2 + 2x - 1$:

- $a = 1, b = 2, c = -1$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 4 + 4 = 8$;
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 - \sqrt{8}}{2 \times 1} = \frac{-2 - \sqrt{4 \times 2}}{2} = \frac{-2 - 2\sqrt{2}}{2} = \frac{\cancel{2}(-1 - \sqrt{2})}{\cancel{2}} = -1 - \sqrt{2},$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 + \sqrt{8}}{2 \times 1} = -1 + \sqrt{2}.$$

- $a = 1, a$ est \oplus .

D'après le théorème 1, $x^2 + 2x - 1$ est positif (c.-à-d. du signe de a), sauf entre les racines $-1 - \sqrt{2}$ et $-1 + \sqrt{2}$. On obtient donc le tableau :

x	$-\infty$	$-1-\sqrt{2}$	$-1+\sqrt{2}$	$+\infty$	
x^2+2x-1	+	0	-	0	+

On lit les solutions de l'inéquation dans le tableau de signe : $x^2 + 2x - 1 \leq 0$ (c.-à-d du signe \ominus) lorsque $x \in [-1 - \sqrt{2}; -1 + \sqrt{2}]$ (case centrale du tableau), donc

$$\mathcal{S} = [-1 - \sqrt{2}; -1 + \sqrt{2}].$$

2. On résout l'inéquation $x \leq x^2$.

On transpose :

$$x \leq x^2 \iff x - x^2 \leq 0.$$

On construit le tableau de signe de $x - x^2$:

Ici, il est plus rapide de factoriser pour obtenir les racines que d'utiliser le discriminant.

$$x - x^2 = 0 \iff x(1 - x) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 1.$$

D'après le théorème 1, $x - x^2$ est négatif (c.-à-d. du signe de a , qui vaut -1 puisque $x - x^2 = -1x^2 + x \quad \underline{\Delta}$), sauf entre les racines 0 et 1. On obtient donc le tableau :

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$x - x^2$	-	0	+	0	-

On lit les solutions de l'inéquation dans le tableau de signe : $x - x^2 \leq 0$ (c.-à-d du signe \ominus) lorsque $x \in]-\infty; 0]$ (case de gauche) ou lorsque $x \in [1; +\infty[$ (case de droite), donc

$$\mathcal{S} =]-\infty; 0] \cup [1; +\infty[.$$

3. On résout l'inéquation $x^3 > 2x^2 + 3x$.

On transpose et on factorise (à cause du degré 3) :

$$x^3 > 2x^2 + 3x \iff x^3 - 2x^2 - 3x > 0 \iff x(x^2 - 2x - 3) > 0.$$

On cherche les racines de $x^2 - 2x - 3$:

- $a = 1, b = -2, c = -3$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16$;

- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-2) - \sqrt{16}}{2 \times 1} = \frac{2-4}{2} = -1,$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2+4}{2} = 3.$$

- $a = 1$, a est \oplus .

On obtient donc le tableau :

x	$-\infty$	-1	0	3	$+\infty$
x		$-$	$-$	0	$+$
$x^2 - 2x - 3$	$+$	0	$-$	$-$	0
$x(x^2 - 2x - 3)$	$-$	0	$+$	0	$+$

On en déduit les solutions de l'inéquation :

$$\mathcal{S} =]-1; 0[\cup]3; +\infty[.$$

Remarque : l'inégalité $x^3 - 2x^2 - 3x > 0$ est stricte, donc on écarte les valeurs $x = -1$, $x = 0$ et $x = 3$ de la solution (pour lesquelles $x^3 - 2x^2 - 3x$ est égal à 0) – ainsi le crochet est-il ouvert en -1 , en 0 et en 3.

Exercice 44 1. On trace $D: y = x - 1$ à partir d'un tableau de valeurs avec deux valeurs, et la parabole $P: y = x^2 - 2x - 5$ à partir d'un tableau de valeurs symétrique par rapport au sommet :


Tracé de D .

x	0	2
y	-1	1

Tracé de P .

- $a = 1$, $b = -2$, $c = -5$;
- $x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \times 1} = \frac{2}{2} = 1$.

x	-2	-1	0	0,5	1	1,5	2	3	4
y	3	-2	-5	-5,75	-6	-5,75	-5	-2	3



2. Pour étudier les positions relatives de $P: y = x^2 - 2x - 5$ et $D: y = x - 1$, on étudie **le signe de la différence** :

$$(x^2 - 2x - 5) - (x - 1).$$

- Pour les valeurs de x pour lesquelles cette différence vaut 0, les deux courbes se coupent ;
- pour les valeurs de x pour lesquelles cette différence est strictement positive, P est au-dessus de D ;

- pour les valeurs de x pour lesquelles cette différence est strictement négative, P est en-dessous de D .

On commence par calculer la différence :

$$(x^2 - 2x - 5) - (x - 1) = x^2 - 2x - 5 - x + 1 = x^2 - 3x - 4.$$

Ensuite on étudie le signe de la différence :

- $a = 1$, $b = -3$, $c = -4$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$;
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) - \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{3 - 5}{2} = \frac{-2}{2} = -1,$$


$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) + \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{3 + 5}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

- $a = 1$, a est \oplus .

On obtient donc le tableau et la position relative des courbes :

x	$-\infty$	-1		4	$+\infty$
$x^2 - 3x - 4$	$+$	0	$-$	0	$+$
Positions relatives des courbes	P au-dessus de D		P en-dessous de D	P au-dessus de D	

Exercice 45 On construit les paraboles $P : y = -x^2 + 1$ et $Q : y = x^2 - 2x - 5$ avec la calculatrice.



On calcule la différence⁸ :

$$(x^2 - 2x - 3) - (-x^2 + 1) = x^2 - 2x - 3 + x^2 - 1 = 2x^2 - 2x - 4.$$

Ensuite, on étudie le signe de cette différence :

- $a = 2$, $b = -2$, $c = -4$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 2 \times (-4) = 4 + 32 = 36$;
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-2) - \sqrt{36}}{2 \times 2} = \frac{2 - 6}{4} = \frac{-4}{4} = -1,$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-2) + \sqrt{36}}{2 \times 2} = \frac{2 + 6}{4} = \frac{8}{4} = 2.$$

8. Il vaut mieux calculer « $Q - P$ » pour éviter des difficultés de calcul avec les signes.

- $a = 2$, a est \oplus .

On obtient donc le tableau et la position relative des courbes :

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$2x^2 - 2x - 4$	$+$	0	0	$+$
Positions relatives des courbes	Q au-dessus de P		Q en-dessous de P	Q au-dessus de P
		S e c o u p e n t	S e c o u p e n t	

Exercice 46 1. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned}
 -2(x+1)(x-3) &= -2(x^2 + x - 3x - 3) \\
 &= -2(x^2 - 2x - 3) \\
 &= -2x^2 + 4x + 6.
 \end{aligned}$$

2. On cherche les racines de $-2x^2 + 4x + 6$:

- $a = -2$, $b = 4$, $c = 6$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \times (-2) \times 6 = 16 + 48 = 64$;
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 - \sqrt{64}}{2 \times (-2)} = \frac{-4 - 8}{-4} = \frac{-12}{-4} = 3, \\
 x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 + \sqrt{64}}{2 \times (-2)} = \frac{-4 + 8}{-4} = \frac{4}{-4} = -1.
 \end{aligned}$$

Les deux racines sont cohérentes avec l'écriture factorisée de la question 1 :

$$-2x^2 + 4x + 6 = 0 \iff -2(x+1)(x-3) = 0 \iff (x+1 = 0 \text{ ou } x-3 = 0) \iff (x = -1 \text{ ou } x = 3).$$

3. On construit le tableau de signe de $-2x^2 + 4x + 6$ en utilisant deux techniques différentes :

- Grâce au théorème 1 du cours :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
$-2x^2 + 4x + 6$	$-$	0	$+$	$-$

- En utilisant le signe d'un produit et la forme factorisée :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
-2	$-$		$-$	$-$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$
$x-3$	$-$		0	$+$
$-2(x+1)(x-3)$	$-$	0	$+$	$-$

Bien sûr, les deux méthodes donnent le même signe pour $-2x^2 + 4x + 6 = -2(x+1)(x-3)$.

Exercice 47 1. On factorise $x^2 - 3x - 4$.

- $a = 1, b = -3, c = -4$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$;
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) - \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{3 - 5}{2} = \frac{-2}{2} = -1,$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) + \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{3 + 5}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

D'après le théorème 2, pour tout réel x :

$$x^2 - 3x - 4 = a(x - x_1)(x - x_2) = 1(x - (-1))(x - 4) = (x + 1)(x - 4).$$

2. On factorise $-2x^2 + 20x - 50$.

- $a = -2, b = 20, c = -50$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = 20^2 - 4 \times (-2) \times (-50) = 400 - 400 = 0$;
- $\Delta = 0$, donc il y a une seule racine :


$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-20}{2 \times (-2)} = \frac{-20}{-4} = 5.$$

D'après le théorème 2, pour tout réel x :

$$-2x^2 + 20x - 50 = a(x - x_0)^2 = -2(x - 5)^2.$$

Exercice 48 La parabole $P: y = ax^2 + bx + c$ coupe l'axe des abscisses en 1 et en 5. Elle passe par le point $M(0;2)$.

- Comme dans certains exercices du chapitre 1, il est impossible de faire une figure ultra-précise avec si peu d'informations. Le lecteur ne devra donc pas être embarrassé d'avoir une parabole moins jolie que celle tracée ci-dessous avec un ordinateur.



- La parabole P coupe l'axe des abscisses en 1 et en 5, donc ce sont les deux racines : $x_1 = 1, x_2 = 5$. Et donc, d'après le théorème 2 du cours, pour tout réel x :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = a(x - 1)(x - 5).$$

Enfin, P passe par $M(0;2)$, donc $f(0) = 2$. Autrement dit, en prenant l'écriture factorisée ci-dessus :

$$a(0 - 1)(0 - 5) = 2.$$

On en déduit $5a = 2$, donc $a = \frac{2}{5} = 0,4$.

- On développe l'expression obtenue dans la question précédente :

$$f(x) = a(x - 1)(x - 5) = 0,4(x - 1)(x - 5) = 0,4(x^2 - 5x - x + 5) = 0,4(x^2 - 6x + 5) = 0,4x^2 - 2,4x + 2.$$

On a donc

$$a = 0,4 \quad , \quad b = -2,4 \quad , \quad c = 2.$$

Exercice 49 On suppose que la parabole $P : y = ax^2 + bx + c$ passe par les points $A(3;0)$ et $B(-2;0)$; et que son sommet S a pour coordonnées $(0,5 ; 1)$. On pose $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Il y a donc deux racines : $x_1 = -2$, $x_2 = 3$. Et d'après le théorème 2 du cours, pour tout réel x :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = a(x - (-2))(x - 3) = a(x + 2)(x - 3).$$

De plus, P passe par le sommet $S(0,5 ; 1)$, donc $f(0,5) = 1$. Autrement dit, en prenant l'écriture factorisée ci-dessus :

$$a(0,5 + 2)(0,5 - 3) = 1.$$

Cela donne $a \times (-6,25) = 1$, donc $a = -\frac{1}{6,25} = -0,16$.

Finalement

$$f(x) = -0,16(x + 2)(x - 3) = 0,16(x^2 + 2x - 3x - 6) = -0,16(x^2 - x - 6) = -0,16x^2 + 0,16x + 0,96.$$

Conclusion :

$$a = -0,16 \quad , \quad b = 0,16 \quad , \quad c = 0,96.$$

Exercice 50 On pose $f(x) = 0,25x^2 - x - 3$ pour tout réel x . On note P la parabole qui représente f .

1. On résout l'équation $f(x) = 0$:

- $a = 0,25$, $b = -1$, $c = -3$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times 0,25 \times (-3) = 1 + 3 = 4$;
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) - \sqrt{4}}{2 \times 0,25} = \frac{1 - 2}{0,5} = \frac{-1}{0,5} = -2,$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) + \sqrt{4}}{2 \times 0,25} = \frac{1 + 2}{0,5} = \frac{3}{0,5} = 6.$$


2. • a est \oplus , donc P est vers le haut.
 • D'après la formule du chapitre 1 :

$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{-1}{2 \times 0,25} = \frac{1}{0,5} = 2.$$

On en déduit

$$y_S = 0,25 \times 2^2 - 2 - 3 = 1 - 5 = -4.$$

On a donc $S(2; -4)$.



3. D'après le théorème 2 du cours, pour tout réel x :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = 0,25(x - (-2))(x - 6) = 0,25(x + 2)(x - 6).$$

Exercice 51 1. On note $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ les deux racines.

$$(a) \quad x_1 + x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-b - \cancel{\sqrt{\Delta}} - b + \cancel{\sqrt{\Delta}}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}.$$

$$(b) \quad x_1 \times x_2 = \left(\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \right) \times \left(\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right) = \frac{(-b - \sqrt{\Delta})(-b + \sqrt{\Delta})}{2a \times 2a} = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{\Delta})^2}{4a^2} = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{\cancel{b^2} - (\cancel{b^2} - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{ac}{a} = \frac{c}{a}.$$

2. (a) $x_1 = 1$ est « racine évidente » de $x^2 + 15,5x - 16,5$, puisque

$$1^2 + 15,5 - 16,5 = 0.$$

D'après la question 1.(a), l'autre racine x_2 vérifie la relation

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a},$$

donc

$$1 + x_2 = -\frac{15,5}{1};$$

et finalement

$$x_2 = -15,5 - 1 = -16,5.$$

Remarques :

- Lorsqu'on cherche une racine « évidente », on essaye $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$, $x = -1$ et $x = -2$. Si aucune ne fonctionne, c'est que ce n'est pas évident!⁹
- On aurait aussi pu utiliser la question 1.(b) pour trouver x_2 :

$$x_1 \times x_2 = \frac{c}{a} \implies 1 \times x_2 = \frac{-16,5}{1} \implies x_2 = -16,5.$$

- (b) Une racine « évidente » de $3x^2 - 4x - 4$ est $x_1 = 2$:

$$3 \times 2^2 - 4 \times 2 - 4 = 12 - 8 - 4 = 0.$$

D'après la question 1.(a), l'autre racine x_2 vérifie la relation $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, donc $2 + x_2 = -\frac{-4}{3}$. On a donc

$$x_2 = \frac{4}{3} - 2 = \frac{4}{3} - \frac{6}{3} = -\frac{2}{3}.$$

(Là aussi, on aurait pu utiliser la question 1.(b) pour trouver x_2 .)

3. On développe :

$$\begin{aligned} a(x - x_1)(x - x_2) &= a(x \times x - x_1 \times x - x_2 \times x + x_1 \times x_2) \\ &= a(x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 \times x_2). \end{aligned}$$

D'après la question 1, $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$, donc en remplaçant ci-dessus :

$$a(x - x_1)(x - x_2) = a\left(x^2 - \left(-\frac{b}{a}\right)x + \frac{c}{a}\right) = ax^2 - a \times \left(-\frac{b}{a}\right)x + a \times \frac{c}{a} = ax^2 + bx + c.$$

On obtient bien l'égalité attendue.

Exercice 52 1. On cherche le nombre de solutions de l'équation

$$x^2 + 2x = m \tag{4}$$

suivant la valeur de m .

On transpose :

$$x^2 + 2x = m \iff x^2 + 2x - m = 0.$$

Le nombre de solutions dépend du discriminant, qui lui-même dépend de m .

Par exemple :

- si $m = 3$, le discriminant vaut ¹⁰

$$\Delta_3 = 2^2 - 4 \times 1 \times (-m) = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 16.$$

Il est strictement positif, donc dans ce cas (4) a deux solutions.

9. Par exemple, personne ne peut vous demander de deviner que $x = -1 + \sqrt{3}$ est racine de $x^2 + 2x - 2$.

10. On note Δ_m le discriminant – parce qu'il dépend de m .

- si $m = -2$, le discriminant vaut

$$\Delta_{-2} = 2^2 - 4 \times 1 \times (-m) = 2^2 - 4 \times 1 \times 2 = -4.$$

Il est strictement négatif, donc dans ce cas (4) n'a aucune solution.

Le nombre de solutions dépend du signe de Δ_m , qui dans le cas général vaut

$$\Delta_m = 2^2 - 4 \times 1 \times (-m) = 4 + 4m.$$

Il s'agit donc de savoir quand $\Delta_m > 0$ (l'équation aura deux solutions), quand $\Delta_m = 0$ (l'équation aura une seule solution) et quand $\Delta_m < 0$ (l'équation n'aura aucune solution). Pour cela, on étudie le signe de $\Delta_m = 4 + 4m$ – en fonction de m !

m	$-\infty$	-1	$+\infty$
$\Delta_m = 4 + 4m$	$-$	0	$+$

On peut conclure :

- si $m > -1$, $\Delta_m > 0$, donc l'équation (4) a deux solutions;
- si $m = -1$, $\Delta_m = 0$, donc l'équation (4) a une seule solution;
- si $m < -1$, $\Delta_m < 0$, donc l'équation (4) n'a aucune solution.

2. On cherche le nombre de solutions de l'équation

$$x^2 + mx = -1 \tag{5}$$

suivant la valeur de m .

On transpose :

$$x^2 + mx = -1 \iff x^2 + mx + 1 = 0.$$

Le discriminant est

$$\Delta_m = m^2 - 4 \times 1 \times 1 = m^2 - 4.$$

Il s'agit d'une expression du 2^d degré, dont les racines sont évidentes :

$$m^2 - 4 = 0 \iff m^2 = 4 \iff (m = 2 \text{ ou } m = -2).$$

On construit le tableau de signe de Δ_m (en fonction de m) :

m	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$\Delta_m = m^2 - 4$	$+$	0	$-$	0	$+$


Conclusion :

- si $m < -2$ ou $m > 2$, l'équation (5) a deux solutions;
- si $m = -2$ ou $m = 2$, l'équation (5) a une seule solution;
- si $-2 < m < 2$ l'équation (5) n'a aucune solution.

5 Trigonométrie

Exercice 53 ABC est un triangle tel que $AB = 3$, $AC = 4$, $BC = 5$. On pose $\theta = \widehat{ACB}$.

1.



$$\left. \begin{array}{l} BC^2 = 5^2 = 25 \\ AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 16 + 9 = 25 \end{array} \right\} BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

D'après le théorème réciproque de Pythagore, ABC est rectangle en A .

2. Dans ABC rectangle en A :

$$\cos \theta = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}} = \frac{4}{5} \quad , \quad \sin \theta = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} = \frac{3}{5} \quad , \quad \tan \theta = \frac{\text{opp}}{\text{adj}} = \frac{3}{4}.$$

3. D'après la question précédente :


$$\begin{aligned} (\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 &= \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{4^2}{5^2} + \frac{3^2}{5^2} = \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = \frac{25}{25} = 1 \\ \frac{\sin \theta}{\cos \theta} &= \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{5} \times \frac{5}{4} = \frac{3}{4} = \tan \theta \end{aligned}$$

Remarques :

Les deux relations obtenues dans la question 3 sont valables quel que soit le triangle rectangle :

$$\begin{aligned} (\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 &= \left(\frac{\text{adj}}{\text{hyp}}\right)^2 + \left(\frac{\text{opp}}{\text{hyp}}\right)^2 = \frac{\text{adj}^2}{\text{hyp}^2} + \frac{\text{opp}^2}{\text{hyp}^2} = \frac{\text{adj}^2 + \text{opp}^2}{\text{hyp}^2} \stackrel{\text{Pythagore}}{=} \frac{\text{hyp}^2}{\text{hyp}^2} = 1 \\ \frac{\sin \theta}{\cos \theta} &= \frac{\frac{\text{opp}}{\text{hyp}}}{\frac{\text{adj}}{\text{hyp}}} = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} \times \frac{\text{hyp}}{\text{adj}} = \frac{\text{opp}}{\text{adj}} = \tan \theta \end{aligned}$$

Exercice 54 ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 4$ et $\widehat{BCA} = 40^\circ$. On note H le pied de la hauteur issue de A .



On commence par la longueur AC .

Dans ABC rectangle en A :

$$\tan 40^\circ = \frac{\text{opp}}{\text{adj}} = \frac{4}{AC}.$$

On a donc $\tan 40^\circ \times AC = \frac{4}{AC} \times AC$, puis $\frac{\tan 40^\circ \times AC}{\tan 40^\circ} = \frac{4}{\tan 40^\circ}$.

Conclusion : on obtient grâce à la calculatrice

$$AC = \frac{4}{\tan 40^\circ} \approx 4,77.$$

Ensuite on calcule AH .

Dans AHC rectangle en H :

$$\sin 40^\circ = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} = \frac{AH}{AC}.$$

On a donc $\sin 40^\circ \times AC = \frac{AH}{AC} \times AC$, soit

$$AH = \sin 40^\circ \times AC = \sin 40^\circ \times \frac{4}{\tan 40^\circ} \approx 3,06.$$

Remarque : Ne prenez pas de valeurs approchées dans les calculs intermédiaires, car les erreurs d'arrondis pourraient grossir au fur et à mesure des étapes de calcul, et même finir par « exploser ». Si vous voulez un exemple, entrez la formule « =1/3 » dans la cellule A1 d'une feuille de calcul (un tableur). Vous obtenez 0,3333333... Ensuite, vous entrez la formule « =4*A1-1 » dans la cellule A2, puis vous étirez vers le bas. En théorie, vous devriez toujours obtenir la même réponse, puisque $4 \times \frac{1}{3} - 1 = \frac{4}{3} - \frac{3}{3} = \frac{1}{3}$. Vous verrez que ce n'est pas du tout le cas, ce qui est dû à des problèmes d'arrondis.

Exercice 55 La différence d'altitude entre le haut et le bas de la piste est

$$2261 - 1839 = 422 \text{ m},$$

si bien que l'on peut représenter la situation par la figure suivante :




On nous demande de calculer la mesure de l'angle θ . On utilise le sinus : $\sin \theta = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} = \frac{422}{1453}$, donc $\theta \approx 16,9^\circ$.

Exercice 56 1. $[OI]$ et $[ON]$ sont deux rayons du cercle \mathcal{C} , donc $OI = ON$ et OIN est isocèle en O .

Les angles à la base \widehat{OIN} et \widehat{ONI} sont donc égaux et (comme la somme des angles d'un triangle vaut 180°) ils valent tous deux $\frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ$.

Le triangle OIN a donc trois angles de 60° et par suite il est équilatéral.



2. Comme OIN est équilatéral, la hauteur $[HN]$ est aussi une médiane (propriété du triangle équilatéral), et donc H est le milieu de $[OI]$. On a donc

$$OH = \frac{1}{2}.$$

Ensuite on calcule HN : d'après le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle OHN ,

$$OH^2 + HN^2 = ON^2 \quad \left(\frac{1}{2}\right)^2 + HN^2 = 1^2 \quad \frac{1}{4} + HN^2 = 1 \quad HN^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad HN = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

3. Dans le triangle OHN rectangle en H :

$$\cos 60^\circ = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}} = \frac{OH}{ON} = \frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2},$$

$$\sin 60^\circ = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} = \frac{HN}{ON} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Remarque :

On constate que $\cos 60^\circ$ est l'abscisse de N :


$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2} = OH = x_N ;$$

et que $\sin 60^\circ$ est l'ordonnée de N :

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} = HN = y_N.$$


Ces propriétés se généralisent : en effet, en utilisant le fait que $ON = 1$, on démontre (avec le même calcul que dans la question 3) que si $\widehat{I\hat{O}N} = \theta$ (avec θ quelconque entre 0° et 90°), alors

$$\cos \theta = x_N \quad , \quad \sin \theta = y_N.$$




Exercice 57 Chacun des cercles a pour rayon 1, donc le triangle ABC est équilatéral de côté 4. Par conséquent, c'est un **agrandissement de rapport 4** du triangle de l'exercice précédent, et ainsi sa hauteur $[HB]$ (en bleu) mesure $4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$. Comme chaque segment vert mesure 1, on obtient

$$h = 2 + 2\sqrt{3}.$$



Exercice 58 1. $\widehat{HON} = 45^\circ$ et $\widehat{OHN} = 90^\circ$, donc $\widehat{ONH} = 180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$.

Le triangle OHN a donc deux angles de 45° et par suite il est rectangle isocèle en H .




2. D'après le théorème de Pythagore dans ce triangle, $OH^2 + HN^2 = ON^2$. Mais $OH = HN$ puisque OHN est isocèle, d'où

$$OH^2 + OH^2 = ON^2 \quad OH^2 + OH^2 = 1^2 \quad 2OH^2 = 1 \quad OH^2 = \frac{1}{2} = \frac{2}{4} \quad OH = \sqrt{\frac{2}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

3. On va un peu plus vite que dans l'exercice 56, en utilisant la remarque faite à la fin :

$$\cos 45^\circ = x_N = OH = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \sin 45^\circ = y_N = HN = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Exercice 59 1.



- Le périmètre d'un cercle de rayon R est $2\pi R$, donc le périmètre du cercle trigonométrique (rayon 1) est $2\pi \times 1 = 2\pi$.


Sachant cela, pour placer π , on part de la graduation 0 et on fait $\frac{1}{2}$ tour dans le sens direct. On arrive tout à gauche; tandis que pour placer 2π , on fait un tour complet – le point est donc le même que celui associé à 0.

- Pour placer π , on a tourné de 180° , donc pour $\frac{\pi}{2}$, on tourne de $180^\circ \div 2 = 90^\circ$. Le point correspondant est tout en haut du cercle trigonométrique.

Pour $\frac{\pi}{4}$, on tourne de $180^\circ \div 4 = 45^\circ$. Pour placer ce point, on avance en diagonale vers « en haut à droite ».


- Pour placer $\frac{\pi}{2}$, on a tourné de 90° dans le sens direct, donc pour $-\frac{\pi}{2}$, on tourne de 90° dans le sens indirect. On arrive tout en bas du cercle trigonométrique.
- Pour placer $\frac{3\pi}{4}$, on a tourné de 45° , donc pour $\frac{3\pi}{4} = 3 \times \frac{\pi}{4}$, on tourne de $3 \times 45^\circ = 135^\circ$.

2.




- Pour placer $\frac{\pi}{3}$, on tourne de $180^\circ \div 3 = 60^\circ$. En se rappelant de l'exercice 56, on voit que le point correspondant a pour abscisse $\frac{1}{2}$. On peut donc le placer grâce au quadrillage du cahier et sans utiliser ni compas, ni rapporteur.
- Pour placer $\frac{2\pi}{3}$, on tourne de $2 \times 60^\circ = 120^\circ$. Le point correspondant a pour abscisse $-\frac{1}{2}$.
- Pour $\frac{\pi}{6}$, on tourne de $180^\circ \div 6 = 30^\circ$. En remarquant que les angles de 60° et 30° sont complémentaires (leur somme vaut 90°), on comprend (assez) facilement que le point correspondant a pour ordonnée $\frac{1}{2}$.
- Enfin, pour $-\frac{5\pi}{6}$, on tourne de $5 \times 30^\circ = 150^\circ$ dans le sens **indirect**. Le point correspondant a pour ordonnée $-\frac{1}{2}$.


Exercice 60 Les points associés à $\frac{0\pi}{3}, \frac{1\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{3}, \dots$ forment un hexagone régulier.



Exercice 61 Les points associés à $\frac{0\pi}{4}, \frac{1\pi}{4}, \frac{2\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \dots$ forment un octogone régulier.



Exercice 62 Les points associés à $\frac{0\pi}{6}, \frac{1\pi}{6}, \frac{2\pi}{6}, \frac{3\pi}{6}, \dots$ forment un dodécagone régulier.




Exercice 63 1. Pour $\frac{31\pi}{2}$, on écrit

$$\frac{31\pi}{2} = \frac{32\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 16\pi - \frac{\pi}{2},$$

donc on fait 8 tours dans le sens direct (car $8 \times 2\pi = 16\pi$), puis un quart de tour dans le sens indirect. On arrive tout en bas du cercle trigonométrique.

Pour -5π , on fait 5 demi-tours dans le sens indirect. On arrive tout à gauche.



Par lecture du cercle trigonométrique :


$$\begin{aligned} \cos 0 &= 1 \\ \sin 0 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \pi &= -1 \\ \sin \pi &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos 5\pi &= -1 \\ \sin 5\pi &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \frac{\pi}{2} &= 0 \\ \sin \frac{\pi}{2} &= 1 \end{aligned}$$

2.



Par lecture du cercle trigonométrique :


$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\left| \begin{array}{l} \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} \\ \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{array} \right.$$

$$\left| \begin{array}{l} \cos \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \\ \sin \left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{array} \right.$$

3.



Par lecture du cercle trigonométrique :

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$


$$\left| \begin{array}{l} \cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2} \end{array} \right.$$

$$\left| \begin{array}{l} \cos \frac{11\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \frac{11\pi}{6} = -\frac{1}{2} \end{array} \right.$$

4. Pour $\frac{2025\pi}{4}$, on écrit

$$\frac{2025\pi}{4} = \frac{2024\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 506\pi + \frac{\pi}{4}.$$

On fait donc 253 tours du cercle trigonométrique dans le sens direct (car $253 \times 2\pi = 506\pi$), et on tourne encore de $\frac{\pi}{4}$. Le point associé à $\frac{2025\pi}{4}$ est donc le même que celui associé à $\frac{\pi}{4}$.



Par lecture du cercle trigonométrique :

$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$


$$\left| \begin{array}{l} \cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{array} \right.$$

$$\left| \begin{array}{l} \cos \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{array} \right.$$


Exercice 64 Pour tout réel x :

$$\cos(x + \pi) = -\cos x$$


$$\sin(x + \pi) = -\sin x$$



Exercice 65 Courbe d'une fonction paire (l'axe des ordonnées est axe de symétrie) :



Exercice 66 Courbe d'une fonction impaire (l'origine est centre de symétrie) :




Exercice 67 Dans chaque cas, on illustre la parité en donnant l'allure de la courbe.

1. $f(x) = x^2 - 1$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = (-x)^2 - 1 = x^2 - 1 = f(x),$$

donc f est paire.




2. $g(x) = 5x$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g(-x) = 5 \times (-x) = -5x = -g(x),$$

donc g est impaire.




3. $h(x) = x^4 - 5x^2 + 3$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$h(-x) = (-x)^4 - 5(-x)^2 + 3 = x^4 - 5x^2 + 3 = h(x),$$

donc h est paire.




4. $i(x) = x^3 - 6x$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$i(-x) = (-x)^3 - 6 \times (-x) = -x^3 + 6x = -i(x),$$

donc i est impaire.




5. $j(x) = |x|$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$j(-x) = |-x| = |x| = j(x),$$

donc j est paire.




6. $k(x) = \frac{4x}{x^2 + 1}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$k(-x) = \frac{4 \times (-x)}{(-x)^2 + 1} = \frac{-4x}{x^2 + 1} = -k(x),$$

donc k est impaire.



Exercice 68 Supposons qu'une fonction f définie sur \mathbb{R} soit à la fois paire et impaire, et prenons un réel x . Comme f est paire :

$$f(-x) = f(x).$$

Et comme f est impaire :

$$f(-x) = -f(x).$$

On en déduit $f(x) = -f(x)$, donc $f(x) + f(x) = 0$, soit $2f(x) = 0$; et finalement

$$f(x) = \frac{0}{2} = 0.$$

La fonction f est donc la fonction nulle (i.e. que $f(x) = 0$ pour tout réel x).

Réciproquement, la fonction nulle est bien à la fois paire et impaire, puisque pour tout réel x :

$$f(x) = f(-x) = -f(x) = 0.$$

Conclusion : la seule fonction définie sur \mathbb{R} à la fois paire et impaire est la fonction nulle.

Exercice 69 1. Dans ACH rectangle en H :


$$\sin \hat{A} = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} = \frac{HC}{AC},$$

donc


$$HC = AC \times \sin \hat{A};$$

et la formule habituelle de l'aire d'un triangle donne :

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{AB \times HC}{2} = \frac{AB \times AC \times \sin \hat{A}}{2} = \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin \hat{A}.$$



2. Dans un repère orthonormé (O, I, J) , \mathcal{C} est le cercle trigonométrique, N est le point associé à $\frac{\pi}{4}$ et A le point associé à $\frac{\pi}{8}$.



- (a) Le point N est associé à $\frac{\pi}{4}$, donc $N\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. On en déduit :

$$\begin{aligned} IN &= \sqrt{(x_N - x_I)^2 + (y_N - y_I)^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 0\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}-2}{2}\right)^2 + \frac{\sqrt{2}^2}{2^2}} \\ &= \sqrt{\frac{\sqrt{2}^2 - 2 \times \sqrt{2} \times 2 + 2^2}{2^2} + \frac{2}{2^2}} = \sqrt{\frac{2 - 4 \times \sqrt{2} + 4 + 2}{4}} = \sqrt{\frac{8 - 4 \times \sqrt{2}}{4}} = \sqrt{\frac{4(2 - \sqrt{2})}{4}} = \sqrt{2 - \sqrt{2}}. \end{aligned}$$

- (b) On calcule de deux façons différentes l'aire du quadrilatère $OIAN$:

- D'abord, les triangles OAI et OAN sont isométriques, vu qu'ils ont tous deux un angle de $\frac{\pi}{8}$ compris entre deux côtés de longueur 1, donc d'après la question 1 :

$$\mathcal{A}_{OIAN} = 2 \times \mathcal{A}_{OAI} = 2 \times \frac{1}{2} OI \times OA \times \sin \widehat{IOA} = 2 \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \sin \frac{\pi}{8} = \sin \frac{\pi}{8}.$$

- Ensuite, (OA) est la médiatrice de $[IN]$, puisque c'est la bissectrice de l'angle \hat{O} dans le triangle ION isocèle en O . Les diagonales (OA) et (IN) du cerf-volant $OIAN$ sont donc perpendiculaires et l'on a¹¹

$$\mathcal{A}_{OIAN} = \frac{OA \times IN}{2} = \frac{1 \times \sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}.$$

En comparant les deux résultats obtenus pour l'aire de $OIAN$, il vient directement

$$\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}.$$

- (c) D'après la formule écrite en remarque dans l'exercice 53 :

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = 1.$$

11. On utilise la formule pour l'aire d'un cerf-volant, que vous pouvez facilement retrouver seul.

Donc d'après la question précédente,

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = 1 - \sin^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = 1 - \left(\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}\right)^2 = \frac{4}{4} - \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}^2}{2^2} = \frac{4}{4} - \frac{2-\sqrt{2}}{4} = \frac{4-2+\sqrt{2}}{4} = \frac{2+\sqrt{2}}{4}.$$

Or $\cos \frac{\pi}{8} > 0$, donc

$$\cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{2+\sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}.$$

6 Dérivation


Remarque préliminaire : Rappelons que le coefficient directeur d'une droite (AB) est le « a » de $y = ax + b$; et qu'il s'obtient :

- par le calcul, avec la formule $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$;
- graphiquement, en regardant de combien on monte (ou descend) en ordonnée lorsqu'on avance de 1 en abscisse.

Sur la figure ci-dessous, où $A(1 ; 2)$ et $B(3 ; 3)$, le coefficient directeur de (AB) est

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{3 - 2}{3 - 1} = \frac{1}{2} = 0,5$$


ce que confirme le codage (en violet).



Sur la figure ci-dessous, où $A(2 ; 2)$ et $B(3 ; 1)$, le coefficient directeur de (AB) est

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{1 - 2}{3 - 2} = \frac{-1}{1} = -1$$

ce que confirme le codage (en violet).



Exercice 70 La distance (en m) parcourue au temps t (en s) par une pierre en chute libre est $d(t) = 4,9t^2$. On lance cette pierre d'une hauteur de 40 m.

1. Pour déterminer le temps que la pierre met pour arriver au sol, on résout l'équation $4,9t^2 = 40$:


$$4,9t^2 = 40 \iff t^2 = \frac{40}{4,9} \iff t = \sqrt{\frac{40}{4,9}} \approx 2,86.$$

La pierre met environ 2,86 s pour arriver au sol.

2. Au temps $t = 2$ s, la pierre est tombée de $4,9 \times 2^2 = 19,6$ m, donc sa vitesse moyenne entre les temps $t = 0$ et $t = 2$ est

$$v_{\text{moy}} = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{19,6}{2} = 9,8 \text{ m/s.}$$


On a en fait calculé $\frac{d(2)-d(0)}{2-0}$, ce qui correspond au coefficient directeur de la droite (AB) sur le graphique.



Exercice 71 La fonction f est définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^2$.

1. On construit la courbe \mathcal{C} à l'aide d'un tableau de valeurs :

x	-2	-1	-0,5	0	0,5	1	2
$f(x) = x^2$	4	1	0,25	0	0,25	1	4



2. (a) Pour tout nombre $h \neq 0$,

$$\begin{aligned}
 \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= \frac{(1+h)^2 - 1^2}{h} \\
 &= \frac{1^2 + 2 \times 1 \times h + h^2 - 1}{h} \\
 &= \frac{\cancel{1} + 2h + h^2 - \cancel{1}}{h} \\
 &= \frac{h(2+h)}{h} \\
 &= 2+h.
 \end{aligned}$$

On en déduit

$$\begin{aligned}
 f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} (2+h) \\
 &= 2+0 \\
 &= 2.
 \end{aligned}$$

(b) On note T la tangente à \mathcal{C} au point A d'abscisse 1. C'est la droite qui :

- passe par le point $A(1; 1)$ – puisque $f(1) = 1$;
- a pour coefficient directeur $f'(1) = 2$ – donc quand on avance de 1 en abscisse, on monte de 2 en ordonnée (cf codage sur la figure).

3. Soit a un nombre réel. Pour tout nombre $h \neq 0$,

$$\begin{aligned}
 \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} \\
 &= \frac{\cancel{a^2} + 2 \times a \times h + h^2 - \cancel{a^2}}{h} \\
 &= \frac{h(2a+h)}{h} \\
 &= 2a+h.
 \end{aligned}$$

On en déduit

$$\begin{aligned}
 f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} (2a+h) \\
 &= 2a+0 \\
 &= 2a.
 \end{aligned}$$

Exercice 72 La fonction f est définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^3$.

Soit $a \in \mathbb{R}$.

1. Pour tous réels x, y :

$$\begin{aligned}
 (x+y)^3 &= (x+y)^2 \times (x+y) = (x^2 + 2xy + y^2) \times (x+y) = x^2 \times x + x^2 \times y + 2xy \times x + 2xy \times y + y^2 \times x + y^2 \times y \\
 &= x^3 + x^2y + 2x^2y + 2xy^2 + xy^2 + y^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3.
 \end{aligned}$$

2. D'après la question 1, pour tout $h \neq 0$:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^3 - a^3}{h} = \frac{\cancel{a^3} + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - \cancel{a^3}}{h} = \frac{h(3a^2 + 3ah + h^2)}{h} = 3a^2 + 3ah + h^2.$$

3. On en déduit

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (3a^2 + 3ah + h^2) = 3a^2 + 3a \times 0 + 0^2 = 3a^2.$$

Exercice 73 La fonction f est définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

Soit $a \neq 0$.

1. Pour tout nombre $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{1 \times a - 1 \times (a+h)}{(a+h) \times a}}{h} = \frac{\frac{a - a - h}{a(a+h)}}{h} = \frac{\frac{-h}{a(a+h)}}{h} = \frac{-\cancel{h}}{a(a+h)} = -\frac{1}{a(a+h)}.$$

2. On en déduit

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{a(a+h)} \right) = -\frac{1}{a(a+0)} = -\frac{1}{a^2}.$$

Exercice 74 L'ensemble de définition de f est noté D_f , celui de g est noté D_g , etc.

1. $f(x) = -3x + 1$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = -3 \times 1 + 0 = -3.$$

$$D_f = \mathbb{R}.$$

2. $g(x) = 4x^2 + 7$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = 4 \times 2x + 0 = 8x.$$

$$D_g = \mathbb{R}.$$

3. $h(x) = -x^2 + 3x - 5$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$h'(x) = -2x + 3 \times 1 - 0 = -2x + 3.$$

$$D_h = \mathbb{R}.$$

4. $i(x) = 3(x^2 - 6x + 5)$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} i'(x) &= 3(2x - 6 \times 1 + 0) \\ &= 3(2x - 6) = 6x - 18. \end{aligned}$$

$$D_i = \mathbb{R}.$$

On peut aussi commencer par développer :

$$i(x) = 3x^2 - 18x + 15,$$

puis seulement après calculer la dérivée :

$$i'(x) = 3 \times 2x - 18 \times 1 + 0 = 6x - 18.$$

5. $j(x) = x^3 + 6x^2 - x + 7$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$j'(x) = 3x^2 + 6 \times 2x - 1 + 0 = 3x^2 + 12x - 1.$$

$$D_j = \mathbb{R}.$$

6. On va un peu plus vite...

$$k(x) = -2x^4 + 5x^3 + x^2 - 8x + 19$$

$$D_k = \mathbb{R}.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$k'(x) = -8x^3 + 15x^2 + 2x - 8.$$

7. $\ell(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{x}$

$$D_\ell = \mathbb{R}^*.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$\ell'(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 + \left(-\frac{1}{x^2} \right) = x^2 - \frac{1}{x^2}.$$

8. $m(x) = 2(x + \sqrt{x})$

$$D_m =]0; +\infty[.$$

⚠ La fonction racine n'est pas dérivable en 0 (voir exercice 82), donc m n'est dérivable que sur $]0; +\infty[$; et pour tout $x \in]0; +\infty[$:

$$m'(x) = 2 \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) = 2 + \frac{2}{2\sqrt{x}} = 2 + \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

9. $n(x) = 6\sqrt{x} - \frac{1}{x}$

$$D_n =]0; +\infty[.$$

Pour tout $x \in]0; +\infty[$:

$$n'(x) = 6 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} - \left(-\frac{1}{x^2} \right) = \frac{3}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}.$$

10. $o(x) = \frac{1}{3x^3} - \frac{0,25}{x^4}$

$$D_o = \mathbb{R}^*.$$

On peut écrire

$$o(x) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{x^3} - 0,25 \times \frac{1}{x^4},$$

donc o est dérivable sur \mathbb{R}^* et pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$\begin{aligned} o'(x) &= \frac{1}{3} \times \left(-\frac{3}{x^4} \right) - 0,25 \times \left(-\frac{4}{x^5} \right) \\ &= -\frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^5}. \end{aligned}$$

Exercice 75 On a vu que la pierre mettait environ 2,86 s pour arriver au sol. Au moment de l'impact, sa vitesse est donc $d'(2,86)$. Or $d'(t) = 4,9 \times 2t = 9,8t$, donc $d'(2,86) = 9,8 \times 2,86 \approx 28,03$.

Conclusion : la vitesse de la pierre à l'impact est de 28,03 m/s environ.


Remarques :

- On peut être plus précis : d'après l'exercice 70, la pierre met exactement $\sqrt{\frac{40}{4,9}} = \sqrt{\frac{400}{49}} = \frac{\sqrt{400}}{\sqrt{49}} = \frac{20}{7}$ s pour arriver au sol, donc sa vitesse à l'impact est

$$d'\left(\frac{20}{7}\right) = 9,8 \times \frac{20}{7} = 28 \text{ m/s}$$


(il n'y a pas d'arrondi – ça tombe « juste »).

- Cette vitesse instantanée est le coefficient directeur de la tangente au point C d'abscisse $\frac{20}{7}$ (tracée en rouge).




Exercice 76


$f'(0) = -2$, c'est le coefficient directeur de la tangente au point A d'abscisse 0.




$f'(1) = 0$, c'est le coefficient directeur de la tangente au point B d'abscisse 1 (cette tangente est horizontale).



$f'(3) = 2$, c'est le coefficient directeur de la tangente au point C d'abscisse 3.



Exercice 77 On utilise la même technique que dans l'exercice précédent :



Dans chacune des trois colonnes, la couleur employée correspond à la couleur utilisée sur le graphique pour placer le point et tracer la tangente.

x	0	1	3
$f(x)$	1	0	2
$f'(x)$	0	-1,5	4

Exercice 78 La fonction f est définie sur $[1;4]$ par $f(x) = x + \frac{4}{x} - 3$. On note \mathcal{C} sa courbe représentative, A, B, C les points de \mathcal{C} d'abscisses respectives 1, 2, 4; et T_A, T_B, T_C les tangentes à \mathcal{C} en ces points.

1. On réécrit $f(x)$ sous la forme

$$f(x) = x + 4 \times \frac{1}{x} - 3.$$

On obtient alors, pour tout $x \in [1;4]$:

$$f'(x) = 1 + 4 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) - 0 = 1 - \frac{4}{x^2}.$$

2. $f(1) = 1 + \frac{4}{1} - 3 = 1 + 4 - 3 = 2$ et $f'(1) = 1 - \frac{4}{1^2} = 1 - 4 = -3$

On applique la formule du cours pour l'équation d'une tangente

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Ici, on prend $a = 1$, puisque le point A a pour abscisse 1 :

$$T_A : y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$

$$T_A : y = -3(x - 1) + 2$$

$$T_A : y = -3x + 3 + 2$$

$$T_A : y = -3x + 5.$$

Remarque :

Le point A a pour coordonnées (1;2), puisque $f(1) = 2$; la tangente T_A passe donc par ce point. Pour la tracer, il faut placer un deuxième point (c'est une droite) ; ce que l'on peut faire de trois façons différentes :

- (a) L'ordonnée à l'origine est **5** (puisque $T_A : y = -3x + 5$), donc T_A passe par le point de coordonnées (0;5).
 (b) Le coefficient directeur de T_A est **-3** (puisque $T_A : y = -3x + 5$), donc en partant de A , il suffit d'avancer de 1 carreau en abscisse et de descendre de 3 carreaux en ordonnée - T_A passe donc par le point de coordonnées (2; -1).
 (c) On calcule un deuxième point avec la formule : par exemple, si $x = 2$, $y = -3 \times 2 + 5 = -1$. On obtient le point de coordonnées (2; -1) (le même qu'avec la méthode (b)) et on trace la tangente.
3. • $f(2) = 1$ et $f'(2) = \frac{2^2 - 4}{2^2} = \frac{0}{4} = 0$, donc l'équation de T_B est

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2)$$

$$y = 0(x - 1) + 1$$

$$y = 1.$$

Le coefficient directeur étant égal à 0, la tangente T_B est horizontale.

- $f(4) = 2$ et $f'(4) = \frac{4^2 - 4}{4^2} = \frac{12}{16} = 0,75$, donc l'équation de T_C est

$$y = f'(4)(x - 4) + f(4)$$


$$y = 0,75(x - 4) + 2$$

$$y = 0,75x - 3 + 2$$

$$y = 0,75x - 1.$$

On trace la tangente T_C par la même méthode que T_A (le plus simple et le plus précis est d'utiliser l'ordonnée à l'origine).

4. On place les points A, B, C , on trace les trois tangentes et on construit la courbe de la fonction f (en bleu) en s'appuyant sur ces tangentes.



Exercice 79 La fonction f est définie sur $[0; 4]$ par $f(x) = 2\sqrt{x} - 1$. On note \mathcal{C} sa courbe représentative, A, B, C les points de \mathcal{C} d'abscisses respectives 0, 1, 4; et T_A, T_B, T_C les tangentes à \mathcal{C} en ces points.

1. Pour tout $x \in]0; 4]$, $f'(x) = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} - 0 = \frac{1}{\sqrt{x}}$.
2. $f(1) = 2\sqrt{1} - 1 = 1$ et $f'(1) = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$, donc

$$T_B : y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$

$$T_B : y = 1(x - 1) + 1$$

$$T_B : y = x.$$


3. $f(4) = 2\sqrt{4} - 1 = 3$ et $f'(4) = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2} = 0,5$, donc

$$T_B : y = f'(4)(x - 4) + f(4)$$

$$T_B : y = 0,5(x - 4) + 3$$

$$T_B : y = 0,5x + 1.$$

4. La tangente T_A , d'équation $x = 0$, est verticale.



Exercice 80 Soit f la fonction définie sur $[-2; 2]$ par $f(x) = x^3 - 3x$. On note \mathcal{C} sa courbe représentative. On regroupe les questions en une seule.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 - 3$. On a donc les tableaux de valeurs :

D'abord pour la fonction f :


x	-2	-1	0	1	2
$f(x) = x^3 - 3x$	-2	2	0	-2	2

Ensuite pour la fonction dérivée f' :

x	-2	-1	0	1	2
$f'(x) = 3x^2 - 3$	9	0	-3	0	9

On fait le tracé en trois étapes :

1. On place (en bleu) les points correspondant au premier tableau de valeurs.
2. On trace les tangentes à la courbe grâce au deuxième tableau de valeurs. Les tangentes rouges ont un coefficient directeur égal à 9, puisque $f'(-2) = f'(2) = 9$; les tangentes vertes sont horizontales, puisque $f'(-1) = f'(1) = 0$; enfin, la tangente violette a un coefficient directeur égal à -3, car $f'(0) = -3$.
3. Pour finir, on trace (en noir) la courbe représentative de la fonction f .



Exercice 81 1. On commence par un tableau de valeurs, puis on place les points correspondants dans un repère :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$ x $	3	2	1	0	1	2	3


On se rappelle que

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x \leq 0, \end{cases}$$

donc la courbe est constituée de deux demi-droites :

- celle d'équation $y = x$ sur $[0; +\infty[$,
- celle d'équation $y = -x$ sur $]-\infty; 0]$.

Comme ce sont deux demi-droites, on les trace avec une règle!



2. Sur la partie droite du graphique, la courbe monte avec une pente de 1 ; et sur la partie gauche, elle descend avec une pente de 1, donc

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0, \\ -1 & \text{si } x < 0, \end{cases}$$

En revanche, f n'est pas dérivable en 0, à cause du « pic » – ou, ce qui revient au même, de l'absence d'une tangente au point $O(0;0)$.

Exercice 82 On définit deux fonctions c et r sur $[0; +\infty[$ par les formules :

$$c(x) = x^2 \quad , \quad r(x) = \sqrt{x}.$$

On note \mathcal{C} la courbe représentative de c , \mathcal{R} celle de r .


1.

On complète côte à côte un tableau de valeurs pour chacune des deux fonctions :

x	0	1	2	3
x^2	0	1	4	9

x	0	1	4	9
\sqrt{x}	0	1	2	3

Les lignes des deux tableaux sont « inversées » : la première ligne du 1^{er} est la deuxième ligne du 2nd ; et la deuxième ligne du 1^{er} est la première ligne du 2nd. Graphiquement, cela va se traduire par le fait que l'on passe de la courbe d'équation $y = x^2$ à la courbe d'équation $y = \sqrt{x}$ « en inversant les valeurs en abscisse et en ordonnée ». Par conséquent, les courbes d'équations $y = x^2$ et $y = \sqrt{x}$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$ (tracée en pointillés).



2. Soit $a > 0$. On note A le point de coordonnées $(a; \sqrt{a})$, et B le point de coordonnées $(\sqrt{a}; a)$. On note T_A la tangente à \mathcal{R} au point A , T_B la tangente à \mathcal{C} au point B .

- (a) Dans cette question, on prend $a = 4$, donc $A(4; 2)$ et $B(2; 4)$.

On sait que $c'(x) = 2x$ pour tout $x \geq 0$; et que $r'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ pour tout $x > 0$, donc :

$$r(4) = \sqrt{4} = 2 \quad , \quad r'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$$

$$T_A : y = r'(4)(x - 4) + r(4)$$

$$T_A : y = \frac{1}{4}(x - 4) + 2$$

$$T_A : y = \frac{1}{4}x + 1$$


$$c(2) = 2^2 = 4 \quad , \quad c'(2) = 2 \times 2 = 4$$

$$T_B : y = c'(2)(x - 2) + c(2)$$

$$T_B : y = 4(x - 2) + 4$$

$$T_B : y = 4x - 4$$

On fait une nouvelle figure, pour plus de clarté :



On constate que les tangentes T_A et T_B ont des coefficients directeurs qui sont inverses l'un de l'autre :

- Le coefficient directeur de T_A est $\frac{1}{4}$: quand on avance de 4 en abscisse, on monte de 1 en ordonnée.
- Le coefficient directeur de T_B est 4 : quand on avance de 1 en abscisse, on monte de 4 en ordonnée.

C'est dû à la symétrie des deux courbes (inversion du rôle de x et de y).

- (b) On revient au cas général ($a > 0$). Les points $A(a; \sqrt{a})$ et $B(\sqrt{a}; a)$ sont respectivement sur \mathcal{R} et \mathcal{C} , et ils sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Le coefficient directeur de T_B est $c(\sqrt{a}) = 2\sqrt{a}$, donc par raison de symétrie (comme dans la question 2.(a)), celui de T_A est l'inverse : $r'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$.

On retrouve ainsi le résultat du cours sur la dérivée de la fonction racine : $r'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

3. La tangente à \mathcal{C} au point O a pour coefficient directeur 0, donc elle est horizontale : c'est l'axe des abscisses.

Par raison de symétrie, la tangente à \mathcal{R} au point O est verticale : c'est l'axe des ordonnées. Cette tangente a une « pente infinie », donc r n'est pas dérivable en 0. ¹²

7 Variables aléatoires

Exercice 83 1. Il y a 8 pièces en tout dans le porte-monnaie : 2 de 0,50 €, 3 de 1 € et 3 de 2 €. La loi de X est donc donnée par le tableau :

x	0,5	1	2
$P(X = x)$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$

2. On calcule l'espérance de X :

$$E(X) = \frac{2}{8} \times 0,5 + \frac{3}{8} \times 1 + \frac{3}{8} \times 2 = 1,25.$$

Je suis gagnant, car l'espérance de gain est strictement plus grande que la mise :

$$1,25 > 1.$$

J'ai donc intérêt à jouer.

12. On peut aussi faire le calcul :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(0+h) - r(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty.$$

Exercice 84 1. On complète un tableau avec la somme des dés :

SOMME		1 ^{er} dé			
		1	2	3	4
2 ^e dé	1	2	3	4	5
	2	3	4	5	6
	3	4	5	6	7
	4	5	6	7	8

On en déduit la loi de X :

x	2	3	4	5	6	7	8
$P(X = x)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$

Explication : Par exemple, pour calculer $P(X = 4)$, on compte le nombre de cases du tableau où la somme vaut 4 et on divise par le nombre total de cases. Il y a 3 cases sur 16 où la somme des deux dés vaut 4, donc $P(X = 4) = \frac{3}{16}$.

2. $P(X \geq 6) = P(X = 6) + P(X = 7) + P(X = 8) = \frac{3}{16} + \frac{2}{16} + \frac{1}{16} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.

3. L'espérance de X est

$$E(X) = \frac{1}{16} \times 2 + \frac{2}{16} \times 3 + \frac{3}{16} \times 4 + \frac{4}{16} \times 5 + \frac{3}{16} \times 6 + \frac{2}{16} \times 7 + \frac{1}{16} \times 8 = 5.$$

Exercice 85 1. On traduit les données de l'énoncé par un tableau d'effectif :

	VTT	VTT	Total
Escalade	6	9	15
Escalade	11	4	15
Total	17	13	30

2. On rappelle que $E \cap V$ signifie que l'élève fait à la fois de l'escalade **et** du VTT.

$$P(E) = \frac{15}{30} = \frac{1}{2} \text{ et } P(E \cap V) = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}.$$

3. Sachant qu'un élève pratique l'escalade, la probabilité qu'il pratique également le VTT est

$$P_E(V) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}.$$

Explication : Il y a 15 élèves qui pratiquent l'escalade; et parmi eux, 6 font également du VTT.

4. Pour pratiquer chacun des deux sports, il faut posséder une licence. La licence de VTT coûte 30 € et la licence d'escalade coûte 50 €.

On note X le coût total des licences pour un élève pris au hasard dans la classe (ce coût est nul si l'élève ne pratique aucun des deux sports).

- (a) • Les 6 élèves qui font les deux sports payent $30 + 50 = 80$ €.
 • Les 9 élèves qui ne font que de l'escalade payent 50 €.
 • Les 11 élèves qui ne font que du VTT payent 30 €.
 • Les 4 élèves qui ne pratiquent aucun des deux sports payent 0 €.

On peut donc résumer la loi de X par le tableau :


x	80	50	30	0
$P(X = x)$	$\frac{6}{30}$	$\frac{9}{30}$	$\frac{11}{30}$	$\frac{4}{30}$

(b) L'espérance de X est


$$E(X) = \frac{6}{30} \times 80 + \frac{9}{30} \times 50 + \frac{11}{30} \times 30 + \frac{4}{30} \times 0 = 42.$$

Cette espérance est le coût moyen payé par un élève pour ses licences (en €).

Exercice 86 1. On rappelle les zones de tir à 2 et 3 points :



On représente la situation par un arbre pondéré :



Remarque : \bar{D} signifie « Stephen Curry tire à 3 points ».

2. La probabilité que Stephen Curry tire à 2 points et marque est

$$P(D \cap M) = 0,53 \times 0,52 = 0,2756.$$


3. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que Stephen Curry marque est :

$$\begin{aligned} P(M) &= P(D \cap M) + P(\bar{D} \cap M) \\ &= 0,53 \times 0,52 + 0,47 \times 0,44 = 0,4824. \end{aligned}$$

4. Stephen Curry a marqué. La probabilité qu'il ait tiré à deux points est

$$P_M(D) = \frac{P(M \cap D)}{P(M)} = \frac{0,2756}{0,4824} \approx 0,57.$$

5. On reprend l'arbre pondéré de la question 1 et on indique à l'extrémité droite des branches le nombre de points marqués suivant la situation



- la probabilité que Stéphane Curry marque 3 pts est

$$0,47 \times 0,44 = 0,2068 ;$$

- la probabilité que Stéphane Curry marque 2 pts est

$$0,53 \times 0,52 = 0,2756$$

(on l'a déjà calculée dans la question 2) ;

- d'après la formule des probabilités totales, la probabilité que Stéphane Curry marque 0 pt est

$$0,53 \times 0,48 + 0,47 \times 0,56 = 0,5176.$$

Remarque : Pour le 3^e calcul, on aurait pu utiliser le résultat de la question 3 et faire le calcul

$$1 - 0,4824 = 0,5176.$$

On aurait aussi pu calculer

$$1 - 0,2068 - 0,2756 = 0,5176.$$

La loi de X est donc donnée par le tableau :


x	3	2	0
$P(X = x)$	0,2068	0,2756	0,5176

Enfin, l'espérance de X est

$$E(X) = 0,2068 \times 3 + 0,2756 \times 2 + 0,5176 \times 0 = 1,1716.$$

En moyenne, Stephen Curry marque 1,171 6 point par tir.

Exercice 87



1. (a) La probabilité que la bille tirée soit bleue ou numérotée d'un nombre pair est $\frac{9}{15}$.
(Billes concernées : 2 3 4 5 6 8 10 12 14.)

Remarque : Si on note A : « le numéro est pair » et B : « la bille est bleue », alors on a calculé la probabilité de l'événement $A \cup B$. On aurait aussi pu utiliser la formule du cours de 2^{de} (pas franchement judicieuse ici, mais dont il faut se rappeler) :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- (b) Sachant que la bille tirée est verte, la probabilité qu'elle soit numérotée 7 est $\frac{1}{10}$.
(Parmi les 10 boules vertes, une seule porte le numéro 7.)

2. • $G = 5$ lorsque le joueur remporte 15 euros. Ce n'est possible que s'il tire la bille 5 (puisque $3 \times 5 = 15$) ou la bille 15.
Conclusion : $P(G = 5) = \frac{2}{15}$.


• Si le joueur choisit une bille rouge, il ne remporte rien, donc $G = -10$. On a donc $P_R(G = 0) = 0$.

• Il y a deux façons possibles d'avoir $G = -4$:

- soit le joueur tire la bille 2, et dans ce cas $G = 3 \times 2 - 10 = 6 - 10 = -4$;
- soit le joueur tire la bille 6, et dans ce cas $G = 6 - 10 = -4$.

Donc sachant que $G = -4$ il y a une chance sur deux que la bille soit bleue, une chance sur deux qu'elle soit verte :
 $P_{(G=-4)}(V) = \frac{1}{2}$.

Exercice 88 1. On représente la situation par un arbre pondéré, avec de gauche à droite le résultat du 1^{er} lancer, du 2^e et du 3^e. On note 4 pour « le dé tombe sur 4 », et $\bar{4}$ pour l'événement contraire. À chaque lancer, la probabilité d'obtenir 4 est $\frac{1}{4}$, donc les probabilités sont les mêmes sur toutes les branches ($\frac{1}{4} / \frac{3}{4}$). Enfin, on travaille avec des fractions pour éviter d'avoir des résultats avec 6 chiffres après la virgule.



On a indiqué le nombre de 4 obtenus à l'extrémité droite de l'arbre, avec une couleur différente en fonction de la réponse. Par exemple, lorsqu'on suit le chemin tout en haut, on obtient 4 au 1^{er}, au 2^e et au 3^e lancers, d'où l'indication **on a 3 fois le 4** en haut à droite.

2. Les valeurs possibles de X sont 0, 1, 2 et 3. Calculons les probabilités correspondantes :

- la probabilité d'obtenir 3 fois le 4 est :

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64} ;$$

- la probabilité d'obtenir 2 fois le 4 est :

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{64} + \frac{3}{64} + \frac{3}{64} = \frac{9}{64} ;$$

- la probabilité d'obtenir 1 fois le 4 est :

$$\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{9}{64} + \frac{9}{64} + \frac{9}{64} = \frac{27}{64} ;$$

- la probabilité d'obtenir 0 fois le 4 est :

$$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{27}{64}.$$

La loi de X est donc donnée par le tableau :

x	3	2	1	0
$P(X = x)$	$\frac{1}{64}$	$\frac{9}{64}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{27}{64}$


3. L'espérance de X est

$$E(X) = \frac{1}{64} \times 3 + \frac{9}{64} \times 2 + \frac{27}{64} \times 1 + \frac{27}{64} \times 0 = \frac{3}{64} + \frac{18}{64} + \frac{27}{64} = \frac{48}{64} = 0,75.$$

Exercice 89 Un sac contient les huit lettres suivantes : A B C D E F G H. Un jeu consiste à tirer successivement et au hasard deux lettres du sac, sans avoir remis la première avant de tirer la deuxième. On gagne 10 € par voyelle tirée. On note X le gain d'un joueur sur une partie.

1. On construit un arbre pondéré représentant la situation en indiquant à l'extrémité des branches la valeur de X .

Par exemple, si on tire une voyelle puis une consonne (événement $V_1 \cap \overline{V_2}$), alors $X = 10 + 0 = 10$.



On a donc

- $P(X = 20) = \frac{2}{8} \times \frac{1}{7} = \frac{2}{56} = \frac{1}{28}$;
- $P(X = 10) = \frac{2}{8} \times \frac{6}{7} + \frac{6}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{12}{56} + \frac{12}{56} = \frac{24}{56} = \frac{3}{7}$;
- $P(X = 0) = \frac{6}{8} \times \frac{5}{7} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}$.

2. L'espérance de X est

$$E(X) = \frac{1}{28} \times 20 + \frac{3}{7} \times 10 + \frac{15}{28} \times 0 = 5.$$

L'espérance du gain est égale à la mise, donc le jeu est parfaitement équitable.

Exercice 90 • $E(X) = \frac{2}{8} \times 0,5 + \frac{3}{8} \times 1 + \frac{3}{8} \times 2 = 1,25$.

- $V(X) = \frac{2}{8} \times (0,5 - 1,25)^2 + \frac{3}{8} \times (1 - 1,25)^2 + \frac{3}{8} \times (2 - 1,25)^2 = 0,375$.
- $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{0,375}$.

Exercice 91 • $E(X) = \frac{1}{16} \times 2 + \frac{2}{16} \times 3 + \frac{3}{16} \times 4 + \frac{4}{16} \times 5 + \frac{3}{16} \times 6 + \frac{2}{16} \times 7 + \frac{1}{16} \times 8 = \frac{1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + 3 \times 6 + 2 \times 7 + 1 \times 8}{16} = \frac{80}{16} = 5$.

- $V(X) = \frac{1}{16} \times (2 - 5)^2 + \frac{2}{16} \times (3 - 5)^2 + \frac{3}{16} \times (4 - 5)^2 + \frac{4}{16} \times (5 - 5)^2 + \frac{3}{16} \times (6 - 5)^2 + \frac{2}{16} \times (7 - 5)^2 + \frac{1}{16} \times (8 - 5)^2 = 2,5$.
- $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{2,5}$.

Exercice 92 On lance deux dés équilibrés à 4 faces, on note a et b les résultats obtenus, et Z le nombre de solutions de l'équation

$$ax^2 + bx + 1 = 0.$$

1. On complète un tableau avec la valeur de Δ en fonction de a et b , sachant que $c = 1$; et donc que

$$\Delta = b^2 - 4 \times a \times 1 = b^2 - 4a.$$

$\Delta = b^2 - 4a$		a			
		1	2	3	4
b	1	-3	-7	-11	-15
	2	0	-4	-8	-12
	3	5	1	-3	-7
	4	12	8	4	0

2. Il y a trois situations possibles :

- Si $\Delta > 0$, l'équation a deux solutions, donc $Z = 2$. Il y a 5 cases du tableau où $\Delta > 0$, donc

$$P(Z = 2) = \frac{5}{16}.$$

- Si $\Delta = 0$, l'équation a une solution, donc $Z = 1$. Il y a 2 cases du tableau où $\Delta = 0$, donc

$$P(Z = 1) = \frac{2}{16}.$$

- Si $\Delta < 0$, l'équation n'a aucune solution, donc $Z = 0$. Il y a 9 cases du tableau où $\Delta < 0$, donc

$$P(Z = 0) = \frac{9}{16}.$$

On en déduit

$$E(Z) = \frac{5}{16} \times 2 + \frac{2}{16} \times 1 + \frac{9}{16} \times 0 = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}.$$

Exercice 93 1. On lance un dé à 6 faces, on pose

$$X = \begin{cases} 1 & \text{si le dé tombe sur 6,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Dans ce cas

$$P(X=1) = \frac{1}{6} \quad \text{et} \quad P(X=0) = \frac{5}{6} = 1 - \frac{1}{6},$$

donc X suit la loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{6}$.

On a alors

$$E(X) = \frac{1}{6} \times 1 + \frac{5}{6} \times 0 = \frac{1}{6};$$

$$V(X) = \frac{1}{6} \times \left(1 - \frac{1}{6}\right)^2 + \frac{5}{6} \times \left(0 - \frac{1}{6}\right)^2 = \frac{5}{36}.$$

2. Dans le cas général,

$$P(X=1) = p, \quad P(X=0) = 1 - p,$$

donc

$$E(X) = p \times 1 + (1 - p) \times 0 = p;$$

$$V(X) = p \times (1 - p)^2 + (1 - p) \times (0 - p)^2 = p \times (1 - p) \times (1 - p) + p \times (1 - p) \times p = p \times (1 - p) \times \underbrace{(1 - p + p)}_1 = p(1 - p).$$

3. On étudie les variations de la fonction définie par

$$f(p) = p(1 - p) = p - p^2, \quad \text{pour } 0 \leq p \leq 1.$$

Pour tout $0 \leq p \leq 1$,

$$f'(p) = 1 - 2p.$$

Or $1 - 2p = 0 \iff p = \frac{1}{2}$, donc on a le tableau de variations :

p	0	$\frac{1}{2}$	1
$f'(p)$	+	0	-
$f(p)$	0	$\frac{1}{4}$	0

Le maximum de f est $\frac{1}{4}$, donc pour tout $0 \leq p \leq 1$:

$$V(X) = p(1 - p) \leq \frac{1}{4}.$$


Deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leurs carrés, donc

$$\sqrt{V(X)} \leq \sqrt{\frac{1}{4}},$$

soit $\sigma(X) \leq \frac{1}{2}.$

8 Produit scalaire

Exercice 94 1.



2. On a $A(0 ; 4)$ et $B(6 ; 1)$, donc

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 - 0 \\ 1 - 4 \end{pmatrix} = \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

De même $C(-2 ; 0)$, $D(4 ; -3)$, donc

$$\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} x_D - x_C \\ y_D - y_C \end{pmatrix} = \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 4 - (-2) \\ -3 - 0 \end{pmatrix} = \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Conclusion : \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{CD} ont les mêmes coordonnées, donc ils sont égaux : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.


D'après une propriété du cours de 2^{de}, cela entraîne que $ABDC$ est un parallélogramme.

3. On calcule la longueur des diagonales :

- $AD = \sqrt{(x_D - x_A)^2 + (y_D - y_A)^2} = \sqrt{(4 - 0)^2 + (-3 - 4)^2} = \sqrt{4^2 + (-7)^2} = \sqrt{16 + 49} = \sqrt{65}.$
- $BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} = \sqrt{(-2 - 6)^2 + (0 - 1)^2} = \sqrt{(-8)^2 + (-1)^2} = \sqrt{64 + 1} = \sqrt{65}.$

Les diagonales du parallélogramme $ABDC$ sont de même longueur, donc c'est un rectangle (propriété du collège).

Exercice 95 $ABCD$ est un parallélogramme de centre O .



1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AO}$ (relation de Chasles)

2.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} &= \overrightarrow{AA} \\ &= \vec{0} \end{aligned}$$

(relation de Chasles)

(vecteur nul – de longueur 0).

3.


$$\begin{aligned}\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} && \text{(on peut intervertir l'ordre)} \\ &= \overrightarrow{AD} && \text{(relation de Chasles)}\end{aligned}$$

4. $ABCD$ est un parallélogramme, donc d'après une propriété du cours 2^{de}, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. On a donc :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CO} &= \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CO} && \text{(propriété susmentionnée)} \\ &= \overrightarrow{DO} && \text{(relation de Chasles)}\end{aligned}$$

Exercice 96 Soient $A(-1; -1)$, $B(3; 0)$, $C(1; 2)$ et soit I le milieu de $[BC]$.

Commençons par la figure et une justification rapide de l'égalité à démontrer.



On définit un point D par l'égalité $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ (somme des vecteurs rouge et vert sur la figure). Dans ce cas, $ABDC$ est un parallélogramme; et comme les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, le milieu I de $[BC]$ est aussi le milieu de $[AD]$. Par conséquent $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AI}$; et donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AI}$.

On démontre ce résultat de deux autres façons dans les questions 1 et 2 : d'abord avec les coordonnées, puis avec la relation de Chasles.

1. D'une part

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 - (-1) \\ 0 - (-1) \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

et

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} x_C - x_A \\ y_C - y_A \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 - (-1) \\ 2 - (-1) \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

donc

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 4+2 \\ 1+3 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

D'autre part, I est le milieu de $[BC]$, donc

$$I \left(\frac{x_B + x_C}{2}, \frac{y_B + y_C}{2} \right) \quad I \left(\frac{3+1}{2}, \frac{0+2}{2} \right) \quad I(2; 1),$$

puis

$$\overrightarrow{AI} \begin{pmatrix} x_I - x_A \\ y_I - y_A \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AI} \begin{pmatrix} 2 - (-1) \\ 1 - (-1) \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AI} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix};$$

et finalement

$$2\overrightarrow{AI} \begin{pmatrix} 2 \times 3 \\ 2 \times 2 \end{pmatrix} \quad 2\overrightarrow{AI} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Conclusion : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ et $2\overrightarrow{AI}$ ont les mêmes coordonnées, donc ils sont égaux :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AI}.$$

2. D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}, \quad \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC}.$$

Or I est le milieu de $[BC]$, donc $\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{BI}$. On a donc, à nouveau grâce à la relation de Chasles :


$$\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{II} = \vec{0}.$$

Finalement,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} &= (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}) + (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC}) \\ &= 2\overrightarrow{AI} + \underbrace{\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}}_{=\vec{0}} \\ &= 2\overrightarrow{AI}. \end{aligned}$$

Exercice 97 La force résultante, représentée par le vecteur $\overrightarrow{F_R}$, s'obtient en ajoutant les vecteurs $\overrightarrow{F_1}$ et $\overrightarrow{F_2}$. Son intensité correspond à la longueur du vecteur $\overrightarrow{F_R}$, que l'on calcule grâce au théorème de Pythagore : on obtient


$$\|\overrightarrow{F_R}\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5 \text{ N}.$$



Remarque : La situation de deux vecteurs qui ne sont pas à angle droit est plus délicate. Elle peut être résolue grâce au produit scalaire (à essayer en autonomie en fin de leçon).

À partir de maintenant, on ne détaille plus les calculs des coordonnées de vecteurs dans les corrigés.

Exercice 98



1. On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} \begin{smallmatrix} x' \\ y' \end{smallmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = xx' + yy' = 6 \times 2 + 4 \times 7,5 = 12 + 30 = 42.$$

⚠ Ce n'est pas une multiplication : On n'a pas $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC!!!$ Le produit des longueurs n'est pas égal au produit vectoriel – sauf quand les vecteurs sont colinéaires et de même sens (voir suite du cours).

2. On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}$ et $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -4,5 \\ 3,5 \end{pmatrix} \begin{smallmatrix} x' \\ y' \end{smallmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = xx' + yy' = 6 \times (-4,5) + 4 \times 3,5 = -27 + 14 = -13.$$

3. On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = x \times x + y \times y = 6 \times 6 + 4 \times 4 = 36 + 16 = 52.$$

Remarque : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = x^2 + y^2 = \sqrt{x^2 + y^2}^2 = AB^2$.

Par ailleurs, on constate que

$$\underbrace{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}_{39} = \underbrace{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}}_{52} + \underbrace{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}}_{-13},$$

c'est-à-dire que

$$\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}.$$

On peut « distribuer » !

4. On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}$ et $\overrightarrow{AH} \begin{pmatrix} 4,5 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{smallmatrix} x' \\ y' \end{smallmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = xx' + yy' = 6 \times 4,5 + 4 \times 3 = 27 + 12 = 39.$$


5. On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}$ et $\overrightarrow{HC} \begin{pmatrix} -3 \\ 4,5 \end{pmatrix} \begin{smallmatrix} x' \\ y' \end{smallmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HC} = xx' + yy' = 6 \times (-3) + 4 \times 4,5 = -18 + 18 = 0.$$

Remarque : Le fait que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HC} = 0$ implique que $(AB) \perp (HC)$ (cf suite du cours). Par ailleurs, comme dans la question 3, on constate que l'on peut distribuer :

$$\underbrace{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}_{39} = \underbrace{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}}_{39} + \underbrace{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HC}}_0.$$

Exercice 99 1. Soient $A(0; -4)$, $B(3; 0,5)$, $C(-2; 2)$ et $D(1; 0)$.




On calcule les produits scalaires : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4,5 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 3 \times 3 + 4,5 \times (-2) = 0.$$

Par conséquent, les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires.

2. Soient $O(0;0)$, $A(2;0)$, $B(0;2)$, $M(3;-4)$ et $M'(-4;-3)$.



La médiane issue de O dans le triangle OAM est la droite (OI) , où I est le milieu de $[AM]$. Pour prouver que cette médiane est la hauteur issue de O dans le triangle OBM' , il suffit de prouver que $(OI) \perp (BM')$.

On calcule d'abord les coordonnées de I :

$$I\left(\frac{2+3}{2}; \frac{0+(-4)}{2}\right) \quad I(2,5; -2),$$

puis celle des vecteurs :


$$\overrightarrow{OI}\begin{pmatrix} 2,5 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{BM'}\begin{pmatrix} -4 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

On en déduit

$$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{BM'} = 2,5 \times (-4) + (-2) \times (-5) = 0,$$

et donc que $(OI) \perp (BM')$ – ce que l'on devait démontrer.

Exercice 100 $ABCD$ est un carré de côté 3, $AEFG$ est un carré de côté 2, avec D , A et G alignés, ainsi que B , A et E comme sur la figure ci-dessous. Le point I est le milieu du segment $[DE]$.



1. On travaille dans un repère de centre A dans lequel $B(3;0)$ et $D(0;3)$. Dans ce repère :

$$E(-2;0), \quad G(0;-2),$$

puis comme I est le milieu de $[DE]$:

$$I\left(\frac{0+(-2)}{2}; \frac{3+0}{2}\right) \quad I(-1; 1,5).$$

2. On calcule les coordonnées des vecteurs :

$$\overrightarrow{AI}\begin{pmatrix} -1 \\ 1,5 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{BG}\begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

On en déduit

$$\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BG} = -1 \times (-3) + 1,5 \times (-2) = 0,$$

et donc que $(AI) \perp (BG)$.

Exercice 101 On reprend l'énoncé de l'exercice précédent, que l'on va traiter sans utiliser les coordonnées.

1. On utilise la relation de Chasles et le fait que I est le milieu de $[DE]$:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} &= \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{ID} + \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IE} && \text{(relation de Chasles)} \\ &= 2\overrightarrow{AI} + \underbrace{\overrightarrow{ID} + \overrightarrow{IE}}_{\vec{0}} && \text{(on réduit et on utilise le fait que } I \text{ est le milieu de } [DE]) \\ &= 2\overrightarrow{AI}\end{aligned}$$

2. Par bilinéarité du produit scalaire :

$$(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}) \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AG}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AG}.$$

3. On calcule chacun des quatre produits scalaires :

- $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BA} = 0$, car $(AD) \perp (BA)$.
- $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AG} = -AD \times AG = -3 \times 2 = -6$, car \overrightarrow{AD} et \overrightarrow{AG} sont colinéaires et de sens contraire.
- $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BA} = AE \times BA = 2 \times 3 = 6$ car \overrightarrow{AE} et \overrightarrow{BA} sont colinéaires et de même sens.
- $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AG} = 0$ car $(AE) \perp (AG)$.

4. On sait que $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AI}$ (question 1) ; et d'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{BG}$.
L'égalité de la question 2 se réécrit donc :


$$(2\overrightarrow{AI}) \cdot \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AG}.$$

Autrement dit, d'après la question 3 :

$$2(\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BG}) = 0 + (-6) + 6 + 0 = 0.$$

On en déduit que $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BG} = 0$; et donc que les droites (AI) et (BG) sont perpendiculaires.

Exercice 102 $ABCD$ est un carré de côté 4, I est le milieu de $[AB]$, J le milieu de $[BC]$.



1. Par bilinéarité du produit scalaire :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CI} \cdot \overrightarrow{DJ} &= (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BI}) \cdot (\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CJ}) \\ &= \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CJ} + \overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{CJ}.\end{aligned}$$

2. On calcule chacun des quatre produits scalaires :

- $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{DC} = 0$, car $(CB) \perp (DC)$.
- $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CJ} = CB \times CJ = 4 \times 2 = 8$, car \overrightarrow{CB} et \overrightarrow{CJ} sont colinéaires et de même sens.
- $\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{DC} = -BI \times DC = -2 \times 4 = -8$ car \overrightarrow{BI} et \overrightarrow{DC} sont colinéaires et de sens contraire.
- $\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{CJ} = 0$ car $(BI) \perp (CJ)$.

3. D'après les questions 1 et 2 :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CI} \cdot \overrightarrow{DJ} &= \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CJ} + \overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{CJ} \\ &= 0 + 8 + (-8) + 0 = 0.\end{aligned}$$

On en déduit que les droites (CI) et (DJ) sont perpendiculaires.

4. On travaille dans un repère de centre A où $I(2;0)$, $J(4;2)$, $C(4;4)$ et $D(0;4)$.

Dans ce repère,

$$\overrightarrow{CI} \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{DJ} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

On en déduit

$$\overrightarrow{CI} \cdot \overrightarrow{DJ} = -2 \times 4 + (-4) \times (-2) = 0,$$

et donc que $(CI) \perp (DJ)$.

Exercice 103 On se propose de démontrer la propriété bien connue :

Les hauteurs d'un triangle sont concourantes.

1. On écrit $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB}$ et on développe

$$\begin{aligned}\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CA} &= (\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BC} + (\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{CA} \\ &= \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}.\end{aligned}$$

Puis on met \overrightarrow{DA} en facteur :

$$\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{DA} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}) + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}. \quad (6)$$

Or

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} \stackrel{\text{Chasles}}{=} \overrightarrow{AA} = \vec{0},$$

donc

$$\overrightarrow{DA} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}) = \overrightarrow{DA} \cdot \vec{0} = 0;$$


et

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA}) \stackrel{\text{Chasles}}{=} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{AB} \cdot \vec{0} = 0.$$

Reprenant (6), il vient

$$\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CA} = 0 + 0 = 0.$$

2. On construit un triangle ABC , puis H le point d'intersection des hauteurs issues de B et C .



On utilise la question 1, en prenant $D = H$:

$$\overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{CA} = 0. \quad (7)$$

Par construction, $(HB) \perp (AC)$ et $(HC) \perp (AB)$, donc

$$\overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{CA} = 0.$$

On en déduit, grâce à (7),

$$\overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0;$$

et donc que (HA) est perpendiculaire à (BC) .

Conclusion : (HA) est la hauteur issue de A , donc les trois hauteurs sont concourantes en H .

Exercice 104 1. D'après la bilinéarité et la symétrie du produit scalaire, pour tous vecteurs \vec{u}, \vec{v} :

$$\begin{aligned} \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} + (-\vec{v})) \cdot (\vec{u} + (-\vec{v})) \\ &= \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot (-\vec{v}) + (-\vec{v}) \cdot \vec{u} + (-\vec{v}) \cdot (-\vec{v}) \\ &= \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2. \end{aligned}$$

2. On en déduit

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) &= \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - (\|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2)) \\ &= \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} - \|\vec{v}\|^2) \\ &= \vec{u} \cdot \vec{v}. \end{aligned}$$

Exercice 105 1. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, donc

$$\|\vec{u}\| = AB, \quad \|\vec{v}\| = AC, \quad \|\vec{u} - \vec{v}\| = \|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\| = \|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA}\| = \|\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{CB}\| = CB.$$

L'égalité de l'exercice 104 se réécrit alors :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2).$$

2. ABC est un triangle tel que $AB = 6$, $AC = 5$, $BC = 3$. On a donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2) = \frac{1}{2} (6^2 + 5^2 - 3^2) = 26.$$


3. Soient A, B, C trois points du plan tels que $A \neq B$ et $A \neq C$. D'après le théorème de Pythagore et sa réciproque, et d'après la question 1 :

$$(AB) \perp (AC) \Leftrightarrow ABC \text{ rectangle en } A \Leftrightarrow AB^2 + AC^2 = BC^2 \Leftrightarrow \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2) = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0.$$

Exercice 106 D'après la formulation du produit scalaire avec le cosinus :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} = 4 \times 3 \times \cos(45^\circ) = 12 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2}.$$

Exercice 107 1. **Cas n°1.** $A(0; -1)$, $B(6; 3)$ et $C(2; 4)$.



On calcule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ de deux façons différentes :

- **Avec les coordonnées :**

$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6 \times 2 + 4 \times 5 = 32.$$

- **Avec le cosinus :**

$AB = \sqrt{(6-0)^2 + (3-(-1))^2} = \sqrt{52}$ et $AC = \sqrt{(2-0)^2 + (4-(-1))^2} = \sqrt{29}$, donc


$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} = \sqrt{52} \times \sqrt{29} \times \cos \widehat{BAC}.$$

On compare les deux résultats et on en déduit \widehat{BAC} :

$$\sqrt{52} \times \sqrt{29} \times \cos \widehat{BAC} = 32 \implies \cos \widehat{BAC} = \frac{32}{\sqrt{52} \times \sqrt{29}} \implies \widehat{BAC} = \arccos\left(\frac{32}{\sqrt{52} \times \sqrt{29}}\right) \approx 35^\circ.$$

⚠ Il faut penser à mettre la calculatrice en mode degrés.

2. **Cas n°2.** ABC est un triangle tel que $AB = 4$, $AC = 5$, $BC = 6$.



On calcule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ de deux façons différentes :

- **Avec les longueurs :**

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2) = \frac{1}{2} (4^2 + 5^2 - 6^2) = 2,5.$$

- **Avec le cosinus :**

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} = 4 \times 5 \times \cos \widehat{BAC} = 20 \cos \widehat{BAC}.$$

On compare les deux résultats et on en déduit \widehat{BAC} :

$$20 \cos \widehat{BAC} = 2,5 \implies \cos \widehat{BAC} = \frac{2,5}{20} = 0,125 \implies \widehat{BAC} = \arccos(0,125) \approx 83^\circ.$$

Exercice 108 On calcule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ avec deux formulations différentes du produit scalaire :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} \\ \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2).\end{aligned}$$

On en déduit

$$AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} = \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2),$$

puis

$$2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} = AB^2 + AC^2 - BC^2.$$

Enfin, en transposant :

$$AB^2 + AC^2 - BC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} = 0.$$

On pose $AC = x$ (longueur inconnue) et on remplace par les données de l'énoncé :

$$\begin{aligned}4^2 + x^2 - \sqrt{21}^2 - 2 \times 4 \times x \times \cos 60^\circ &= 0 \\ 16 + x^2 - 21 - 8x \times \frac{1}{2} &= 0 \\ x^2 - 4x - 5 &= 0.\end{aligned}$$

On résout cette équation du 2^d degré (je ne détaille pas) : il y a deux solutions


$$x_1 = -1, \quad x_2 = 5.$$

Or $x = AC$ est une longueur, donc elle est positive. On a donc $AC = 5$.

Exercice 109 Dans chaque cas, on fait une figure et on calcule le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Il est souvent possible d'utiliser plusieurs formulations pour effectuer le calcul. Généralement, l'une d'entre elles est plus simple que les autres; mais parfois, elles « se valent ». Dans ce cas, on en a choisi une et on a indiqué quelles autres méthodes nous semblaient appropriées.


1. ABC est un triangle tel que $AB = 3$, $AC = 2$, $\widehat{BAC} = 30^\circ$.



On utilise la formulation avec le cosinus :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} = 3 \times 2 \times \cos(30^\circ) = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}.$$

2. $A(2;2)$, $B(-1;0)$, $C(3;0)$.




On utilise la formulation avec les coordonnées :

$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -3 \times 1 + (-2) \times (-2) = 1.$$

3. ABC est isocèle en C et $AB = 3$.

On a une certaine liberté pour placer C , puisque toutes les longueurs ne sont pas données. Cependant, quelle que soit la figure, on aura la même réponse finale pour le produit scalaire.




On utilise la formulation avec le projeté orthogonal : ABC est isocèle en C , donc le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) est le milieu H du segment $[AB]$. Ainsi

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AH = 3 \times 1,5 = 4,5.$$

Remarque : On aurait pu décomposer $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HC}$, puis développer grâce à la bilinéarité du produit scalaire. On aurait également pu utiliser la formulation avec les longueurs, sachant que AC^2 et BC^2 se compensent dans le calcul.


4. $ABCD$ est un parallélogramme tel que $AB = 4$, $AC = 6$, $AD = 3$.



On utilise la formulation avec les longueurs : $ABCD$ est un parallélogramme, donc $BC = AD = 3$ et

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2) = \frac{1}{2} (4^2 + 6^2 - 3^2) = 21,5.$$

5. $ABCD$ est un carré de côté 5.




On utilise un repère de centre A , où $B(5;0)$ et $C(5;5)$. Il vient $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5 \times 5 + 0 \times 5 = 25.$$

Remarque : On aurait pu utiliser, au choix, l'une des trois autres formulations du produit scalaire pour faire le calcul. En effet, $AC = 5\sqrt{2}$ (application directe du théorème de Pythagore), $\widehat{BAC} = 45^\circ$, et C se projette orthogonalement en B sur (AB) . On peut donc utiliser la formulation avec les longueurs (on connaît toutes celles utiles), la formulation avec le cosinus (on connaît les longueurs et l'angle utiles), ou encore la formulation avec le projeté orthogonal.


6. $BCKL$ est un rectangle tel que $BC = 4$ et $BL = 3$, A est défini par $\overrightarrow{LA} = \frac{1}{4}\overrightarrow{LK}$.



On utilise un repère de centre $B(0;0)$, où $C(4;0)$ et $A(1;3)$. Il vient $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1 \times 3 + (-3) \times (-3) = 6.$$

7. $ABCD$ est un parallélogramme tel que $AB = 5$, $AD = 2$ et $\widehat{BAD} = 120^\circ$.



On développe grâce à la bilinéarité du produit scalaire :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC}.$$

Or

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = AB \times AD \times \cos \widehat{BAD} = 5 \times 2 \times \cos(120^\circ) = 10 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -5$$


et $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (puisque $ABCD$ est un parallélogramme), donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2 = 5^2 = 25.$$

Finalement

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC} = -5 + 25 = 20.$$

Exercice 110 \mathcal{C} est un cercle de centre I , de rayon R et de diamètre $[AB]$.



1. Par bilinéarité et symétrie du produit scalaire :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) \\ &= \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} \\ &= \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{MI} \cdot (\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IA}) + \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB}. \end{aligned}$$

Or

- $\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{MI} = MI^2$ (propriété du cours).
- $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IA} = \vec{0}$, puisque I est le milieu de $[AB]$, donc

$$\overrightarrow{MI} \cdot (\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IA}) = \overrightarrow{MI} \cdot \vec{0} = 0.$$

- \overrightarrow{IA} et \overrightarrow{IB} sont colinéaires et de sens contraire, et $IA = IB = R$, donc

$$\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} = -IA \times IB = -R \times R = -R^2.$$

Rassemblant ce qui précède, on obtient

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 + 0 + (-R^2) = MI^2 - R^2.$$

2. D'après la question 1, on a l'équivalence :

$$M \in \mathcal{C} \iff MI = R \iff MI^2 = R^2 \iff MI^2 - R^2 = 0 \iff \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0.$$

Remarque : L'égalité $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est encore équivalente à $(MA) \perp (MB)$ (pourvu que M ne soit confondu ni avec A , ni avec B), donc au fait que AMB est un triangle rectangle en M .

Ce résultat a été énoncé et démontré par Thalès, dans l'antiquité. C'est le premier théorème de géométrie qu'un mathématicien ait pris la peine de démontrer.

Exercice 111 1. D'après la bilinéarité et la symétrie du produit scalaire, pour tous vecteurs \vec{u}, \vec{v} :

$$\begin{aligned}
\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) \\
&= \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} \\
&= \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.
\end{aligned}$$


On a aussi :

$$\begin{aligned}
\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} + (-\vec{v})) \cdot (\vec{u} + (-\vec{v})) \\
&= \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot (-\vec{v}) + (-\vec{v}) \cdot \vec{u} + (-\vec{v}) \cdot (-\vec{v}) \\
&= \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.
\end{aligned}$$

Donc en additionnant :

$$\begin{aligned}
\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 + \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \\
\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2.
\end{aligned}$$

2. $ABCD$ est un parallélogramme.



On utilise la question 1, avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$:

D'une part

$$\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC},$$

d'autre part $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $-\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB}$, donc

$$\vec{u} - \vec{v} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DB}.$$

L'égalité

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2$$

se réécrit donc

$$\|\overrightarrow{AC}\|^2 + \|\overrightarrow{DB}\|^2 = 2\|\overrightarrow{AB}\|^2 + 2\|\overrightarrow{BC}\|^2,$$

et avec les longueurs :

$$AC^2 + BD^2 = 2AB^2 + 2BC^2.$$

Enfin, $AB = CD$ et $BC = DA$, puisque $ABCD$ est un parallélogramme, donc

$$AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2.$$

9 Variations des fonctions

Exercice 112 1. La fonction f est définie sur \mathbb{R} par

$$f(x) = -x^2 + 4x - 3.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = -2x + 4 \times 1 - 0 = -2x + 4.$$

La dérivée est du premier degré, donc pour obtenir le tableau de signe, il faut résoudre une équation, puis regarder le signe de a :

- $-2x + 4 = 0 \iff -2x = -4 \iff x = \frac{-4}{-2} = 2.$
- $a = -2 \implies a \ominus \implies$ signe de la forme $\boxed{+ \phi -}$

On construit le tableau de signe de f' et on en déduit le tableau de variations de f :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;">1</div> </div>		

2. La fonction g est définie sur \mathbb{R} par

$$g(x) = 0,5x^3 + 0,5x^2 - 4x - 1.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = 0,5 \times 3x^2 + 0,5 \times 2x - 4 \times 1 - 0 = 1,5x^2 + x - 4.$$

La dérivée est du second degré, donc on utilise la méthode du chapitre 4 pour étudier son signe :

- $a = 1,5, b = 1, c = -4.$
- le discriminant est $\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 1,5 \times (-4) = 25.$
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 - \sqrt{25}}{2 \times 1,5} = \frac{-1 - 5}{3} = \frac{-6}{3} = -2,$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 + \sqrt{25}}{2 \times 1,5} = \frac{-1 + 5}{3} = \frac{4}{3}.$$

3. La fonction h est définie sur \mathbb{R}^* par

$$h(x) = x + \frac{4}{x}.$$

$\triangle 0$ est « valeur interdite », car on ne peut pas diviser par 0 – d'où l'ensemble de définition : $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$ (ensemble de tous les nombres réels, sauf 0).


Pour dériver, le plus simple est de réécrire $h(x)$ sous la forme

$$h(x) = x + 4 \times \frac{1}{x}.$$

On obtient donc le tableau :

$$f(2) = -2^2 + 4 \times 2 - 3 = -4 + 8 - 3 = 1.$$

La courbe représentative est une parabole, dont le sommet S a pour coordonnées (2; 1) ; et que l'on trace à l'aide d'un tableau de valeurs.



$$a = 1,5 \implies a \oplus \implies \text{signe de la forme } \boxed{+ \phi - \phi +}$$

On construit le tableau de signe de g' et on en déduit le tableau de variations de g :

x	$-\infty$	-2	$\frac{4}{3}$	$+\infty$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	<div><div></div><div><div>5</div><div>$-\frac{115}{27}$</div></div><div></div></div>				

- $g(-2) = 0,5 \times (-2)^3 + 0,5 \times (-2)^2 - 4 \times (-2) - 1 = 5$
- $g(1) = 0,5 \times \left(\frac{4}{3}\right)^3 + 0,5 \times \left(\frac{4}{3}\right)^2 - 4 \times \left(\frac{4}{3}\right) - 1 = -\frac{115}{27}$

On obtient alors, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$h'(x) = 1 + 4 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2}{x^2} - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}.$$

- Les racines de $x^2 - 4$ sont évidentes : ce sont $x_1 = -2$ et $x_2 = 2$. De plus


$$a = 1 \implies a \oplus \implies \text{signe de la forme } \boxed{+ \phi - \phi +}.$$

- x^2 est positif sur \mathbb{R} et s'annule uniquement pour $x = 0$.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$		
$x^2 - 4$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$	
x^2	$+$		$+$	0	$+$	$+$	
$h'(x)$	$+$	0	$-$		$-$	0	$+$
$h(x)$	<div><div></div><div>-4</div><div></div></div>				<div><div></div><div>4</div><div></div></div>		

- La double barre en 0 traduit le fait que 0 est « valeur interdite » pour h' et pour h (on renvoie au cours de 2^{de} sur le signe d'un quotient).
- \triangle Les flèches au centre ne coupent pas la double barre : h est strictement décroissante sur chacun des deux intervalles $[-2; 0[$ et $]0; 2]$.
- On calcule les valeurs aux extrémités des flèches :
 - $h(2) = 2 + \frac{4}{2} = 4$;
 - $h(-2) = -2 + \frac{4}{-2} = -4$.

Pour finir, on construit la courbe représentative grâce à un tableau de valeurs. On notera le choix d'un repère non orthonormé, pour s'adapter aux fortes variations d'amplitude « en y ».



Exercice 113 La fonction f est définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = 3x^2 - 3.$$

La dérivée est du 2^d degré. On résout sans utiliser le discriminant (on s'en passe facilement) :

$$3x^2 - 3 = 0 \iff 3x^2 = 3 \iff x^2 = \frac{3}{3} = 1$$

$$\iff (x = 1 \text{ ou } x = -1).$$

On obtient le signe de f' et on en déduit les variations de f :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div>				

- $f(-1) = (-1)^3 - 3 \times (-1) = -1 + 3 = 2$.
- $f(1) = 1^3 - 3 \times 1 = 1 - 3 = -2$.

2. (a) L'équation de (T) est

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0).$$

Or $f(0) = 0^3 - 3 \times 0 = 0$ et $f'(0) = 3 \times 0^2 - 3 = -3$. On a donc

$$(T) : y = -3(x - 0) + 0$$

$$(T) : y = -3x.$$

- (b) Comme dans le chapitre 4, pour étudier les positions relatives de $(T) : y = x^3 - 3x$ et $(C) : y = -3x$, on étudie le signe de la différence : pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(x^3 - 3x) - (-3x) = x^3 - 3x + 3x = x^3.$$


Le signe de x^3 est clair :

- $x^3 = 0$ lorsque $x = 0$;
- x^3 est \oplus lorsque x est strictement positif ;
- x^3 est \ominus lorsque x est strictement négatif.


On obtient donc le tableau :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^3	$-$	0	$+$
Positions relatives des courbes	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> (C) en-dessous de (T) </div> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> $\begin{matrix} S \\ e \\ c \\ o \\ u \\ p \\ e \\ n \\ t \end{matrix}$ </div> <div style="text-align: center;"> (C) au-dessus de (T) </div> </div>		

3.



Exercice 114 On considère un segment $[AB]$ de longueur 4 et un point mobile M pouvant se déplacer librement sur ce segment.



On note x la longueur du segment $[AM]$ et $f(x)$ le produit des longueurs $AM \times BM$.

1. $BM = AB - AM = 4 - x$, donc

$$\begin{aligned}
 f(x) &= AM \times BM \\
 &= x \times (4 - x) \\
 &= x \times 4 + x \times (-x) \\
 &= 4x - x^2.
 \end{aligned}$$

2. Le produit des longueurs $AM \times BM$ est donné par $f(x)$, donc maximiser ce produit revient à maximiser la fonction f . On étudie donc les variations : pour tout $x \in [0; 4]$,

$$f'(x) = 4 - 2x = -2x + 4.$$

On résout :

- $-2x + 4 = 0 \iff -2x = -4 \iff x = \frac{-4}{-2} = 2.$
- $a = -2 \implies a \ominus \implies \boxed{+ \phi -}$

On obtient le tableau de signe de f' et le tableau de variations de f :

x	0	2	4
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> \nearrow </div> <div style="text-align: center;"> \searrow </div> </div>		

Il n'est pas utile ici de compléter l'extrémité des flèches : tout ce qui nous intéresse, c'est la valeur de x pour laquelle f atteint son maximum.

Conclusion : f atteint son maximum lorsque $x = 2$, donc le produit $AM \times BM$ est maximal lorsque $x = 2$; c'est-à-dire quand M est le milieu de $[AB]$.

Remarque : Cet exemple est celui qu'a choisi Fermat vers 1637 pour exposer sa méthode de l'adégalité – ancêtre de la dérivation – pour déterminer le maximum et le minimum d'une fonction.

Exercice 115 1. x est une longueur, donc $0 \leq x$. D'autre part, la longueur x apparaît deux fois, donc comme la plaque de métal a pour côté 10, x ne peut dépasser 5. Autrement dit :

$$0 \leq x \leq 5.$$

Le carré du fond a pour côté $10 - x - x = 10 - 2x$, et la hauteur de la boîte est x .

Donc le volume de la boîte est

$$L \times \ell \times h = (10 - 2x) \times (10 - 2x) \times x \text{ cm}^3.$$

On développe :

$$\begin{aligned} & (10 - 2x) \times (10 - 2x) \times x \\ &= (10 \times 10 - 10 \times 2x - 2x \times 10 + 2x \times 2x) \times x \\ &= (100 - 20x - 20x + 4x^2) \times x \\ &= 100x - 20x^2 - 20x^2 + 4x^3 \\ &= 4x^3 - 40x^2 + 100x. \end{aligned}$$

C'est bien la formule de l'énoncé.

2. Pour tout $x \in [0; 5]$ on pose $V(x) = 4x^3 - 40x^2 + 100x$. On a alors

Exercice 116 1. La fonction f est définie sur $\mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$ par

$$f(x) = \frac{3x-2}{2x-1}.$$

On notera la valeur interdite $x = \frac{1}{2}$, puisque le dénominateur s'annule pour cette valeur de x :

$$2x - 1 = 0 \iff 2x = 1 \iff x = \frac{1}{2}.$$

Venons-en au calcul de la dérivée. La fonction f s'écrit comme un quotient : $f = \frac{u}{v}$, avec

$$\begin{aligned} u(x) &= 3x - 2 & u'(x) &= 3, \\ v(x) &= 2x - 1 & v'(x) &= 2. \end{aligned}$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2} \\ &= \frac{3 \times (2x - 1) - (3x - 2) \times 2}{(2x - 1)^2} \\ &= \frac{6x - 3 - (6x - 4)}{(2x - 1)^2} \\ &= \frac{6x - 3 - 6x + 4}{(2x - 1)^2} \\ &= \frac{1}{(2x - 1)^2}. \end{aligned}$$


$$V'(x) = 4 \times 3x^2 - 40 \times 2x + 100 \times 1 = 12x^2 - 80x + 100.$$

On étudie le signe de V' et on en déduit les variations de V :

- $\Delta = b^2 - 4ac = (-80)^2 - 4 \times 12 \times 100 = 1600$.
- $\Delta > 0$, donc il y a donc deux racines :


$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-80) - \sqrt{1600}}{2 \times 12} = \frac{80 - 40}{24} = \frac{40}{24} = \frac{5}{3}, \\ x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{80 + 40}{24} = \frac{120}{24} = 5. \end{aligned}$$

On obtient donc :


x	0	$\frac{5}{3}$	5
$V'(x)$	+	0	-
$V(x)$			

D'après le tableau de variations, le volume de la boîte est maximal lorsque $x = \frac{5}{3}$.

On en déduit le tableau de signe de f' et le tableau de variations de f :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
1	+		+
$(2x - 1)^2$	+	0	+
$f'(x)$	+		+
$f(x)$			

- On a tracé en pointillés rouges la droite verticale d'équation $x = \frac{1}{2}$, qui coupe la courbe en deux au niveau de la valeur interdite.
- Que se passe-t-il pour de « grandes » valeurs de x ? Par exemple, $f(1000) = \frac{3 \times 3000 - 2}{2 \times 1000 - 1} = \frac{2998}{1999} \approx 1,4997$. En fait, $f(1000) \approx \frac{3000}{2000} = 1,5$; et d'une manière générale, les valeurs de $f(x)$ se rapprochent de 1,5 lorsque x tend vers $+\infty$.
On laisse le lecteur se convaincre du fait qu'il se passe la même chose en $-\infty$; et donc que l'on se rapproche de la droite d'équation $y = 1,5$ (tracée en pointillés verts), à la fois en $+\infty$ et en $-\infty$.
- Finalement, un tableau de valeurs avec les valeurs $x = 0$ et $x = 1$, les droites en pointillés et les variations sont suffisantes pour faire un tracé très précis.



2. La fonction g est définie sur \mathbb{R} par

$$g(x) = (x^2 - x - 2)^2.$$

Pour calculer la dérivée, il faut écrire astucieusement

$$g(x) = (x^2 - x - 2) \times (x^2 - x - 2),$$

donc $g = u \times v$, avec :

$$u(x) = x^2 - x - 2 \quad u'(x) = 2x - 1,$$

$$v(x) = x^2 - x - 2 \quad v'(x) = 2x - 1.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= (2x - 1) \times (x^2 - x - 2) + (x^2 - x - 2) \times (2x - 1) \\ &= 2 \times (2x - 1) \times (x^2 - x - 2). \end{aligned}$$

⚠ Surtout, ne pas développer ! Sinon, on obtiendra une expression de degré 3, dont on ne pourra plus étudier le signe.

• On résout :

$$2x - 1 = 0 \iff 2x = 1 \iff x = \frac{1}{2}.$$

• On étudie $x^2 - x - 2$:

$$\blacktriangleright \Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 9;$$

$\blacktriangleright \Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) - \sqrt{9}}{2 \times 1} = \frac{1 - 3}{2} = -1,$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) + \sqrt{9}}{2 \times 1} = \frac{1 + 3}{2} = 2.$$

On en déduit le tableau de signe de g' et le tableau de variations de g (je ne détaille pas le calcul des valeurs aux extrémités des flèches) :

x	$-\infty$		-1		$\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$2x - 1$		-		-	0	+		+	
$x^2 - 2x - 2$		+	0	-		-	0	+	
$f'(x)$		-	0	+	0	-	0	+	
$f(x)$									

3. La fonction h est définie sur $\mathbb{R} - \{3\}$ par

$$h(x) = \frac{x^2 - 8x + 16}{x - 3}.$$

La fonction h s'écrit comme un quotient : $h = \frac{u}{v}$, avec

$$u(x) = x^2 - 8x + 16 \quad u'(x) = 2x - 8,$$

$$v(x) = x - 3 \quad v'(x) = 1.$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R} - \{3\}$:



$$\begin{aligned}
 h'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2} \\
 &= \frac{(2x-8) \times (x-3) - (x^2-8x+16) \times 1}{(x-3)^2} \\
 &= \frac{2x^2-6x-8x+24 - (x^2-8x+16)}{(x-3)^2} \\
 &= \frac{2x^2-6x-8x+24-x^2+8x-16}{(x-3)^2} \\
 &= \frac{x^2-6x+8}{(x-3)^2}.
 \end{aligned}$$

- $(x-3)^2$ est toujours positif; et vaut 0 uniquement pour $x=3$.
- On étudie x^2-6x+8 :
 - ▶ $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 8 = 4$;
 - ▶ $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-6) - \sqrt{4}}{2 \times 1} = \frac{6-2}{2} = 2,$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-6) + \sqrt{4}}{2 \times 1} = \frac{6+2}{2} = 4.$$

On en déduit le tableau de signe de h' et le tableau de variations de h (je ne détaille pas les calculs aux extrémités des flèches) :

x	$-\infty$	2	3	4	$+\infty$	
x^2-6x+8	+	0	-	-	0	+
$(x-3)^2$	+		+	0	+	+
$h'(x)$	+	0	-	-	0	+
$h(x)$	<div></div>			<div></div>		

4. La fonction i est définie sur $[1; +\infty[$ par

$$i(x) = (x-12)\sqrt{x}.$$

On peut écrire $i = u \times v$, avec

$$\begin{aligned}
 u(x) &= x-12 & u'(x) &= 1, \\
 v(x) &= \sqrt{x} & v'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{x}}.
 \end{aligned}$$

Pour tout $x \in [1; +\infty[$:

$$\begin{aligned}
 i'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\
 &= 1 \times \sqrt{x} + (x-12) \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \\
 &= \frac{\sqrt{x} \times 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} + \frac{x-12}{2\sqrt{x}} \\
 &= \frac{2x}{2\sqrt{x}} + \frac{x-12}{2\sqrt{x}} \quad \left(\text{car } \sqrt{x} \times \sqrt{x} = \sqrt{x^2} = x \right) \\
 &= \frac{3x-12}{2\sqrt{x}}.
 \end{aligned}$$

On résout :

$$3x-12=0 \iff 3x=12 \iff x=\frac{12}{3}=4.$$

On en déduit le signe de i' et les variations de i :

x	1	4	$+\infty$
$3x-12$	-	0	+
$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	+	+	+
$i'(x)$	-	0	+
$i(x)$	-11		

- $i(1) = (1-12)\sqrt{1} = -11$;
- $i(4) = (4-12)\sqrt{4} = -16$;

Exercice 117 1. (a) Le volume de la cuve est

$$x \times x \times \ell = x^2 \times \ell.$$

D'après l'énoncé, ce volume est aussi égal à 4, donc $x^2 \times \ell = 4$, soit

$$\ell = \frac{4}{x^2}.$$

(b) La surface à peindre est constituée :

- de la face du fond, de surface $x \times x = x^2$;
- des quatre faces latérales, chacune ayant une surface égale à $x \times \ell$.

Donc d'après la question 1.(a) :

$$S(x) = x^2 + 4 \times x \times \ell = x^2 + 4 \times x \times \frac{4}{x^2} = x^2 + \frac{16x}{x^2} = x^2 + \frac{16}{x}$$

2. (a) On écrit $S(x) = x^2 + 16 \times \frac{1}{x}$. On a alors, pour tout $x \in [1; 6]$:

$$\begin{aligned} S'(x) &= 2x + 16 \times \left(-\frac{1}{x^2} \right) = \frac{2x \times x^2}{x^2} - \frac{16}{x^2} \\ &= \frac{2x^3}{x^2} - \frac{16}{x^2} = \frac{2x^3 - 16}{x^2}. \end{aligned}$$

Pour démontrer la formule de l'énoncé, il faut prouver que pour tout $x \in [1; 6]$,

$$\frac{2x^3 - 16}{x^2} = \frac{2(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{x^2}.$$

Les dénominateurs sont les mêmes, donc il suffit de prouver que les numérateurs sont égaux. Pour cela, on développe :

$$\begin{aligned} 2(x-2)(x^2 + 2x + 4) &= 2(x^3 + 2x^2 + 4x - 2x^2 - 4x - 8) \\ &= 2(x^3 - 8) = 2x^3 - 16. \end{aligned}$$

Exercice 118 La fonction g est définie sur \mathbb{R} par

$$g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

1. On utilise la formule pour la dérivée d'un quotient avec

$$\begin{aligned} u(x) &= 2x & , & & v(x) &= x^2 + 1, \\ u'(x) &= 2 & , & & v'(x) &= 2x. \end{aligned}$$

On obtient, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{u'(x) \times v(x) - u(x) \times v'(x)}{(v(x))^2} \\ &= \frac{2 \times (x^2 + 1) - 2x \times 2x}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{2x^2 + 2 - 4x^2}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{-2x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2}. \end{aligned}$$

2. • On détermine les racines de $-2x^2 + 2$ (on n'utilise pas

Cela démontre la formule de l'énoncé pour $S'(x)$.

(b) On déduit de la question précédente le signe de S' et les variations de S :

- $x - 2 = 0 \iff x = 2$.
- le discriminant de $x^2 + 2x + 4$ est

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 4 = -12.$$

$\Delta < 0$, donc il n'y a pas de racine.

x	1	2	6
$x - 2$	-	0	+
$x^2 + 2x + 4$	+		+
$S'(x)$	-	0	+
$S(x)$			

(c) D'après le tableau de variations de la question précédente, la surface à peindre $S(x)$ est minimale lorsque $x = 2$. On a alors $\ell = \frac{4}{2^2} = 1$.

Conclusion : la cuve qui permet d'être le plus économique en peinture a pour dimensions $x = 2$, $\ell = 1$.

le discriminant) :

$$\begin{aligned} -2x^2 + 2 = 0 &\iff 2 = 2x^2 \iff 1 = x^2 \\ &\iff (x = 1 \text{ ou } x = -1). \end{aligned}$$

- $(x^2 + 1)^2$ est strictement positif pour tout réel x .

On obtient donc le tableau :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$-2x^2 + 2$	-	0	+	-
$(x^2 + 1)^2$	+		+	+
$g'(x)$	-	0	+	-
$g(x)$				

- $g(-1) = \frac{2 \times (-1)}{(-1)^2 + 1} = \frac{-2}{2} = -1$;
- $g(1) = \frac{2 \times 1}{1^2 + 1} = \frac{2}{2} = 1$.

3. (a) $g(0) = \frac{2 \times 0}{0^2 + 1} = \frac{0}{1} = 0$ et $g'(0) = \frac{-2 \times 0^2 + 2}{(0^2 + 1)^2} = \frac{2}{1} = 2$, donc

l'équation de (T) est

$$y = g'(0)(x - 0) + g(0)$$

$$y = 2x + 0$$

$$y = 2x.$$

(b) Pour étudier les positions relatives de (C) : $y = \frac{2x}{x^2+1}$ et (T) : $y = 2x$, on étudie le signe de la différence :

$$\begin{aligned} \frac{2x}{x^2+1} - 2x &= \frac{2x}{x^2+1} - \frac{2x \times (x^2+1)}{x^2+1} \\ &= \frac{2x}{x^2+1} - \frac{2x^3+2x}{x^2+1} \\ &= \frac{2x - 2x^3 - 2x}{x^2+1} \\ &= \frac{-2x^3}{x^2+1}. \end{aligned}$$


Pour compléter le tableau de signe :

- $-2x^3 = 0$ lorsque $x = 0$;
- $-2x^3$ est \ominus lorsque x est strictement positif ;

- $-2x^3$ est \oplus lorsque x est strictement négatif ;
- $(x^2+1)^2$ est strictement positif pour tout réel x .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$-2x^3$	+	0	-
$(x^2+1)^2$	+		+
$\frac{-2x^3}{x^2+1}$	+	0	-
Positions relatives des courbes	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div>(C) au-dessus de (T)</div> <div style="text-align: center;">S e c o u p e n t</div> <div>(C) en-dessous de (T)</div> </div>		

On construit la courbe grâce aux variations, à la tangente, et à un tableau de valeurs :



Exercice 119 Dans cet exercice, on abrège la correction.

1. $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x + 5$, $x \in \mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = -x^2 + 2x + 3.$$

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	<div><div><div></div><div>$\frac{10}{3}$</div><div></div></div><div><div></div><div>14</div><div></div></div></div>				

2. $g(x) = x + \frac{5}{x}$, $x \in \mathbb{R} - \{0\}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R} - \{0\}$:

$$g'(x) = 1 + 5 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{x^2 - 5}{x^2}.$$

x	$-\infty$	$-\sqrt{5}$	0	$\sqrt{5}$	$+\infty$	
x^2-5	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
x^2	$+$		$+$	0	$+$	$+$
$g'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$g(x)$	<div><div></div><div>$-2\sqrt{5}$</div><div></div></div>			<div><div></div><div>$2\sqrt{5}$</div><div></div></div>		

3. $h(x) = \frac{-x+0,5}{x+1}$, $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$:

$$h'(x) = \frac{-1 \times (x+1) - (-x+0,5) \times 1}{(x+1)^2} = \frac{-1,5}{(x+1)^2}.$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$-1,5$	-		-
$(x+1)^2$	+	0	+
$h'(x)$	-		-
$h(x)$	\searrow		\searrow

4. $i(x) = (2x-9)\sqrt{x}$, $x \in [1; +\infty[$.

Pour tout $x \in [1; +\infty[$:

$$i'(x) = 2 \times \sqrt{x} + (2x-9) \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{6x-9}{2\sqrt{x}}.$$

x	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$6x-9$	-	0	+
$2\sqrt{x}$	+		+
$i'(x)$	-	0	+
$i(x)$	\searrow $-3\sqrt{6}$ \swarrow		

$$i\left(\frac{3}{2}\right) = \left(2 \times \frac{3}{2} - 9\right) \sqrt{\frac{3}{2}} = -6 \times \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = -6 \times \frac{\sqrt{6}}{2} = -3\sqrt{6}.$$

10 Suites arithmétiques, suites géométriques

Exercice 120 Dans chaque question, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de raison r .

1. $u_0 = 2$ et $r = 4$.

$$u_1 = 2 + 4 = 6$$

$$u_2 = 6 + 4 = 10$$

$$u_3 = 10 + 4 = 14.$$

2. $u_0 = 5$ et $r = 2$.

$$u_{100} = u_0 + 100 \times r = 5 + 100 \times 2 = 205.$$

3. $u_0 = -2$ et $r = 3$.

- $u_0 = -2$, $u_1 = -2 + 3 = 1$, $u_2 = 1 + 3 = 4$, $u_3 = 4 + 3 = 7$.
- Pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + n \times r = -2 + n \times 3 = 3n - 2.$$

- On cherche le plus petit entier naturel n tel que $u_n \geq 100$. On résout l'inéquation

$$3n - 2 \geq 100 \iff 3n \geq 100 + 2 \iff 3n \geq 102 \iff n \geq \frac{102}{3}.$$

Or $\frac{102}{3} \approx 33,67$, donc le plus petit entier naturel solution est $n = 34$.

4. $u_2 = 3$ et $u_{10} = -21$.

L'énoncé se traduit par le système

$$\begin{cases} u_0 + 2r = 3 & L_1 \\ u_0 + 10r = -21 & L_2 \end{cases}$$

On soustrait « $L_2 - L_1$ » :

$$(u_0 + 10r) - (u_0 + 2r) = -21 - 3.$$

Les u_0 s'éliminent et on en déduit r :

$$\begin{aligned} u_0 + 10r - u_0 - 2r &= -24 \\ 8r &= -24 \\ r &= \frac{-24}{8} = -3. \end{aligned}$$

Enfin, on reprend L_1 pour trouver u_0 :

$$u_0 + 2r = 3 \implies u_0 + 2 \times (-3) = 3 \implies u_0 - 6 = 3 \implies u_0 = 3 + 6 = 9.$$

Conclusion : $u_0 = 9$ et $r = -3$.

5. $u_3 = 7$ et $u_{15} = 37$.

On reprend la méthode de la question précédente : l'énoncé se traduit par le système

$$\begin{cases} u_0 + 3r = 7 & L_1 \\ u_0 + 15r = 37 & L_2 \end{cases}$$

On soustrait « $L_2 - L_1$ » :

$$\begin{aligned} (u_0 + 15r) - (u_0 + 3r) &= 37 - 7 \\ u_0 + 15r - u_0 - 3r &= 30 \\ 12r &= 30 \\ r &= \frac{30}{12} = 2,5. \end{aligned}$$

Enfin, on reprend L_1 pour trouver u_0 :

$$u_0 + 3r = 7 \Rightarrow u_0 + 3 \times 2,5 = 7 \Rightarrow u_0 + 7,5 = 7 \Rightarrow u_0 = 7 - 7,5 = -0,5.$$

Conclusion : $u_0 = -0,5$ et $r = 2,5$.


L'énoncé nous demande également de calculer u_{100} :

$$u_{100} = u_0 + 100 \times r = -0,5 + 100 \times 2,5 = 249,5.$$

Exercice 121 Notons r la raison de la suite. L'hypoténuse mesure 20, donc les côtés de l'angle droit mesurent

$$20 - r \quad \text{et} \quad 20 - r - r = 20 - 2r.$$

△ On retire r , car l'hypoténuse est le plus grand côté.



D'après le théorème de Pythagore :

$$(20 - r)^2 + (20 - 2r)^2 = 20^2.$$

On développe et on résout :

$$\begin{aligned} 20^2 - 2 \times 20 \times r + r^2 + 20^2 - 2 \times 20 \times 2r + (2r)^2 &= 400 \\ 400 - 40r + r^2 + 400 - 80r + 4r^2 &= 400 \\ 5r^2 - 120r + 400 &= 0. \end{aligned}$$

On aboutit à une équation du 2^d degré :

- $a = 5$, $b = -120$, $c = 400$.
- le discriminant est $\Delta = b^2 - 4ac = (-120)^2 - 4 \times 5 \times 400 = 6400$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$\begin{aligned} r_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-120) - \sqrt{6400}}{2 \times 5} = \frac{120 - 80}{10} = \frac{40}{10} = 4, \\ r_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-120) + \sqrt{6400}}{2 \times 5} = \frac{120 + 80}{10} = \frac{200}{10} = 20. \end{aligned}$$

La deuxième solution ($r = 20$) est impossible, car l'un des côtés de l'angle aurait une longueur négative. La seule solution est donc $r = 4$, qui nous donne deux côtés de l'angle droit de longueurs

$$20 - r = 20 - 4 = 16 \quad , \quad 20 - 2r = 20 - 2 \times 4 = 12.$$

Exercice 122 On note n le nombre de pages; elles sont donc numérotées

$$1; 2; 3; \dots; n.$$

La somme des numéros vaut 666, donc

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = 666.$$

Le cours nous donne une formule pour la somme de gauche : elle est égale à $\frac{n(n+1)}{2}$, donc

$$\frac{n(n+1)}{2} = 666.$$

On résout :

$$\begin{aligned}\frac{n^2 + n}{2} \times 2 &= 666 \times 2 \\ n^2 + n &= 1332 \\ n^2 + n - 1332 &= 0.\end{aligned}$$

C'est une équation du 2^d degré, que l'on résout avec la méthode habituelle. On trouve deux racines : $n_1 = -37$ (impossible, car négatif) et $n_2 = 36$.

Conclusion : le livre a 36 pages.

Exercice 123 1. On met 5 en facteur :

$$S_1 = 5 + 10 + 15 + \dots + 1000 = 5(1 + 2 + 3 + \dots + 200).$$

La somme dans la parenthèse vaut $\frac{200(200+1)}{2} = 20100$, donc

$$S_1 = 5 \times 20100 = 100500.$$

Remarque : On aurait aussi pu écrire la somme à l'endroit et à l'envers, puis ajouter terme à terme (comme dans la démonstration de cours).

2. (a)

$$S_2 = 2 + 4 + 6 + \dots + 100 = 2(1 + 2 + 3 + \dots + 50) = 2 \times \frac{50(50+1)}{2} = 2550.$$

(b) Il y a plusieurs méthodes pour calculer

$$S_3 = 1 + 3 + 5 + \dots + 99 :$$

- Écrire la somme à l'endroit et à l'envers, puis ajouter terme à terme ;
- Ajouter à S_3 la somme $S_2 = 2 + 4 + 6 + \dots + 100$ (calculée ci-dessus), on obtient $S_2 + S_3 = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$, que l'on sait calculer. Etc.
- Remarquer que les termes de la somme S_3 s'obtiennent à partir de ceux de S_2 en retirant 1.


On suit la 3^e méthode :

$$S_3 = \underset{=2-1}{1} + \underset{=4-1}{3} + \underset{=6-1}{5} + \dots + \underset{=100-1}{99},$$


donc

$$S_3 = 2 + 4 + 6 + \dots + 100 - \underbrace{1 - 1 - 1 - \dots - 1}_{50 \text{ fois}} = S_2 - 50 = 2550 - 50 = 2500.$$

Remarque : Ajouter les nombres impairs successifs revient à agrandir le côté d'un carré de proche en proche. Par exemple :



$$1 + 3 + 5 + 7$$



$$= 4^2 = 16$$

En faisant un petit effort, on voit qu'une fois arrivé à 99, on obtient un carré de côté 50. Il s'ensuit que

$$1 + 3 + 5 + \dots + 99 = 50^2 = 2500,$$

ce qui correspond bien à la réponse obtenue ci-dessus pour S_3 .

Exercice 124 Dans chaque question, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison q .

1. $v_0 = 2$ et $q = 3$.

$$v_1 = 2 \times 3 = 6$$

$$v_2 = 6 \times 3 = 18$$

$$v_3 = 18 \times 3 = 54.$$

2. $v_0 = 108$ et $q = \frac{1}{2}$.

$$v_1 = 108 \times \frac{1}{2} = 54$$

$$v_2 = 54 \times \frac{1}{2} = 27$$

$$v_3 = 27 \times \frac{1}{2} = 13,5.$$

3. $v_0 = 3$ et $q = 2$.


$$v_7 = v_0 \times q^7 = 3 \times 2^7 = 384.$$

4. $v_0 = 1000$ et $q = 0,95$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 \times q^n = 1000 \times 0,95^n.$$

5. $v_1 = 6$ et $v_2 = -30$.



D'après le schéma ci-dessus :


$$q = -30 \div 6 = -5.$$

On en déduit :

$$v_3 = -30 \times (-5) = 150$$

$$v_0 = 6 \div (-5) = -1,2.$$

6. $v_3 = 24$ et $v_5 = 96$.



D'après le schéma ci-dessus :

$$24 \times q \times q = 96$$

$$\frac{24q^2}{24} = \frac{96}{24}$$

$$q^2 = 4.$$

△ Il y a deux solutions possibles : $q = 2$ ou $q = -2$. On distingue donc deux cas :

Si $q = 2$, alors l'égalité

$$v_3 = v_0 \times q^3$$

se réécrit

$$24 = v_0 \times \underbrace{2^3}_{=8}.$$

On en déduit $v_0 = \frac{24}{8} = 3.$

Si $q = -2$, alors l'égalité

$$v_3 = v_0 \times q^3$$

se réécrit

$$24 = v_0 \times \underbrace{(-2)^3}_{=-8}.$$

On en déduit $v_0 = \frac{24}{-8} = -3.$

Exercice 125 1. $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite **arithmétique** telle que $u_2 = 63$ et $u_4 = 567$.

L'énoncé se traduit par le système

$$\begin{cases} u_0 + 2r = 63 & L_1 \\ u_0 + 4r = 567 & L_2 \end{cases}$$

On soustrait « $L_2 - L_1$ » :


$$\begin{aligned} (u_0 + 4r) - (u_0 + 2r) &= 567 - 63 \\ u_0 + 4r - u_0 - 2r &= 504 \\ 2r &= 504 \\ r &= \frac{504}{2} = 252. \end{aligned}$$

Enfin, on reprend L_1 pour trouver u_0 :

$$u_0 + 2r = 63 \implies u_0 + 2 \times 252 = 63 \implies u_0 + 504 = 63 \implies u_0 = 63 - 504 = -441.$$

Conclusion : $u_0 = -441$ et $r = 252$. De plus, $u_8 = u_0 + 8r = -441 + 8 \times 252 = 1575$.

2. $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite **géométrique** telle que $v_2 = 63$ et $v_4 = 567$.



D'après le schéma ci-dessus :

$$\begin{aligned} 63 \times q \times q &= 567 \\ \frac{63q^2}{\cancel{63}} &= \frac{567}{\cancel{63}} \\ q^2 &= 9. \end{aligned}$$

△ Il y a deux solutions possibles : $q = 3$ ou $q = -3$. On distingue donc deux cas :

Si $q = 3$, alors l'égalité

$$v_2 = v_0 \times q^2$$

se réécrit

$$63 = v_0 \times \underbrace{3^2}_{=9}.$$

On en déduit $v_0 = \frac{63}{9} = 7.$

Si $q = -3$, alors l'égalité

$$v_2 = v_0 \times q^2$$

se réécrit

$$63 = v_0 \times \underbrace{(-3)^2}_{=9}.$$


On en déduit $v_0 = \frac{63}{9} = 7.$

Dans les deux cas (que q soit égal à 3 ou à -3), on trouve $v_0 = 7$. De plus,

$$v_8 = v_0 \times q^8 = 7 \times (\pm 3)^8 = 7 \times 6561 = 45927$$

(la réponse est la même que q soit égal à 3 ou à -3).

Exercice 126 1. $100\% - 15\% = 85\% = 0,85$, donc pour diminuer un nombre de 15 %, il faut le multiplier par 0,85. Ainsi, dans le schéma ci-dessous, l'intensité lumineuse est-elle multipliée par 0,85 à chaque nouvelle plaque :



2. La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $q = 0,85$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 \times q^n = 12 \times 0,85^n.$$

3. Comme on part de 12 lm, il s'agit de savoir le nombre de plaques nécessaires pour que l'intensité lumineuse soit inférieure à 0,12 lm (puisque $12 \div 100 = 0,12$).

On rentre la formule


$$Y = 12 * 0.85^X$$

dans le mode fonction de la calculatrice, puis on cherche par tâtonnement (on peut aussi utiliser le mode suite ou le mode tableur, suivant les modèles). Après quelques essais ¹³, on obtient :

n	28	29
v_n	0,13	0,11

Conclusion : il faut superposer au moins 29 plaques pour que l'intensité lumineuse soit divisée par 100.

Exercice 127 1. Pour diminuer un nombre de 8 %, il faut le multiplier par 0,92, car $100\% - 8\% = 92\% = 0,92$. On peut donc compléter le schéma :



Conclusion :

$$v_0 = 10 ; v_1 = 9,2 ; v_2 = 8,464.$$

La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $q = 0,92$.

2. La masse d'iode 131 après 10 jours est

$$v_{10} = v_0 \times q^{10} = 10 \times 0,92^{10} \approx 4,3 \mu\text{g}.$$

13. On ne peut pas savoir en démarrant jusqu'à quelle valeur de n il faut aller ; il faut donc faire des essais. Vous pourrez contourner ce problème en terminale, lorsque vous connaîtrez le logarithme népérien.

3. On part de $10 \mu\text{g}$ d'iode 131, donc il s'agit de déterminer à partir de quand il en restera moins de $5 \mu\text{g}$.

Comme dans l'exercice précédent, on fait un tableau de valeurs avec la calculatrice, en rentrant la formule

$$Y = 10 * 0.92^X.$$

On obtient :

n	8	9
v_n	5,13	4,72

Conclusion : la demi-vie de l'iode 131 est de 8 jours et quelques.

Exercice 128 La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $u_0 = 2$ et la relation de récurrence

$$u_{n+1} = 3u_n - 1$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.


1.

$$u_0 = 2$$

$$u_1 = 3 \times 2 - 1 = 5$$

$$u_2 = 3 \times 5 - 1 = 14$$

On prouve que la suite n'est ni arithmétique, ni géométrique avec le schéma :



Les résultats en rouge (3 et 9) sont différents, donc u **n'est pas arithmétique**.

Les résultats en vert (2,5 et 2,8) sont différents, donc u **n'est pas géométrique**.

Calculs utiles :

$$5 - 2 = 3,$$

$$14 - 5 = 9.$$

$$5 \div 2 = 2,5,$$

$$14 \div 5 = 2,8.$$

2. On pose $v_n = u_n - 0,5$ pour tout entier naturel n .

(a)

$$v_0 = u_0 - 0,5 = 2 - 0,5 = 1,5$$

$$v_1 = u_1 - 0,5 = 5 - 0,5 = 4,5$$

$$v_2 = u_2 - 0,5 = 14 - 0,5 = 13,5$$

On remarque que l'on passe d'un terme au suivant en multipliant par 3. Mais cela continue-t-il indéfiniment? C'est ce que l'on démontre dans la question suivante.

(b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}
 v_{n+1} &= u_{n+1} - 0,5 && \text{(déf. de } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{)} \\
 &= (3u_n - 1) - 0,5 && \text{(rel. réc. pour } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{)} \\
 &= 3u_n - 1,5 && \text{(calcul)} \\
 &= 3 \left(u_n - \frac{1,5}{3} \right) && \text{(factorisation)} \\
 &= 3(u_n - 0,5) && \text{(calcul)} \\
 &= 3v_n && \text{(déf. de } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{)}
 \end{aligned}$$

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 3v_n$, donc $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $q = 3$.

Remarque : L'étude d'une suite arithmético-géométrique ($u_{n+1} = au_n + b$, avec $a \neq 1$) se ramène toujours à celle d'une suite géométrique $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Pour prouver que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique, la méthode est toujours celle que nous venons de donner. À la quatrième ligne de calcul, c'est a qu'il faut mettre en facteur (ici, on a mis 3 en facteur).


3. La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $q = 3$, et $v_0 = u_0 - 0,5 = 2 - 0,5 = 1,5$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 \times q^n = 1,5 \times 3^n.$$

4. Enfin $v_n = u_n - 0,5$ donc

$$u_n = v_n + 0,5 = 1,5 \times 3^n + 0,5.$$

Exercice 129 1. On complète le schéma ci-dessous pour calculer les termes u_1 et u_2 . Les sommes écrites dans chaque case sont les sommes restant à rembourser aux dates indiquées.



Pour passer d'un terme de la suite au terme suivant, on multiplie par 1,02 (ajout des intérêts) puis on retranche 300 (remboursement mensuel). On peut donc continuer plus rapidement :

$$\begin{aligned}
 u_3 &= 9798 \times 1,02 - 300 = 9693,96 && \text{(somme à rembourser le 01/04/20),} \\
 u_4 &= 9693,96 \times 1,02 - 300 = 9587,84 && \text{(somme à rembourser le 01/05/20).}
 \end{aligned}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = 1,02u_n - 300.$$

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}
 v_{n+1} &= u_{n+1} - 15000 && \text{(déf. de } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{)} \\
 &= (1,02u_n - 300) - 15000 && \text{(rel. réc. pour } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{)} \\
 &= 1,02u_n - 15300 && \text{(calcul)} \\
 &= 1,02 \left(u_n - \frac{15300}{1,02} \right) && \text{(factorisation)} \\
 &= 1,02(u_n - 15000) && \text{(calcul)} \\
 &= 1,02v_n && \text{(déf. de } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{)}
 \end{aligned}$$

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 1,02v_n$, donc $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $q = 1,02$.

4. La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $q = 1,02$, et $v_0 = u_0 - 15000 = 10000 - 15000 = -5000$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 \times q^n = -5000 \times 1,02^n.$$

Enfin $v_n = u_n - 15000$ donc

$$u_n = v_n + 15000 = -5000 \times 1,02^n + 15000.$$

5. Déterminer la durée du crédit revient à savoir quand la somme restant à rembourser est nulle. En réalité, au bout d'un moment, elle est négative, comme on le voit avec un tableau de valeurs :

n	55	56
u_n	141,34	-155,83

À la fin du 55^e fois, il reste 141,35 € à rembourser; et si on rembourse 300 € au début du 56^e mois, la banque nous devra 155,83 €.

Conclusion :

- le crédit dure 56 mois;
- on rembourse 56 fois 300 €, mais à la fin on a dépassé de 155,83 € ce que l'on devait à la banque;
- la somme totale remboursée est donc

$$56 \times 300 - 155,83 = 16664,17 \text{ €};$$

- le « coût du crédit » est la différence entre ce que l'on a remboursé et ce que la banque nous a prêté :

$$\text{Coût du crédit} = \text{Somme remboursée} - \text{Somme empruntée} = 16664,17 - 10000 = 6664,17 \text{ €}.$$

Exercice 130 La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $u_0 = 1$ et la relation de récurrence

$$u_{n+1} = 0,5u_n + 3 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

On propose deux méthodes pour déterminer la limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

1. (a)

$$u_0 = 1$$

$$u_1 = 0,5u_0 + 3 = 0,5 \times 1 + 3 = 3,5$$


$$u_2 = 0,5u_1 + 3 = 0,5 \times 3,5 + 3 = 4,75$$

$$u_3 = 0,5u_2 + 3 = 0,5 \times 4,75 + 3 = 5,375$$

(b) On trace la droite d'équation $y = 0,5x + 3$ (cf question suivante) à partir d'un tableau de valeurs avec deux valeurs :

x	0	10
y	3	8

(c)



(d) On a dessiné un escalier, qui monte et se rapproche du point de coordonnées (6;6). Autrement dit :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6.$$

2. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}
v_{n+1} &= u_{n+1} - 6 && \text{(déf. de } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{)} \\
&= (0,5u_n + 3) - 6 && \text{(rel. réc. pour } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{)} \\
&= 0,5u_n - 3 && \text{(calcul)} \\
&= 0,5 \left(u_n - \frac{3}{0,5} \right) && \text{(factorisation)} \\
&= 0,5(u_n - 6) && \text{(calcul)} \\
&= 0,5v_n && \text{(déf. de } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{)}
\end{aligned}$$

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 0,5v_n$, donc $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $q = 0,5$.

(b) La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $q = 0,5$, et $v_0 = u_0 - 6 = 1 - 6 = -5$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 \times q^n = -5 \times 0,5^n.$$

Enfin $v_n = u_n - 6$ donc

$$u_n = v_n + 6 = -5 \times 0,5^n + 6.$$

(c) On fait le raisonnement de niveau terminale :

$$-1 < 0,5 < 1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} (0,5^n) = 0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} (-5 \times 0,5^n + 6) = -5 \times 0 + 6.$$

Autrement dit :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6.$$

Exercice 131 La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $u_0 = 0$ et la relation de récurrence

$$u_{n+1} = 3u_n - 2n + 3.$$

1. \triangle Il y a un gros risque de décalage dans les indices!!

Avec $n = 0$:

$$\begin{aligned}
u_{0+1} &= 3u_0 - 2 \times 0 + 3 \\
u_1 &= 3 \times 0 - 0 + 3 \\
u_1 &= 3.
\end{aligned}$$

Avec $n = 1$:

$$\begin{aligned}
u_{1+1} &= 3u_1 - 2 \times 1 + 3 \\
u_2 &= 3 \times 3 - 2 + 3 \\
u_2 &= 10.
\end{aligned}$$

Avec $n = 2$:

$$\begin{aligned}
u_{2+1} &= 3u_2 - 2 \times 2 + 3 \\
u_3 &= 3 \times 10 - 4 + 3 \\
u_3 &= 29.
\end{aligned}$$

2. On définit une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$v_n = u_n - n + 1 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

$$\triangle v_{n+1} = u_{n+1} - (n+1) + 1 = u_{n+1} - n - 1 + 1 = u_{n+1} - n.$$

Pour tout entier naturel n :

$$\begin{aligned}
v_{n+1} &= u_{n+1} - n && \text{(cf calcul ci-dessus)} \\
&= (3u_n - 2n + 3) - n && \text{(rel. réc. pour } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{)} \\
&= 3u_n - 3n + 3 && \text{(calcul)} \\
&= 3(u_n - n + 1) && \text{(factorisation)} \\
&= 3v_n && \text{(déf. de } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{)}
\end{aligned}$$

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 3v_n$, donc $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $q = 3$.

3. La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $q = 3$, et $v_0 = u_0 - 0 + 1 = 0 + 1 = 1$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 \times q^n = 1 \times 3^n = 3^n.$$

Enfin $v_n = u_n - n + 1$ donc

$$u_n = v_n + n - 1 = 3^n + n - 1.$$

Exercice 132 La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $u_0 = 1$ et la relation de récurrence

$$u_{n+1} = \frac{4u_n}{u_n + 4}$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$. On pose également $v_n = \frac{4}{u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Pour démontrer qu'une suite est **géométrique**, on part de $v_{n+1} = \dots$ et on essaye d'aboutir à $\dots = v_n \times q$. Pour une suite **arithmétique**, c'est le même principe : on part de $v_{n+1} = \dots$ et on essaye d'aboutir à $\dots = v_n + r$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+1} = \frac{4}{u_{n+1}} = \frac{4}{\frac{4u_n}{u_n + 4}} = 4 \times \frac{u_n + 4}{4u_n} = \frac{\cancel{4}(u_n + 4)}{\cancel{4}u_n} = \frac{u_n}{u_n} + \frac{4}{u_n} = 1 + v_n.$$

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n + 1$, donc $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique de raison $r = 1$.

2. La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique de raison $r = 1$, et $v_0 = \frac{4}{u_0} = \frac{4}{1} = 4$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 + n \times r = 4 + n \times 1 = n + 4.$$

Enfin $v_n = \frac{4}{u_n}$ donc

$$u_n = \frac{4}{v_n} = \frac{4}{n + 4}.$$

Remarque : On a utilisé : si $a = \frac{b}{c}$, alors $c = \frac{b}{a}$.

Exercice 133 Dans cet exercice, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ désigne une suite géométrique de raison q .

1. (a) On suppose $v_0 = 3$ et $q = 1,4$.

Pour tout entier naturel n :

$$v_n = v_0 \times q^n = 3 \times 1,4^n \quad \text{et} \quad v_{n+1} = v_0 \times q^{n+1} = 3 \times 1,4^{n+1},$$

donc

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= 3 \times 1,4^{n+1} - 3 \times 1,4^n \\ &= 3 \times 1,4^1 \times 1,4^n - 3 \times 1,4^n \quad (\text{rappel : } a^n \times a^m = a^{n+m}) \\ &= 4,2 \times 1,4^n - 3 \times 1,4^n \\ &= (4,2 - 3) \times 1,4^n \\ &= \underbrace{1,2}_{\oplus} \times \underbrace{1,4^n}_{\oplus}. \end{aligned}$$

Conclusion : $v_{n+1} - v_n \geq 0$, donc $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

- (b) On suppose $v_0 = 2$ et $q = 0,75$.

Pour tout entier naturel n :

$$v_n = v_0 \times q^n = 2 \times 0,75^n \quad \text{et} \quad v_{n+1} = v_0 \times q^{n+1} = 2 \times 0,75^{n+1},$$

donc

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= 2 \times 0,75^{n+1} - 2 \times 0,75^n \\ &= 2 \times 0,75^1 \times 0,75^n - 2 \times 0,75^n \\ &= 1,5 \times 0,75^n - 2 \times 0,75^n \\ &= (1,5 - 2) \times 0,75^n \\ &= \underbrace{-0,5}_{\ominus} \times \underbrace{0,75^n}_{\oplus}. \end{aligned}$$

Conclusion : $v_{n+1} - v_n \leq 0$, donc $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

2. On suppose $v_0 \geq 0$ et $q \geq 0$. On calcule, comme dans les questions précédentes, pour tout entier naturel n :

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= v_0 \times q^{n+1} - v_0 \times q^n \\ &= v_0 \times q \times q^n - v_0 \times 1 \times q^n \\ &= \underbrace{v_0}_{\oplus} \times \underbrace{q^n}_{\oplus} \times (q - 1). \end{aligned}$$

Finalement, le signe (et donc les variations) dépendent du signe de $q - 1$:

- Si $q - 1 < 0$, c'est-à-dire si $q < 1$, alors $v_{n+1} - v_n \leq 0$, donc la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
- Si $q - 1 > 0$, c'est-à-dire si $q > 1$, alors $v_{n+1} - v_n \geq 0$, donc la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
- Si $q - 1 = 0$, c'est-à-dire si $q = 1$, alors $v_{n+1} - v_n = 0$, donc la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante.

Exercice 134 1. D'après la formule du cours :

$$S_1 = 1 + 4 + 4^2 + \dots + 4^8 = \frac{4^{8+1} - 1}{4 - 1} = \frac{4^9 - 1}{3} = 87381.$$

2. D'après la formule du cours :

$$S_2 = 1 + 0,5 + 0,5^2 + \dots + 0,5^{10} = \frac{0,5^{10+1} - 1}{0,5 - 1} = \frac{0,5^{11} - 1}{-0,5} = \frac{0,5^{11}}{-0,5} + \frac{-1}{-0,5} = -0,5^{10} + 2.$$

(On a poursuivi le calcul jusqu'à avoir un résultat « présentable ».)

3. La somme se réécrit

$$S_3 = 1 - 2 + 2^2 - 2^3 + \dots - 2^{19} + 2^{20} = 1 + (-2)^1 + (-2)^2 + \dots + (-2)^{20},$$

donc d'après la formule du cours :

$$S_3 = \frac{(-2)^{20+1} - 1}{(-2) - 1} = \frac{(-2)^{21} - 1}{-3} = \frac{-2097153}{-3} = 699051.$$

Exercice 135 1. On utilise la formule du cours, avec $q = 2^3$ (au numérateur, on laisse $q = 2^3$; au dénominateur, on remplace par 8) :

$$S = 1 + 2^3 + (2^3)^2 + (2^3)^3 + \dots + (2^3)^{12} = \frac{(2^3)^{12+1} - 1}{2^3 - 1} = \frac{(2^3)^{13} - 1}{8 - 1} = \frac{2^{3 \times 13} - 1}{7} = \frac{2^{39} - 1}{7}.$$

(On a utilisé la formule $(a^n)^m = a^{n \times m}$.)

2. Le nombre S est une somme de nombres entiers, donc c'est un nombre entier. De plus, d'après la question précédente,

$$2^{39} - 1 = 7 \times S.$$

On en déduit que 7 divise $2^{39} - 1$.

Exercice 136 1. On écrit à côté du tableau la somme de chacune des trois lignes. On factorise par 1 la 1^{re} ligne, par 2 la 2^e, par 3 la 3^e :

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1+2+3 & = & 1(1+2+3) \\ 2 & 4 & 6 & 2+4+6 & = & 2(1+2+3) \\ 3 & 6 & 9 & 3+6+9 & = & 3(1+2+3) \end{array}$$

On en déduit que la somme des nombres du tableau vaut :

$$(1+2+3) \times (1+2+3) = 6 \times 6 = 36.$$

Bien sûr, on aurait pu aller plus vite et simplement additionner tous les nombres. L'intérêt du raisonnement que nous avons mené est qu'il peut se généraliser (cf question 2).

2. Avec le même raisonnement que dans la question 1, on voit que la somme de tous les nombres du tableau vaut

$$(1 + 2 + 3 + \dots + 10) \times (1 + 2 + 3 + \dots + 10).$$

Or $1 + 2 + 3 + \dots + 10 = \frac{10(10+1)}{2} = 55$, donc la somme vaut $55^2 = 3025$.

11 Géométrie repérée

Exercice 137 1. • Tableau pour le tracé de D_1 :

x	0	2
y	3	-1

$$\left| \begin{array}{l} -2 \times 0 + 3 = 3 \\ -2 \times 2 + 3 = -1 \end{array} \right.$$

- D_2 est la droite verticale qui coupe l'axe des abscisses en $(-3;0)$.

2. L'équation est de la forme $(AB) : y = ax + b$.

D'abord

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2,5 - (-2)}{2 - (-1)} = \frac{4,5}{3} = 1,5.$$

donc

$$(AB) : y = 1,5x + b.$$

On remplace x et y par les coordonnées de A pour trouver b : $A(-1; -2)$ donc

$$\begin{aligned} -2 &= 1,5 \times (-1) + b \\ -2 &= -1,5 + b \\ -2 + 1,5 &= b \\ -0,5 &= b. \end{aligned}$$


Conclusion :

$$(AB) : y = 1,5x - 0,5.$$


3. N est sur l'axe des abscisses, donc $y_N = 0$, et pour trouver l'abscisse de N , on remplace y par 0 dans l'équation de (AB) :

$$0 = 1,5x - 0,5 \iff 0,5 = 1,5x \iff x = \frac{0,5 \times 2}{1,5 \times 2} = \frac{1}{3}.$$

Finalement $N(\frac{1}{3}; 0)$.



Exercice 138 Soient $O(0;0)$, $A(3;2)$, $B(4,5;3)$, $C(3;-2,5)$ et $D(7;-1,5)$.



1. • Avec le déterminant.

$$\overrightarrow{OA} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \quad \overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} 4,5 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} x' \\ y' \end{matrix}$$

donc

$$\det(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = xy' - x'y = 3 \times 3 - 4,5 \times 2 = 9 - 9 = 0.$$

Leur déterminant est nul, donc \overrightarrow{OA} et \overrightarrow{OB} sont colinéaires. Par conséquent, les points O , A , B sont alignés.

- **Avec une équation de droite.**

L'équation de (OA) est de la forme $y = ax + b$:

$$a = \frac{y_A - y_O}{x_A - x_O} = \frac{2 - 0}{3 - 0} = \frac{2}{3},$$

donc

$$(OA) : y = \frac{2}{3}x + b.$$

Ensuite, $O(0;0)$, donc

$$0 = \frac{2}{3} \times 0 + b \Rightarrow 0 = 0 + b \Rightarrow b = 0.$$

Conclusion :

$$(OA) : y = \frac{2}{3}x.$$

Le point $B(4,5;3)$ appartient à (OA) , puisque

$$3 = \frac{2}{3} \times 4,5.$$

Les points O, A, B sont donc alignés.

- **Avec le déterminant.**

$$\overrightarrow{OC} \begin{pmatrix} 3 \\ -2,5 \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \quad \overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 4 \\ -3,5 \end{pmatrix} \begin{matrix} x' \\ y' \end{matrix}$$

donc

$$\det(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{AD}) = xy' - x'y = 3 \times -(-3,5) - 4 \times (-2,5) = -10,5 + 10 = -0,5.$$

Leur déterminant est non nul, donc \overrightarrow{OC} et \overrightarrow{AD} ne sont pas colinéaires. Par conséquent, les droites (OC) et (AD) ne sont pas parallèles.

- **Avec une équation de droite.**

Le coefficient directeur de (OC) est


$$\frac{y_C - y_O}{x_C - x_O} = \frac{-2,5 - 0}{3 - 0} = \frac{-2,5 \times 2}{3 \times 2} = -\frac{5}{6}.$$

Le coefficient directeur de (AD) est

$$\frac{y_D - y_A}{x_D - x_A} = \frac{-1,5 - 2}{7 - 3} = \frac{-3,5 \times 2}{4 \times 2} = -\frac{7}{8}.$$

Les droites (OC) et (AD) ont des coefficients directeurs différents $(-\frac{5}{6} \neq -\frac{7}{8})$, donc elles ne sont pas parallèles.

Exercice 139 1.



2. Le vecteur

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} -b \\ a \end{matrix}$$

est un vecteur directeur de (AB) , donc (AB) a une équation de la forme

$$2x - 3y + c = 0. \quad (\triangle - b = 3 \Rightarrow b = -3)$$

$A(-2; 1) \in (AB)$, donc $2 \times (-2) - 3 \times 1 + c = 0$, soit $-7 + c = 0$; et finalement $c = 7$.

Conclusion :

$$(AB) : 2x - 3y + 7 = 0.$$

3. Δ est parallèle à (AB) , donc $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de Δ et cette droite a (comme (AB)) une équation de la forme

$$2x - 3y + c = 0.$$

$C(0; -3) \in \Delta$, donc $2 \times 0 - 3 \times (-3) + c = 0$, soit $9 + c = 0$; et finalement $c = -9$.

Conclusion :

$$\Delta : 2x - 3y - 9 = 0.$$

4. M est sur l'axe des abscisses, donc $y_M = 0$; et pour trouver l'abscisse de M , on remplace y par 0 dans l'équation de Δ :

$$2x - 3 \times 0 - 9 = 0 \iff 2x = 9 \iff x = \frac{9}{2} = 4,5.$$

Finalement $M(4,5; 0)$.

Exercice 140 1. Le vecteur

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix} \begin{matrix} a \\ b \end{matrix}$$


est un vecteur normal à Δ , donc Δ a une équation de la forme

$$3x - 5y + c = 0.$$

$A(-1; 0) \in \Delta$, donc $3 \times (-1) - 5 \times 0 + c = 0$, soit $-3 + c = 0$; et ainsi $c = 3$.

Conclusion :

$$\Delta : 3x - 5y + 3 = 0.$$



2. Δ est la perpendiculaire à $[AB]$ passant par le milieu I de $[AB]$.

On calcule d'abord les coordonnées de I :

$$I\left(\frac{0+4}{2}; \frac{-2+3}{2}\right) \quad I(2; 0,5).$$

Le vecteur

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} a \\ b \end{matrix}$$


est un vecteur normal à Δ , donc Δ a une équation de la forme

$$4x + 5y + c = 0.$$


$I(2; 0,5) \in \Delta$, donc $4 \times 2 + 5 \times 0,5 + c = 0$, soit $10,5 + c = 0$; et ainsi $c = -10,5$.

Conclusion : $\Delta : 4x + 5y - 10,5 = 0$, soit en multipliant par 2 pour n'avoir que des coefficients entiers

$$\Delta : 8x + 10y - 21 = 0.$$



Exercice 141 Soit (AB) une droite du plan.



1. $\boxed{3 \Rightarrow 1}$ On suppose que $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à (AB) . On veut prouver que (AB) a une équation de la forme $ax + by + c = 0$, pour un certain réel c .

Soit $M(x; y)$ un point de (AB) . Les vecteurs \overrightarrow{AM} et \vec{n} sont normaux, donc $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$.

Or $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, donc

$$0 = \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = a \times (x - x_A) + b \times (y - y_A) = ax - ax_A + by - by_A = ax + by + c,$$

où l'on a posé $c = -ax_A - by_A$.

Conclusion : si un point $M(x; y)$ est sur (AB) , alors $0 = ax + by + c$. Cette égalité est donc l'équation de (AB) .

2. $\boxed{2 \Rightarrow 1}$ On suppose que $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (AB) . On veut prouver que (AB) a une équation de la forme $ax + by + c = 0$, pour un certain réel c .

Soit $M(x; y)$ un point de (AB) . Les vecteurs \overrightarrow{AM} et \vec{u} sont colinéaires, donc $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$.

Or $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$, donc

$$0 = (x - x_A) \times a - (-b) \times (y - y_A) = ax - ax_A + by - by_A = ax + by + c,$$

où l'on a posé $c = -ax_A - by_A$.

Conclusion : si un point $M(x; y)$ est sur (AB) , alors $0 = ax + by + c$. Cette égalité est donc l'équation de (AB) .

Exercice 142 1. Pour tracer la droite $D : 5x + 4y - 10 = 0$, il y a deux méthodes :


- Soit on réécrit l'équation sous forme réduite

$$5x + 4y - 10 = 0 \iff 4y = -5x + 10 \iff y = \frac{-5x + 10}{4},$$

puis on fait un tableau de valeurs.

- Soit on détermine deux points sur les axes :
 - on prend $y = 0$ dans l'équation de D , on voit que $5 \times 2 + 4 \times 0 - 10 = 10 - 10 = 0$, donc D passe par le point de coordonnées $(2; 0)$;
 - on prend $x = 0$ dans l'équation de D , on voit que $5 \times 0 + 4 \times 2,5 - 10 = 10 - 10 = 0$, donc D passe par le point de coordonnées $(0; 2,5)$.

Quelle que soit la méthode, on obtient :



2. Le vecteur $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \end{pmatrix}$ dirige D , donc ce même vecteur est normal à Δ . On change alors le rôle de a et b : $\begin{pmatrix} -4 \\ 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est normal à Δ , donc

$$\Delta: -4x + 5y + c = 0.$$


$C(3;2) \in \Delta$, donc $-4 \times 3 + 5 \times 2 + c = 0$, soit $-2 + c = 0$; et ainsi $c = 2$.

Conclusion :

$$\Delta: -4x + 5y + 2 = 0.$$

Exercice 143 1. On trace les droites $\Delta: 3x - 2y + 3 = 0$ et $\Delta': 4x + 6y + 12 = 0$ en plaçant leurs points d'intersections avec les axes :

- Δ passe par les points de coordonnées $(-1;0)$ et $(0;1,5)$;
- Δ' passe par les points de coordonnées $(-3;0)$ et $(0;-2)$.



2. Un vecteur directeur de Δ est $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, tandis qu'un vecteur directeur de Δ' est $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Ces vecteurs sont orthogonaux, puisque

$$2 \times (-6) + 3 \times 4 = 0.$$

Les droites Δ et Δ' sont donc orthogonales.

3. Pour déterminer le point d'intersection M de Δ et Δ' , on résout le système :

$$\begin{cases} 3x - 2y + 3 = 0 \\ 4x + 6y + 12 = 0. \end{cases}$$

On multiplie la première ligne par 3 :

$$\begin{cases} 9x - 6y + 9 = 0 \\ 4x + 6y + 12 = 0. \end{cases}$$

On ajoute membre à membre (les y « s'éliminent ») :

$$13x + 21 = 0,$$

d'où l'on tire $x = -\frac{21}{13}$.


Enfin, on remplace x par $-\frac{21}{13}$ dans la deuxième ligne du système pour avoir y :

$$4 \times \left(-\frac{21}{13}\right) + 6y + 12 = 0 \iff -\frac{84}{13} + 6y + \frac{156}{13} = 0 \iff 6y + \frac{72}{13} = 0 \iff y = -\frac{72}{6 \times 13} = -\frac{12}{13}.$$

Conclusion : $M\left(-\frac{21}{13}; -\frac{12}{13}\right)$.

Exercice 144 On considère dans un repère de centre O les points $A(8;0)$ et $B(0;6)$, le milieu I de $[AB]$ et le projeté orthogonal H de O sur (AB) .

1.



2. (a) Le vecteur $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -8 \\ 6 \end{pmatrix} \begin{smallmatrix} -b \\ a \end{smallmatrix}$ est un vecteur directeur de (AB) , donc (AB) a une équation de la forme

$$6x + 8y + c = 0.$$

$A(8;0) \in (AB)$, donc $6 \times 8 + 8 \times 0 + c = 0$, soit $48 + c = 0$; et finalement $c = -48$.

Conclusion : $(AB) : 6x + 8y - 48 = 0$, ou en simplifiant par 2 :

$$(AB) : 3x + 4y - 24 = 0.$$

Le vecteur $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -8 \\ 6 \end{pmatrix} \begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix}$ est un vecteur normal à (OH) , donc (OH) a une équation de la forme

$$-8x + 6y + c = 0.$$

$O(0;0) \in (OH)$, donc $-8 \times 0 + 6 \times 0 + c = 0$, soit $0 + c = 0$; et ainsi $c = 0$.

Conclusion : $(OH) : -8x + 6y = 0$, ou en simplifiant par 2 :

$$(OH) : -4x + 3y = 0.$$

- (b) H est le point d'intersection de (AB) et (OH) , donc pour avoir ses coordonnées, on résout le système

$$\begin{cases} 3x + 4y - 24 = 0 \\ -4x + 3y = 0. \end{cases}$$

On multiplie la première ligne par 4 et la deuxième par 3 :

$$\begin{cases} 12x + 16y - 96 = 0 \\ -12x + 9y = 0. \end{cases}$$

On ajoute membre à membre (les x « s'éliminent ») :

$$25y - 96 = 0,$$

d'où l'on tire $y = \frac{96}{25} = 3,84$.

Enfin, on remplace y par 3,84 dans la deuxième ligne du système pour avoir x :

$$-4x + 3 \times 3,84 = 0 \iff -4x + 11,52 = 0 \iff x = \frac{-11,52}{-4} = 2,88.$$

Conclusion :

$$H(2,88;3,84).$$

3. Le point H se projette orthogonalement en E sur l'axe des abscisses et en F sur l'axe des ordonnées, donc $E(2,88;0)$ et $F(0;3,84)$. Par ailleurs I est le milieu de $[AB]$ donc

$$I\left(\frac{8+0}{2}; \frac{0+6}{2}\right) \quad I(4;3).$$

On a donc $\overrightarrow{OI}\left(\begin{smallmatrix} 4 \\ 3 \end{smallmatrix}\right)$ et $\overrightarrow{EF}\left(\begin{smallmatrix} -2,88 \\ 3,84 \end{smallmatrix}\right)$. Il s'ensuit que

$$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{EF} = 4 \times (-2,88) + 3 \times 3,84 = 0$$

et donc $(OI) \perp (EF)$.

Exercice 145 On donne les équations de deux droites D , D' sous forme réduite :

$$D: y = mx + p, \quad D': y = m'x + p'.$$

1. L'équation de D se réécrit $0 = \underset{a}{m}x + \underset{b}{-1}y + p = 0$, donc $\overrightarrow{u}\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ m \end{smallmatrix}\right) \overset{-b}{\underset{a}{}}$ dirige D .

Avec le même raisonnement, $\overrightarrow{u}'\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ m' \end{smallmatrix}\right)$ dirige D' .

2. D'après la question 1 :

$$D \perp D' \iff \overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{u}' = 0 \iff 1 \times 1 + m \times m' = 0 \iff m \times m' = -1.$$

3. **Application.** Soit $\Delta: y = 2x - 3$. La perpendiculaire Δ' à Δ passant par $O(0;0)$ a une équation de la forme

$$\Delta': y = mx + p.$$

D'après la question 1 :

$$2 \times m = -1,$$

donc $m = -\frac{1}{2}$. On a donc


$$\Delta': y = -\frac{1}{2}x + p.$$

De plus, Δ' passe par $O(0;0)$, donc


$$0 = -\frac{1}{2} \times 0 + p \implies p = 0.$$

Conclusion :

$$\Delta': y = -\frac{1}{2}x.$$



Exercice 146



1. (a) $\mathcal{C}_1 : (x - x_I)^2 + (y - y_I)^2 = 3^2$, soit $\mathcal{C}_1 : (x - (-2))^2 + (y - 3)^2 = 3^2$; soit enfin

$$\mathcal{C}_1 : (x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 9.$$

- (b) Le rayon de \mathcal{C}_2 est

$$JA = \sqrt{(x_A - x_J)^2 + (y_A - y_J)^2} = \sqrt{(3 - 1)^2 + (1 - (-1))^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8},$$

donc $\mathcal{C}_2 : (x - 1)^2 + (y - (-1))^2 = \sqrt{8}^2$, soit

$$\mathcal{C}_2 : (x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 8.$$

- (c) Le centre de \mathcal{C}_3 est le milieu K de $[BC]$:

$$K\left(\frac{2+6}{2}; \frac{2+0}{2}\right) \quad K(4; 1),$$

et son rayon est

$$KB = \sqrt{(2-4)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{4+1} = \sqrt{5},$$

donc $\mathcal{C}_3 : (x - 4)^2 + (y - 1)^2 = \sqrt{5}^2$, soit

$$\mathcal{C}_3 : (x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 5.$$

2. On sait que $\mathcal{C}_1 : (x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 9$. On remplace x et y par les coordonnées de G :

$$(-3,5 + 2)^2 + (0,5 - 3)^2 = 2,25 + 6,25 = 8,5 \neq 9,$$

donc G n'appartient pas à \mathcal{C}_1 .

3. Pour obtenir les coordonnées des points d'intersection du cercle \mathcal{C}_3 avec l'axe des abscisses, on remplace y par 0 dans l'équation de \mathcal{C}_3 et on résout l'équation :

$$(x-4)^2 + (0-1)^2 = 5 \iff x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2 + 1 - 5 = 0 \iff x^2 - 8x + 12 = 0.$$

C'est une équation du second degré. On trouve $\Delta = 16$, puis deux racines : $x_1 = 2$, $x_2 = 6$.

Conclusion : \mathcal{C}_3 coupe l'axe des abscisses aux points de coordonnées (2;0) et (6;0) (ce dernier n'est autre que le point C).

Exercice 147 1. Dans $x^2 + 4x$, on reconnaît le début de l'identité remarquable

$$(x+2)^2 = x^2 + 2 \times x \times 2 + 2^2 = x^2 + 4x + 4.$$

On écrit alors :

$$x^2 + 4x + 10 = (x^2 + 4x + 4) + 6 = (x+2)^2 + 6.$$

2. Dans $x^2 - 8x$, on reconnaît le début de l'identité remarquable

$$(x-4)^2 = x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2 = x^2 - 8x + 16.$$

On écrit alors :

$$x^2 - 8x + 9 = (x^2 - 8x + 16) - 7 = (x-4)^2 - 7.$$

3. Dans $x^2 + 5x$, on reconnaît le début de l'identité remarquable

$$(x+2,5)^2 = x^2 + 2 \times x \times 2,5 + 2,5^2 = x^2 + 5x + 6,25.$$

On écrit alors :

$$x^2 + 5x + 10 = (x^2 + 5x + 6,25) + 3,75 = (x+2,5)^2 + 3,75.$$

4. Dans $y^2 - 3y$, on reconnaît le début de l'identité remarquable

$$(y-1,5)^2 = y^2 - 2 \times y \times 1,5 + 1,5^2 = y^2 - 3y + 2,25.$$

On écrit alors :

$$y^2 - 3y + 1 = (y^2 - 3y + 2,25) - 1,25 = (y-1,5)^2 - 1,25.$$

Exercice 148 1. Soit $\mathcal{P} : y = x^2 - x - 2$.

- (a) On cherche les racines de $x^2 - x - 2$:

- $a = 1$, $b = -1$, $c = -2$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9$;
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) - \sqrt{9}}{2 \times 1} = \frac{1-3}{2} = \frac{-2}{2} = -1,$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) + \sqrt{9}}{2 \times 1} = \frac{1+3}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

- (b) On pose $f(x) = x^2 - x - 2$ pour $x \in \mathbb{R}$. On étudie les variations :


Pour tout réel x :

$$f'(x) = 2x - 1.$$

Or

$$2x - 1 = 0 \iff 2x = 1 \iff x = \frac{1}{2} = 0,5,$$

on obtient donc :

x	$-\infty$	0.5	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

$$f(0,5) = 0,5^2 - 0,5 - 2 = 0,25 - 2,5 = -2,25.$$

Conclusion : le sommet S de \mathcal{P} a pour coordonnées $(0,5 ; -2,25)$.


2. (a) Dans $x^2 - x$, on reconnaît le début de l'identité remarquable

$$(x - 0,5)^2 = x^2 - 2 \times x \times 0,5 + 0,5^2 = x^2 - x + 0,25.$$

On écrit alors :

$$x^2 - x + 2 = (x^2 - x + 0,25) - 2,25 = (x - 0,5)^2 - 2,25.$$

- (b) On trace d'abord P_1 , à l'aide d'un tableau de valeurs. Puis on trace P_2 , en décalant de 0,5 unité **vers la droite**¹⁴. Enfin, on trace P_3 en décalant de 2,25 unités vers le bas.



Remarque : La parabole P_3 et la parabole \mathcal{P} de la question 1 sont une seule et même courbe. Les coordonnées de son sommet $S(0,5 ; -2,25)$ apparaissent sur la forme canonique

$$x^2 - x + 2 = (x - 0,5)^2 - 2,25.$$

Exercice 149 1. On écrit sous forme canonique :

$$x^2 - 4x = (x^2 - 4x + 4) - 4 = (x - 2)^2 - 4, \quad y^2 + y = (y^2 + y + 0,25) - 0,25 = (y + 0,5)^2 - 0,25.$$

L'égalité $\underbrace{x^2 - 4x}_{(x-2)^2 - 4} + \underbrace{y^2 + y}_{(y+0,5)^2 - 0,25} - 2 = 0$ se réécrit donc $(x - 2)^2 - 4 + (y + 0,5)^2 - 0,25 - 2 = 0$, soit $(x - 2)^2 + (y + 0,5)^2 = 6,25$; soit enfin

$$(x - 2)^2 + (y - (-0,5))^2 = 2,5^2.$$

C'est l'équation du cercle de centre $I(2; -0,5)$ et de rayon $R = 2,5$.

2. On écrit sous forme canonique :

$$x^2 + 3x = (x^2 + 3x + 2,25) - 2,25 = (x + 1,5)^2 - 2,25, \quad y^2 - 6y = (y^2 - 6y + 9) - 9 = (y - 3)^2 - 9.$$


L'égalité $\underbrace{x^2 + 3x}_{(x+1,5)^2 - 2,25} + \underbrace{y^2 - 6y}_{(y-3)^2 - 9} - 1 = 0$ se réécrit donc $(x + 1,5)^2 - 2,25 + (y - 3)^2 - 9 - 1 = 0$, soit $(x + 1,5)^2 + (y - 3)^2 = 12,25$; soit enfin

$$(x - (-1,5))^2 + (y - 3)^2 = 3,5^2.$$

C'est l'équation du cercle de centre $I(-1,5; 3)$ et de rayon $R = 3,5$.

14. Oui, vers la droite, car si l'abscisse mesure le temps, P_2 a « 0,5 seconde de retard » sur P_1 . Par exemple, pour obtenir $y = 0$ avec P_1 , il faut prendre $x = 0$; tandis que pour obtenir $y = 0$ avec P_2 , il faut prendre $x = 0,5$.

Exercice 150 1.



2. • Pour prouver que $ABCD$ est un trapèze, on prouve que (AD) est parallèle à (BC) :

$\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, donc

$$\det(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}) = 4 \times 1 - 2 \times 2 = 0.$$

Par conséquent, \overrightarrow{AD} et \overrightarrow{BC} sont colinéaires; et donc (AD) est parallèle à (BC) .

- Pour prouver que ADC est rectangle en D , on calcule un produit scalaire :

$\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, donc

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CD} = 4 \times 1 + 2 \times (-2) = 0.$$

Par conséquent, (AD) et (CD) sont perpendiculaires; et donc ADC est rectangle en D .

3. Le triangle ACD étant rectangle en D , le centre E de son cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse $[AC]$, et le rayon r de ce cercle est la moitié de l'hypoténuse.

On utilise la formule pour le milieu d'un segment :

$$E\left(\frac{-2+1}{2}; \frac{-2+2}{2}\right) \quad E(-0,5; 0).$$

Et comme $AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} = \sqrt{(1 - (-2))^2 + (2 - (-2))^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$, on trouve $r = 2,5$.

On en déduit que l'équation de \mathcal{C} est

$$(x - (-0,5))^2 + (y - 0)^2 = 2,5^2,$$

soit

$$\mathcal{C} : (x + 0,5)^2 + y^2 = 6,25.$$

4. Pour déterminer les coordonnées de F , on remplace y par 0 dans l'équation de \mathcal{C} et on résout l'équation du second degré que l'on obtient :

$$(x + 0,5)^2 + 0^2 = 6,25$$

$$x^2 + 2 \times x \times 0,5 + 0,5^2 = 6,25$$

$$x^2 + x + 0,25 - 6,25 = 0$$

$$x^2 + x - 6 = 0.$$

- $a = 1, b = 1, c = -6$;
- $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25$;

- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 - \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{-1 - 5}{2} = -3$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 + \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{-1 + 5}{2} = 2.$$

La deuxième solution correspond au point $E(2;0)$, et la première au point F .

Conclusion : $F(-3;0)$.

5. Le vecteur $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -b \\ a \end{matrix}$ dirige (BC) donc

$$(BC) : 1x - 2y + c = 0.$$

Pour trouver c , on remplace x et y par les coordonnées de $B(-1;1)$:

$$1 \times (-1) - 2 \times 1 + c = 0 \implies c = 3.$$

Conclusion : l'équation cartésienne de (BC) est

$$(BC) : x - 2y + 3 = 0.$$

Le point $F(-3;0)$ est sur (BC) puisque

$$-3 - 2 \times 0 + 3 = 0.$$

6. Pour prouver que (BE) et (CD) sont parallèles, on peut bien sûr utiliser le déterminant. Mais nous allons suivre une méthode plus élégante :

On montre facilement que E est le milieu de $[DF]$ et B celui de $[FC]$. Donc d'après le théorème des milieux dans le triangle FDC ¹⁵, (BE) est parallèle à (CD) .

12 Fonction exponentielle

Exercice 151 Dans cet exercice, on utilise deux propriétés du cours :


- la dérivée de $x \mapsto e^{ax+b}$ est $x \mapsto ae^{ax+b}$;
- une exponentielle est strictement positive.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = e^{0,5x+1}$$

$$f'(x) = \underbrace{0,5}_{\oplus} \underbrace{e^{0,5x+1}}_{\oplus}$$

$f' > 0$ donc f strictement croissante sur \mathbb{R} .




Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g(x) = e^{-1,5x}$$

$$g'(x) = \underbrace{-1,5}_{\ominus} \underbrace{e^{-1,5x}}_{\oplus}$$

$g' < 0$ donc g strictement décroissante sur \mathbb{R} .




Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$h(x) = e^{2x-2}$$

$$h'(x) = \underbrace{2}_{\oplus} \underbrace{e^{2x-2}}_{\oplus}$$

$h' > 0$ donc h strictement croissante sur \mathbb{R} .




Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$i(x) = e^{-1x+1}$$

$$i'(x) = \underbrace{-1}_{\ominus} \underbrace{e^{-1x+1}}_{\oplus}$$

$i' < 0$ donc i strictement décroissante sur \mathbb{R} .



15. Le théorème des milieux est un corollaire du théorème réciproque de Thalès : le fait que E soit le milieu de $[DF]$ et B celui de $[FC]$ entraîne l'égalité $\frac{BC}{FC} = \frac{ED}{FD} = \frac{1}{2}$, égalité qui permet d'appliquer le théorème réciproque de Thalès.

À titre d'illustration, on a tracé les courbes des quatre fonctions. Elles ont toutes une allure très similaire, à deux différences près :

- elles montent lorsque $a > 0$, elles descendent lorsque $a < 0$;
- plus $|a|$ est grand, plus la pente de la partie inclinée est forte.

Exercice 152 1. Pour tout $t \geq 0$,

$$f'(t) = -0,0125e^{-0,0125t}.$$

On a donc le tableau de variations :

t	0	20
$-0,0125$		—
$e^{-0,0125t}$		+
$f'(t)$		—
$f(t)$	1	$\approx 0,78$

On trace la courbe à partir d'un tableau de valeurs (le graphique est un peu déformé par rapport à celui que vous avez fait) :

Exercice 153 1. Quand on dérive, la constante $\frac{1}{2}$ en facteur reste en facteur, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{1}{2}(e^x - (-e^{-x})) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}).$$

Une exponentielle étant strictement positive, $g'(x)$ est strictement positive sur \mathbb{R} et on a le tableau de variations :

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$		\nearrow

2. On a

$$g(0) = \frac{1}{2}(e^0 - e^{-0}) = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0,$$

$$g'(0) = \frac{1}{2}(e^0 + e^{-0}) = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1,$$

donc l'équation de T est

$$y = g'(0)(x - 0) + g(0)$$


$$y = 1(x - 0) + 0$$

$$y = x.$$

Exercice 154

t	0	4	8	12	16	20
$f(t)$	1	0,95	0,90	0,86	0,82	0,78


(valeurs arrondies au centième)



2. On évalue l'âge des fragments à 18 siècles environ¹⁶.

3. On fait un petit tableau de valeurs (les valeurs sont arrondies au centième) avant de tracer la courbe :

x	-2	-1	-0,5	0	0,5	1	2
$g(x)$	-3,63	-1,18	-0,52	0	0,52	1,18	3,63



16. Une valeur plus précise est 17,85 siècles. Pour l'obtenir, il faut utiliser le logarithme népérien.

1. La fonction g est définie sur \mathbb{R} par $g(x) = e^x - x - 1$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = e^x - 1 - 0 = e^x - 1.$$

On résout l'équation :

$$e^x - 1 = 0 \iff e^x = 1 \iff e^x = e^0 \iff x = 0.$$

△ On a utilisé la propriété : $e^x = e^y \iff x = y$.


Pour avoir les signes dans chaque case du tableau, on remplace par des valeurs de x :

- pour l'intervalle $]-\infty; 0[$, on prend (par exemple) $x = -1$ et on calcule avec la calculatrice :

$$g'(-1) = e^{-1} - 1 \approx -0,63 \quad \ominus ;$$

- pour l'intervalle $]0; +\infty[$, on prend (par exemple) $x = 1$ et on calcule avec la calculatrice :

$$g'(1) = e^1 - 1 \approx 3,72 \quad \oplus .$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x) = e^x - 1$	$-$	0	$+$
$g(x)$			

$$g(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0.$$

2. Le minimum de g est 0, donc $g(x) \geq 0$ pour tout réel x ; autrement dit $e^x - x - 1 \geq 0$. Cette inégalité se réécrit

$$e^x \geq x + 1.$$

Exercice 155 La fonction f est définie sur l'intervalle $[0; 4]$ par

$$f(x) = (-2x + 1)e^{-x}.$$

1. On utilise la formule pour la dérivée d'un produit avec

$$u(x) = -2x + 1$$

$$u'(x) = -2$$

,

$$v(x) = e^{-x},$$

$$v'(x) = -e^{-x}.$$

,

On obtient, pour tout $x \in [0; 4]$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x) \times v(x) + u(x) \times v'(x) \\ &= -2 \times e^{-x} + (-2x + 1) \times (-e^{-x}) \\ &= -2 \times e^{-x} + (-2x) \times (-e^{-x}) + 1 \times (-e^{-x}) \\ &= -2 \times e^{-x} + 2x \times e^{-x} - 1 \times e^{-x} \\ &= (-2 + 2x - 1) e^{-x} \\ &= (2x - 3) e^{-x}. \end{aligned}$$

2. On étudie le signe de f' et on en déduit les variations de f :

- $2x - 3 = 0 \iff 2x = 3 \iff x = \frac{3}{2} \iff x = 1,5$;
- e^{-x} est \oplus pour tout réel x .

x	0	1.5	4
$2x - 3$	$-$	0	$+$
e^{-x}	$+$		$+$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	1	$-2e^{-1,5}$	$-7e^{-4}$

- $f(0) = (-2 \times 0 + 1) \times \underbrace{e^{-0}}_{=1} = 1 \times 1 = 1$
- $f(1,5) = (-2 \times 1,5 + 1) \times e^{-1,5} = -2e^{-1,5} \approx -0,45$
- $f(4) = (-2 \times 4 + 1) \times e^{-4} = -7e^{-4} \approx -0,13$

Exercice 156 La fonction f est définie sur \mathbb{R} par

$$f(x) = x^2 e^x.$$

On utilise la formule pour la dérivée d'un produit avec

$$\begin{array}{ll} u(x) = x^2 & , & v(x) = e^x, \\ u'(x) = 2x & , & v'(x) = e^x. \end{array}$$

On obtient, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x) \times v(x) + u(x) \times v'(x) \\ &= 2x \times e^x + x^2 \times e^x \\ &= (x^2 + 2x) e^x. \end{aligned}$$

On étudie le signe de f' et on en déduit les variations de f :

- $x^2 + 2x = 0 \iff x(x+2) = 0 \iff (x=0 \text{ ou } x+2=0) \iff (x=0 \text{ ou } x=-2)$
(on aurait aussi pu utiliser le discriminant) ;
- e^x est \oplus pour tout réel x .

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$x^2 + 2x$	$+$	0	$-$	$+$
e^x	$+$		$+$	$+$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$				

- $x^2 + 2x$ (2^d degré) est du signe de a (donc \oplus), sauf entre les racines
- $f(-2) = (-2)^2 \times e^{-2} = 4e^{-2} \approx 0,54$
- $f(0) = 0^2 \times e^0 = 0 \times 1 = 0$

Exercice 157

$$\begin{aligned} \frac{e^8}{e^2 \times e^1 \times e^3} &= \frac{e^8}{e^{2+1+3}} = \frac{e^8}{e^6} = e^{8-6} = e^2 \\ \frac{e \times e^2}{(e^2)^2} &= \frac{e^1 \times e^2}{e^{2 \times 2}} = \frac{e^{1+2}}{e^4} = e^{3-4} = e^{-1} \\ (e^2)^3 \times e^{-5} &= e^{2 \times 3} \times e^{-5} = e^{6-5} = e^1 \end{aligned}$$

Exercice 158 Dans chaque cas, on note \mathcal{S} l'ensemble des solutions.

1.

$$e^x = -3.$$

C'est impossible, car une exponentielle est strictement positive, donc il n'y a pas de solution :

$$\mathcal{S} = \emptyset \quad (\text{ensemble vide}).$$

2.

$$e^{2x-1} = 1 \iff e^{2x-1} = e^0 \iff 2x-1=0 \iff x = \frac{1}{2}$$

Conclusion : $\mathcal{S} = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$.

3. L'équation $e^{2x} + 2e^x = 3$ se réécrit

$$(e^x)^2 + 2e^x - 3 = 0.$$

Pour résoudre, il est astucieux de noter $X = e^x$; l'équation se réécrit alors sous la forme

$$X^2 + 2X - 3 = 0.$$

On résout avec la méthode habituelle :

- $a = 1, b = 2, c = -3$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 16$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$X_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 - \sqrt{16}}{2 \times 1} = \frac{-2 - 4}{2} = \frac{-6}{2} = -3,$$

$$X_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 + \sqrt{16}}{2 \times 1} = \frac{-2 + 4}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

On a posé $X = e^x$, donc il y a deux possibilités :

$$e^x = -3 \quad \text{ou} \quad e^x = 1.$$

La première équation n'a pas de solution, car une exponentielle est strictement positive; la deuxième équation a une seule solution : $x = 0$.

Conclusion : L'unique solution de l'équation $e^{2x} + 2e^x = 3$ est $x = 0$:

$$\mathcal{S} = \{0\}.$$

Exercice 159 On utilisera la propriété : pour tout nombre réel x ,

$$e^x \times e^{-x} = 1.$$

1. D'après l'identité remarquable $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$:

$$(e^x + e^{-x})^2 = (e^x)^2 + 2 \times \underbrace{e^x \times e^{-x}}_{=1} + (e^{-x})^2 = e^{2x} + 2 + e^{-2x}.$$

2. On multiplie le numérateur et le dénominateur par e^x :

$$\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{(e^x - e^{-x}) \times e^x}{(e^x + e^{-x}) \times e^x} = \frac{e^x \times e^x - e^{-x} \times e^x}{e^x \times e^x - e^{-x} \times e^x} = \frac{e^{x+x} - e^{-x+x}}{e^{x+x} + e^{-x+x}} = \frac{e^{2x} - e^0}{e^{2x} + e^0} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}.$$


Exercice 160 En utilisant la courbe de la fonction exponentielle, on place sur l'axe des abscisses (pointillés rouges) :

- le réel x tel que $e^x = a$;
- le réel y tel que $e^y = b$.

On reporte la longueur x à la longueur y sur l'axe des abscisses pour construire $z = x + y$ (en vert), puis on fait un usage astucieux de la propriété fondamentale de l'exponentielle :

$$c = a \times b = e^x \times e^y = e^{x+y} = e^z,$$

donc c est l'exponentielle de z (construit en pointillés violets).



13 Programmation

Exercice 161

Programme	Traduction en français	Commentaires
<pre>for i in range(1,6): print(i**2)</pre>	Pour i allant de 1 à 5 : afficher i^2	<ul style="list-style-type: none">• Δ La commande for i in range(1,6) signifie que i va de 1 à 5 – il y a un décalage à la fin.• On n'oublie pas les « : » à la fin de la première ligne. L'incrément qui suit (équivalent à une tabulation sur Thonny) est alors automatiquement inséré lorsqu'on passe à la ligne.

Exercice 162

Programme	Commentaires
<pre>for i in range(1,11): print(8*i)</pre>	On affiche les résultats les uns en-dessous des autres : $8 \times 1 = 8, 8 \times 2 = 16, 8 \times 3 = 24, \dots, 8 \times 10 = 80.$

Exercice 163 On explique le fonctionnement du programme en remplissant un tableau.

Programme

```

s=0
for i in range(1,101):
    s=s+i
print(s)

```

Tableau

On a une boucle **Pour**, où i va de 1 à 100.

Valeur de i	Valeur de s
	0
1	0 + 1 = 1
2	1 + 2 = 3
3	3 + 3 = 6
4	6 + 4 = 10
...	...
99	...
100	...

Explications

- La 1^{re} ligne du tableau ci-contre correspond à la 1^{re} ligne du code : s = 0 et i n'existe pas encore.
- Dans la boucle, i va de 1 à 100, donc on écrit les valeurs de 1 jusqu'à 100 dans la 1^{re} colonne.
- À chaque étape de la boucle **Pour**, s reçoit la valeur s + i.
Donc au début, lorsque i = 1, s reçoit la valeur s + i = 0 + 1 = 1. La valeur de s a donc été modifiée et il vaut maintenant 1 (et non plus 0).
- Ensuite, lorsque i = 2, s reçoit la nouvelle valeur s + i = 1 + 2 = 3. La valeur de s a été une nouvelle fois modifiée.
- Puis quand i = 3, s reçoit la nouvelle valeur s + i = 3 + 3 = 6. Cela continue ainsi de suite jusqu'en bas du tableau.

Finalement, on part de 0, puis on ajoute 1, puis 2, puis 3; et ainsi de suite jusque 100. On calcule donc

$$1 + 2 + 3 + \dots + 99 + 100.$$

Le résultat, 5 050, s'affiche en fin de programme.

Exercice 164 On édite en machine un programme Python qui calcule :

$$10! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 10.$$

On s'inspire pour cela du programme précédent, avec trois différences :

- on **multiplie** par i à chaque étape, au lieu d'**ajouter** i ;
- au début $s = 1$, élément neutre de la multiplication (si on démarrait avec $s = 0$, la valeur de s vaudrait toujours 0);
- la boucle ne va que de 1 à 10.

```
s=1
for i in range(1,11):
    s=s*i
print(s)
```

Exercice 165 Commençons par des rappels concernant les listes, avec quelques exemples :

- La commande

$$L = [5, 6, 10]$$

crée une liste L de trois éléments. Le premier, $L[0]$, est égal à 5; le deuxième, $L[1]$, est égal à 6; le troisième, $L[2]$, est égal à 10. On notera en particulier l'indexation des termes à partir de 0.

- La commande

$$L.append(2)$$

ajoute un terme à la liste, égal à 2. On aura donc ensuite une liste de 4 éléments : $L = [5, 6, 10, 2]$.

- La commande

$$len(L)$$

renvoie la longueur de la liste.

- La commande

$$L = []$$

crée une liste vide (donc de longueur 0).

Venons-en à l'exercice. On souhaite afficher la liste des nombres de la table de 8 :

$$[8, 16, 24, \cdots, 80].$$

Pour cela, on crée une liste vide L , puis on reprend le programme de l'exercice 162, en ajoutant les nombres de la table à la liste L au fur et à mesure de leur calcul :

```
L=[]
for i in range(1,11):
    L.append(8*i)
print(L)
```

Exercice 166 Rappelons qu'en Python, la double égalité `==` sert à tester une égalité. Par exemple, la commande

```
4==4
```

renvoie **True**; tandis que

```
4==5
```

renvoie **False**.

Programme 1

```
x=3
if x==4:
    print(5*x)
else:
    print(2*x)
```

Puisque $x \neq 4$, le programme affiche

$$2 \times x = 2 \times 3 = 6.$$

Programme 2

```
x=3
if x<=4:
```

```

    print (5*x)
else :
    print (2*x)

```

Puisque $x \leq 4$, le programme affiche

$$5 \times x = 5 \times 3 = 15.$$

Exercice 167 Notons pour commencer qu'un entier $i \geq 1$ est un diviseur de 30 si, et seulement si, $30\%i = 0$.

Sachant cela, on édite un programme Python qui renvoie la liste des diviseurs positifs de 30 :

```

L=[]
for i in range(1,31):
    if 30%i==0:
        L.append(i)
print(L)

```

Exercice 168 On édite la fonction :

```

def f(x):
    return x**2

```

On obtient

$$f(3) = 3^2 = 9$$

$$f(-2) = (-2)^2 = 4$$

Exercice 169 La fonction

```

def g():
    return 5

```

renvoie toujours la valeur 5.

Remarque : Pour lancer la fonction, il faut entrer la commande

```
g()
```

sans oublier les parenthèses, mais sans rien écrire à l'intérieur ¹⁷.

Exercice 170

```

def moyenne(a,b):
    return (a+b)/2

```

Exercice 171

```

def transforme(note):
    x=1.2*note
    if x<=20:
        return x
    else:
        return 20

```

Exercice 172 Nous rencontrons pour la première fois une boucle **Tant que**. Il est sûrement nécessaire de faire quelques rappels.

Programme

```

n=10
while n<=14:
    n=n+1

```

```
print(n)
```

17. Cela fait une différence notable avec les mathématiques, où une fonction dépend forcément d'une (ou plusieurs) variables.

Traduction en français

```
n = 10
Tant que  $n \leq 14$  :
    n = n + 1
afficher n
```

Explications

- Au départ, $n = 10$;
- Puis, tant que $n \leq 14$, n augmente de 1.
- n prend donc successivement les valeurs 11, 12, 13, 14 et 15
- Lorsque $n = 15$, on sort de la boucle **Tant que**. La valeur affichée en sortie est 15 (valeur finale de n).

Tableau

Il est agréable d'expliquer avec un tableau :

Valeur de n	Boucle à continuer? <small>$n \leq 14$?</small>	
10	oui	
$10 + 1 = 11$	oui	
$11 + 1 = 12$	oui	
$12 + 1 = 13$	oui	
$13 + 1 = 14$	oui	
$14 + 1 = 15$	non	

Exercice 173

```
def div(x):
    while x >= 1:
        x = x / 2
    return x
```

⚠ On s'arrête quand le résultat est strictement inférieur à 1, donc **on continue tant qu'il est supérieur ou égal à 1**.

Exercice 174 On rappelle que pour augmenter un nombre de 5 %, il faut le multiplier par 1,05.

On écrit le code, et on l'explique avec un tableau :

Programme

Tableau

```
def seuil():
    somme=100
    annees=0
    while somme<200:
        somme=somme*1.05
        annees=annees+1
    return annees
```

somme	annees	Boucle à continuer? somme<200 ?
100	0	oui
$100 \times 1,05 = 105$	$0 + 1 = 1$	oui
$105 \times 1,05 = 110,25$	$1 + 1 = 2$	oui
$110,25 \times 1,05 \approx 115,76$	$2 + 1 = 3$	oui
...
197,99	14	oui
$197,99 \times 1,05 \approx 207,89$	$14 + 1 = 15$	non

Conclusion : la valeur en sortie est $n = 15$. C'est le nombre d'années nécessaires pour que la somme sur le compte dépasse 200 €.

Exercice 175 On reprend le code de l'exercice précédent, avec trois différences :

- en début de code, on crée une liste qui contient le placement initial (100 €);
- chaque année, on ajoute à la liste la somme sur le compte augmentée des intérêts;
- on affiche en sortie la liste des sommes sur le compte année après année.

```
def seuil():
    somme=100
    L=[100]
    annees=0
    while somme<200:
        somme=somme*1.05
        L.append(somme)
        annees=annees+1
    return L
```

En sortie, c'est une liste de 16 termes qui s'affiche :

[100,105,110.25,...,197.99,207.89] .