

## Corrigé du devoir surveillé n°2

### Exercice 1

On écrit sous forme algébrique :

$$1. (3-2i)(-1+i) = -3+2i+3i-2i^2 = -3+5i+2 = \boxed{-1+5i}$$

$$2. (1+i)^2 = 1^2 + 2 \times 1 \times i + i^2 = 1+2i-1 = \boxed{2i}$$

$$3. i^6 = (i^2)^3 = (-1)^3 = \boxed{-1}$$

$$4. \frac{1+i}{2+i} = \frac{(1+i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{2-i+2i-i^2}{2^2+1^2} = \frac{2+i+1}{5} = \boxed{\frac{3}{5} + \frac{1}{5}i}$$

### Exercice 2

À tout point  $M$  d'affixe  $z = x + iy$ , on associe le point  $M'$  d'affixe

$$z' = (z-4)(\bar{z}+2).$$

1. On écrit sous forme algébrique :

$$z' = (z-4) \times (\bar{z}+2) = (x+iy-4) \times (x-iy+2) = x^2 - \cancel{ixy} + 2x + \cancel{ixy} - i^2 y^2 + 2iy - 4x + 4iy - 8 = x^2 - 2x + y^2 - 8 + 6iy.$$

Conclusion :

$$z' = \underbrace{(x^2 - 2x + y^2 - 8)}_{\text{partie réelle}} + i \times \underbrace{(6y)}_{\text{part. imag.}}.$$

2. La partie imaginaire de  $z'$  est  $6y$ , donc

$$M' \in \Delta \iff \text{Im}(z') = 0 \iff 6y = 0 \iff y = 0.$$


Conclusion :  $\Delta$  est la droite d'équation  $y = 0$ .

3. La partie réelle de  $z'$  est  $x^2 - 2x + y^2 - 8$ , donc

$$M' \in \mathcal{C} \iff \text{Re}(z') = 0 \iff x^2 - 2x + y^2 - 8 = 0 \iff (x-1)^2 - 1 + y^2 - 8 = 0 \iff (x-1)^2 + y^2 = 9.$$

Conclusion :  $\mathcal{C}$  est le cercle de centre  $I(1;0)$  de rayon  $\sqrt{9} = 3$ .

4.



### Exercice 3

Pour tout  $z \in \mathbb{C}$ , on pose  $P(z) = z^3 - z^2 + 2$ .

1.  $-1$  est une racine de  $P$ , car  $P(-1) = (-1)^3 - (-1)^2 + 2 = -1 - 1 + 2 = 0$ .
2. D'après la proposition 2 du cours, on peut factoriser par  $z - (-1) = z + 1$ . Pour obtenir le quotient, on pose la division euclidienne :

$$\begin{array}{r|l}
 z^3 - z^2 + 0z + 2 & z + 1 \\
 \underline{-(z^3 + z^2)} & z^2 - 2z + 2 \\
 -2z^2 + 0z + 2 & \\
 \underline{-(2z^2 - 2z)} & 2z + 2 \\
 2z + 2 & \\
 \underline{-(2z + 2)} & 0
 \end{array}$$

On a donc

$$z^3 - z^2 + 2 = (z + 1)(z^2 - 2z + 2).$$

3. L'équation  $P(z) = 0$  se réécrit

$$(z + 1)(z^2 - 2z + 2) = 0,$$

donc

$$z + 1 = 0 \quad \text{ou} \quad z^2 - 2z + 2 = 0.$$

- L'équation  $z + 1 = 0$  a pour solution  $z = -1$ .
- On résout l'équation  $z^2 - 2z + 2 = 0$  :
  - Le discriminant est  $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = -4$ .
  - $\Delta < 0$ , donc il y a deux solutions dans  $\mathbb{C}$  :

$$\begin{aligned}
 z_1 &= \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a} = \frac{2 - i\sqrt{4}}{2 \times 1} = \frac{2 - 2i}{2} = 1 - i, \\
 z_2 &= \overline{z_1} = 1 + i.
 \end{aligned}$$

Conclusion : les solutions de l'équation  $P(z) = 0$  sont  $-1$ ,  $1 - i$  et  $1 + i$ .