

Mathématiques – Maths expertes

Corrigés des exercices

Table des matières

1 [Divisibilité, nombres premiers](#)

2

1 Divisibilité, nombres premiers

Exercice 1 1. • On écrit tous les produits d'entiers positifs qui donnent 20 :

$$20 = 1 \times 20 = 2 \times 10 = 4 \times 5,$$

donc les diviseurs de 20 sont

$$1, 2, 4, 5, 10 \text{ et } 20.$$

• On écrit tous les produits d'entiers positifs qui donnent 36 :

$$36 = 1 \times 36 = 2 \times 18 = 3 \times 12 = 4 \times 9 = 6 \times 6,$$

donc les diviseurs de 36 sont

$$1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 \text{ et } 36.$$

2. Le nombre 1452 est :

- divisible par 2, car il est pair ;
- divisible par 3, car la somme de ses chiffres, $1 + 4 + 5 + 2 = 12$, est divisible par 3 ;
- non divisible par 5, car il ne se termine ni par 0, ni par 5 ;
- non divisible par 9, car la somme de ses chiffres, 12, n'est pas divisible par 9.

Exercice 2 On factorise : l'égalité $x^2 + xy = 65$ se réécrit

$$x(x + y) = 65.$$

x et y sont des entiers naturels, donc $x + y$ également. Or les différentes manières d'écrire 65 comme un produit d'entiers naturels sont :

$$65 = 1 \times 65 = 5 \times 13 = 13 \times 5 = 65 \times 1.$$

Il y a donc quatre possibilités :

$$\begin{cases} x = 1 \\ x + y = 65 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 5 \\ x + y = 13 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 13 \\ x + y = 5 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = 65 \\ x + y = 1 \end{cases}.$$

On résout de tête chacun des quatre systèmes :

$$(x = 1, y = 64), \quad (x = 5, y = 8), \quad (x = 13, y = -8) \quad \text{ou} \quad (x = 65, y = -64).$$

Comme on cherche des entiers naturels, seules les deux premières solutions sont valables. L'équation a donc deux solutions :

$$(x, y) = (1, 64) \quad \text{ou} \quad (x, y) = (5, 8).$$

Exercice 3 1. Trois entiers consécutifs sont de la forme $n, n + 1, n + 2$, avec n entier (dans $\mathbb{Z}$), donc leur somme est

$$n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1).$$

$n + 1$ est un entier, donc $n + (n + 1) + (n + 2)$ est un multiple de 3.

2. Quatre entiers consécutifs sont de la forme $n, n + 1, n + 2, n + 3$, avec n entier, donc leur somme est

$$n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) = 4n + 6 = 4(n + 1,5).$$

Or $n + 1,5$ n'est pas un entier, donc la somme des quatre entiers consécutifs n'est pas un multiple de 4.

Exercice 4 Si n est pair, on peut l'écrire $n = 2k$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Donc

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \times 2k^2,$$

qui est bien pair (c'est un multiple de 2).

Si n est impair, on peut l'écrire $n = 2k + 1$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Donc

$$n^2 = (2k + 1)^2 = (2k)^2 + 2 \times 2k \times 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 = 2 \times (2k^2 + 2k) + 1,$$

qui est bien impair, puisqu'on peut l'écrire sous la forme $2m + 1$, avec m entier.

Conclusion : un entier est pair si, et seulement si, son carré est pair.

Exercice 5 1. On part de $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ et on élève au carré : $(\sqrt{2})^2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2$. On a donc

$$2 = \frac{p^2}{q^2} \quad \text{puis} \quad p^2 = 2q^2.$$

On en déduit que p^2 est pair ; et donc que p lui-même est pair d'après l'exercice précédent.

2. Puisque p est pair, on peut l'écrire $p = 2r$, où r est un entier. L'égalité $p^2 = 2q^2$ se réécrit alors $(2r)^2 = 2q^2$, donc $4r^2 = 2q^2$; et en divisant par 2 :

$$q^2 = 2r^2.$$

Mais alors q^2 est pair, donc q l'est également (toujours d'après l'exercice précédent). Finalement, p et q sont pairs tous les deux, ce qui est absurde car on a supposé la fraction $\frac{p}{q}$ irréductible – or on peut simplifier par 2.

Conclusion : supposant que $\sqrt{2}$ pouvait s'écrire sous forme de fraction irréductible $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, on aboutit à une absurdité. C'est donc qu'une telle écriture est impossible : $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Remarque : Une autre façon de procéder est de partir de $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, sans supposer la fraction irréductible. En menant le même raisonnement qu'au-dessus, on voit que l'on peut simplifier par 2 : $\sqrt{2} = \frac{p'}{q'}$, avec $p' = \frac{p}{2}$ et $q' = \frac{q}{2}$. On peut alors recommencer et écrire $\sqrt{2} = \frac{p''}{q''}$, avec $p'' = \frac{p'}{2}$ et $q'' = \frac{q'}{2}$, puis recommencer à nouveau, etc. Les numérateurs et les dénominateurs successifs sont divisés par deux à chaque étape... ce qui est impossible, car on ne peut pas, partant d'un entier naturel, diviser indéfiniment par 2 en restant dans l'ensemble des entiers naturels. Ce type de raisonnement par l'absurde est connu sous le nom de « descente infinie de Fermat ».

- Exercice 6** 1. Si a divise n et $n + 1$, alors il divise leur différence $(n + 1) - n = 1$, donc a ne peut valoir que 1 ou -1 (ce sont les seuls diviseurs entiers de 1).
2. Si a divise deux entiers impairs successifs $2n + 1$ et $2n + 3$, alors il divise leur différence $(2n + 3) - (2n + 1) = 2$. On en déduit que a est égal à 1, 2, -1 ou -2 .

En réalité, a ne peut valoir ni 2, ni -2 , car alors tous ses multiples seraient pairs ; et ce n'est pas le cas de $2n + 1$ (ni de $2n + 3$, d'ailleurs).

Conclusion : $a = 1$ ou $a = -1$.

- Exercice 7** 1. Le nombre $n + 2$ se divise lui-même (!), donc s'il divise $n + 12$, il divise la différence

$$(n + 12) - (n + 2) = 10.$$

2. Les diviseurs de 10 sont ± 1 , ± 2 , ± 5 et ± 10 (il y en a huit), donc d'après la question précédente, $n + 2$ est égal à l'un de ces huit nombres. On peut éliminer -1 , -2 , -5 , -10 et 1, car n étant un entier naturel, $n + 2$ est supérieur ou égal à 2.

Conclusion : il reste trois solutions possibles : $n + 2 = 2$, $n + 2 = 5$ ou $n + 2 = 10$, c'est-à-dire $n = 0$, $n = 3$ ou $n = 8$. On vérifie si elles conviennent :

- si $n = 0$, on a $n + 2 = 2$, qui divise bien $n + 12 = 12$.
- si $n = 3$, on a $n + 2 = 5$, qui divise bien $n + 12 = 15$.
- si $n = 8$, on a $n + 2 = 10$, qui divise bien $n + 12 = 20$.

Conclusion : il y a trois solutions : $n = 0$, $n = 3$ et $n = 8$.

Remarque : On a fait un raisonnement « par analyse-synthèse ». La partie *analyse* est celle où l'on élimine toutes les solutions à l'exception de 0, 3 et 8 ; la partie *synthèse* celle où l'on vérifie que 0, 3 et 8 sont bien solutions.

- Exercice 8** • On effectue la division euclidienne de 198 par 7 :

$$\begin{array}{r|l} 198 & 7 \\ - 14 & 28 \\ \hline 58 & \\ - 56 & \\ \hline 2 & \end{array}$$

$$198 = 28 \times 7 + 2.$$

Remarque : On obtient directement la réponse avec une calculatrice en faisant les calculs $198 \div 7 = 28, \dots$, puis $198 - 28 \times 7 = 2$.

- On effectue la division euclidienne de 587 par 13 :

$$\begin{array}{r|l} 587 & 13 \\ - 52 & 45 \\ \hline 67 & \\ - 65 & \\ \hline 2 & \end{array}$$

$$587 = 45 \times 13 + 2.$$

- On effectue la division euclidienne de -50 par 8.

Comme $50 = 6 \times 8 + 2$, on est tenté d'écrire $-50 = -6 \times 8 + (-2)$, et de dire que le quotient vaut -6 et le reste -2 . C'est une erreur : on impose au reste r de vérifier $0 \leq r < 8$, donc il ne peut pas être négatif. La bonne solution est

$$-50 = -7 \times 8 + 6.$$

Le quotient (-7) et le reste (6) sont bien des entiers, et $0 \leq 6 < 8$. Rassurez-vous, vous n'aurez jamais besoin de refaire cela en exercice ou en évaluation...

Exercice 9

- On a

$$3n + 2 = 3 \times n + 2,$$

donc le quotient est 3, le reste 2 (on a bien $0 \leq 2 < 3$).

- On a

$$4n + 10 = 4(n + 2) + 2,$$

donc le quotient est $n + 2$, le reste 2 (on a bien $0 \leq 2 < 4$).

En fait, 4 va n fois dans $4n$, et il va 2 fois dans 10, donc 4 va $n + 2$ fois dans $4n + 10$.

Exercice 10 On suppose que la différence entre a et b est 538, et que le quotient dans la division de a par b est 13, le reste 34. On peut donc écrire

$$\begin{cases} a = b + 538 \\ a = 13b + 34 \end{cases}.$$

Par comparaison,

$$b + 538 = 13b + 34,$$

donc

$$538 - 34 = 13b - b \quad b = \frac{504}{12} = 42.$$

Conclusion : $b = 42$ et $a = b + 538 = 42 + 538 = 580$.

Exercice 11 1. Quand on regroupe les allumettes par paquets de 4, il en reste 3, donc

$$n = 4q + 3;$$

et quand on les regroupe par paquets de 5, il n'en reste qu'une, donc

$$n = 5q' + 1.$$

On obtient ainsi le système

$$\begin{cases} n = 4q + 3 \\ n = 5q' + 1 \end{cases}.$$

2. On multiplie la première ligne du système par 5 et la deuxième ligne par 4 :

$$\begin{cases} 5n = 20q + 15 \\ 4n = 20q' + 4 \end{cases}.$$

On soustrait la deuxième ligne à la première :

$$5n - 4n = (20q + 15) - (20q' + 4) \quad \text{soit} \quad n = 20(q - q') + 11.$$

3. Comme $0 \leq 11 < 20$, l'égalité de la question précédente

$$n = 20(q - q') + 11$$

est le résultat de la division euclidienne de n par 20 : le quotient est $q - q'$ (que l'on ne connaît pas) et le reste est 11.

Or on sait qu'il y a entre 100 et 120 allumettes ; et comme $100 = 20 \times 5$ et $120 = 20 \times 6$, on a $q - q' = 5$ et $n = 20 \times 5 + 11 = 111$.

Conclusion : il y a 111 allumettes dans le paquet.

Exercice 12 On écrit tous les produits d'entiers qui donnent 48 et 84 :

$$\begin{aligned} 48 &= 1 \times 48 \\ &= 2 \times 24 \\ &= 3 \times 16 \\ &= 4 \times 12 \\ &= 6 \times 8. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 84 &= 1 \times 84 \\ &= 2 \times 42 \\ &= 3 \times 28 \\ &= 4 \times 21 \\ &= 6 \times 14 \\ &= 7 \times 12. \end{aligned}$$

Les diviseurs de 48 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48.

Les diviseurs de 84 sont 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 et 84.

Le PGCD est le plus grand nombre qui divise à la fois 48 et 84. L'examen des listes ci-dessus donne

$$\text{PGCD}(48, 84) = 12.$$

Exercice 13 • On cherche le PGCD de 840 et 144. On effectue les divisions successives :

$$\begin{aligned} 840 &= 5 \times 144 + 120, \\ 144 &= 1 \times 120 + 24, \\ 120 &= 5 \times 24 + 0. \end{aligned}$$

Le PGCD est le dernier reste non nul :

$$\text{PGCD}(144, 840) = 24.$$

• On cherche le PGCD de 252 et 180. On effectue les divisions successives :

$$\begin{aligned} 252 &= 1 \times 180 + 72, \\ 180 &= 2 \times 72 + 36, \\ 72 &= 2 \times 36 + 0. \end{aligned}$$

Le PGCD est le dernier reste non nul :

$$\text{PGCD}(252, 180) = 36.$$

• On cherche le PGCD de 215 et 28. On effectue les divisions successives :

$$\begin{aligned} 215 &= 7 \times 28 + 19, \\ 28 &= 1 \times 19 + 9, \\ 19 &= 2 \times 9 + 1 \\ 9 &= 9 \times 1 + 0. \end{aligned}$$

On a donc $\text{PGCD}(215, 28) = 1$.

Remarque : Comme $\text{PGCD}(215, 28) = 1$, on dit que 215 et 28 sont premiers entre eux – leur seul diviseur positif commun est 1.

Exercice 14 Le côté de chaque dalle (exprimé en cm) doit être un entier qui divise 840 et 350; on veut de plus que ce côté soit le plus grand possible. On cherche donc le PGCD de 840 et 350 :

$$840 = 2 \times 350 + 140,$$

$$350 = 2 \times 140 + 70,$$

$$140 = 2 \times 70 + 0.$$

Conclusion : $\text{PGCD}(840, 350) = 70$, donc chaque dalle a un côté de 70 cm.

De plus, il y a $840 \div 70 = 12$ dalles en longueur; et $350 \div 70 = 5$ dalles en largeur, donc un total de

$$12 \times 5 = 60 \text{ dalles.}$$