

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>FarmaMamá — Tu farmacéutica de confianza</title>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lora:ital,wght@0,400;0,600;1,400&family=Nunito:wght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
<style>
:root {
  --sage: #6B9E78;
  --sage-dark: #4E7A5A;
  --sage-light: #A8CBAF;
  --sage-pale: #EDF5EF;
  --cream: #FDFAF6;
  --warm-white: #FAF7F2;
  --text: #2A2A2A;
  --text-soft: #6B6B6B;
  --text-lighter: #9E9E9E;
  --green-bg: #E8F5E9; --green-txt: #2E7D32;
  --yellow-bg: #FFF8E1; --yellow-txt: #E65100;
  --red-bg: #FFEBEE; --red-txt: #C62828;
  --border: #EAE6DF;
  --shadow-sm: 0 2px 12px rgba(0,0,0,0.06);
  --shadow-md: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.09);
  --r: 18px;
}

* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

body {
  font-family: 'Nunito', sans-serif;
  background: var(--cream);
  color: var(--text);
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

/* —— HEADER —— */
header {
  background: white;
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  padding: 0 24px;
  height: 60px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
  flex-shrink: 0;
}

.logo {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 9px;
}

```

```
.logo-mark {
  width: 34px; height: 34px;
  background: linear-gradient(135deg, var(--sage), var(--sage-dark));
  border-radius: 10px;
  display: grid;
  place-items: center;
  font-size: 17px;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(107,158,120,0.35);
}
```

```
.logo-name {
  font-family: 'Lora', serif;
  font-size: 20px;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.2px;
  color: var(--text);
}
.logo-name span { color: var(--sage); }
```

```
.header-right {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
}
```

```
.situation-pill {
  display: flex;
  background: var(--sage-pale);
  border-radius: 30px;
  padding: 3px;
  gap: 2px;
}
```

```
.sit-btn {
  border: none;
  background: transparent;
  border-radius: 24px;
  padding: 5px 13px;
  font-family: 'Nunito', sans-serif;
  font-size: 12px;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-soft);
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s;
  white-space: nowrap;
}
.sit-btn.active {
  background: white;
  color: var(--sage-dark);
  box-shadow: 0 1px 6px rgba(0,0,0,0.1);
}
```

```
/* ——— LAYOUT ——— */
```

```
.app {
  display: flex;
  flex: 1;
  height: calc(100vh - 60px);
  overflow: hidden;
}
```

```
/* —— SIDEBAR —— */
.sidebar {
  width: 280px;
  flex-shrink: 0;
  background: white;
  border-right: 1px solid var(--border);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  overflow: hidden;
}

.sidebar-top {
  padding: 20px 16px 12px;
  border-bottom: 1px solid var(--border);
}

.sidebar-title {
  font-size: 11px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 1px;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--text-lighter);
  margin-bottom: 10px;
}

.new-chat-btn {
  width: 100%;
  background: var(--sage);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 12px;
  padding: 10px;
  font-family: 'Nunito', sans-serif;
  font-size: 14px;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.2s;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 6px;
}

.new-chat-btn:hover { background: var(--sage-dark); }

.sidebar-scroll {
  flex: 1;
  overflow-y: auto;
  padding: 12px 10px;
}

.sidebar-section {
  margin-bottom: 20px;
}

.sidebar-section-label {
  font-size: 10px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.8px;
  text-transform: uppercase;
}
```

```

    color: var(--text-lighter);
    padding: 0 6px;
    margin-bottom: 6px;
}

.quick-item {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 8px;
    padding: 8px 10px;
    border-radius: 10px;
    cursor: pointer;
    font-size: 13px;
    color: var(--text-soft);
    font-weight: 500;
    transition: all 0.15s;
    border: none;
    background: none;
    width: 100%;
    text-align: left;
}

.quick-item:hover { background: var(--sage-pale); color: var(--sage-dark); }
.quick-item-icon { font-size: 15px; width: 20px; flex-shrink: 0; }

.drug-chip {
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    gap: 5px;
    background: var(--sage-pale);
    border: 1px solid var(--sage-light);
    color: var(--sage-dark);
    border-radius: 20px;
    padding: 4px 11px;
    font-size: 12px;
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    margin: 3px;
    transition: all 0.15s;
}

.drug-chip:hover { background: var(--sage); color: white; border-color: var(--sage); }

/* —— CHAT AREA —— */
.chat-area {
    flex: 1;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    overflow: hidden;
    background: var(--cream);
}

.messages {
    flex: 1;
    overflow-y: auto;
    padding: 24px 20px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 16px;
}

/* Welcome screen */

```

```
.welcome {  
  max-width: 560px;  
  margin: 40px auto 0;  
  text-align: center;  
  animation: fadeIn 0.5s ease;  
}
```

```
@keyframes fadeIn { from { opacity:0; transform: translateY(12px); } to { opacity:1; transform:  
translateY(0); } }
```

```
.welcome-icon {  
  font-size: 52px;  
  margin-bottom: 16px;  
  display: block;  
}
```

```
.welcome h2 {  
  font-family: 'Lora', serif;  
  font-size: 26px;  
  font-weight: 600;  
  color: var(--text);  
  margin-bottom: 10px;  
  line-height: 1.3;  
}
```

```
.welcome h2 em {  
  color: var(--sage);  
  font-style: italic;  
}
```

```
.welcome p {  
  font-size: 15px;  
  color: var(--text-soft);  
  line-height: 1.65;  
  margin-bottom: 28px;  
}
```

```
.welcome-examples {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 1fr;  
  gap: 10px;  
  text-align: left;  
}
```

```
.example-card {  
  background: white;  
  border: 1px solid var(--border);  
  border-radius: var(--r);  
  padding: 14px 16px;  
  cursor: pointer;  
  transition: all 0.2s;  
  font-size: 13px;  
  color: var(--text-soft);  
  line-height: 1.5;  
}  
.example-card:hover {  
  border-color: var(--sage-light);  
  box-shadow: var(--shadow-sm);  
  color: var(--text);  
  transform: translateY(-1px);  
}
```

```
}  
.example-card strong {  
  display: block;  
  font-size: 12px;  
  font-weight: 700;  
  color: var(--sage);  
  text-transform: uppercase;  
  letter-spacing: 0.5px;  
  margin-bottom: 4px;  
}
```

```
/* Messages */  
.msg {  
  display: flex;  
  gap: 10px;  
  max-width: 760px;  
  animation: msgIn 0.3s ease;  
}
```

```
@keyframes msgIn { from { opacity:0; transform: translateY(8px); } to { opacity:1; transform:  
translateY(0); } }
```

```
.msg.user { flex-direction: row-reverse; align-self: flex-end; }  
.msg.assistant { align-self: flex-start; }
```

```
.msg-avatar {  
  width: 32px; height: 32px;  
  border-radius: 50%;  
  display: grid;  
  place-items: center;  
  font-size: 15px;  
  flex-shrink: 0;  
  margin-top: 2px;  
}
```

```
.msg.user .msg-avatar {  
  background: linear-gradient(135deg, #B8D4BB, var(--sage-light));  
}
```

```
.msg.assistant .msg-avatar {  
  background: linear-gradient(135deg, var(--sage), var(--sage-dark));  
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(107,158,120,0.3);  
}
```

```
.msg-bubble {  
  max-width: 85%;  
  padding: 14px 18px;  
  border-radius: var(--r);  
  font-size: 14.5px;  
  line-height: 1.7;  
}
```

```
.msg.user .msg-bubble {  
  background: var(--sage);  
  color: white;  
  border-bottom-right-radius: 4px;  
}
```

```
.msg.assistant .msg-bubble {  
  background: white;
```

```

    color: var(--text);
    border-bottom-left-radius: 4px;
    box-shadow: var(--shadow-sm);
    border: 1px solid var(--border);
}

/* AI response formatting */
.msg.assistant .msg-bubble h3 {
    font-family: 'Lora', serif;
    font-size: 17px;
    font-weight: 600;
    color: var(--text);
    margin: 12px 0 6px;
}
.msg.assistant .msg-bubble h3:first-child { margin-top: 0; }

.msg.assistant .msg-bubble p { margin-bottom: 8px; }
.msg.assistant .msg-bubble p:last-child { margin-bottom: 0; }

.msg.assistant .msg-bubble ul {
    padding-left: 18px;
    margin: 6px 0;
}
.msg.assistant .msg-bubble li { margin-bottom: 4px; }

.safety-inline {
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    gap: 5px;
    padding: 3px 10px;
    border-radius: 20px;
    font-size: 12px;
    font-weight: 700;
    vertical-align: middle;
}
.safety-inline.green { background: var(--green-bg); color: var(--green-txt); }
.safety-inline.yellow { background: var(--yellow-bg); color: var(--yellow-txt); }
.safety-inline.red { background: var(--red-bg); color: var(--red-txt); }

.disclaimer-inline {
    margin-top: 12px;
    padding: 10px 14px;
    background: #FFF8F0;
    border-left: 3px solid #FFB74D;
    border-radius: 0 10px 10px 0;
    font-size: 12.5px;
    color: var(--text-soft);
    line-height: 1.5;
}

/* Typing indicator */
.typing {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 5px;
    padding: 14px 18px;
    background: white;
    border: 1px solid var(--border);
    border-radius: var(--r);
    border-bottom-left-radius: 4px;

```

```

    box-shadow: var(--shadow-sm);
    width: fit-content;
}
.dot {
    width: 7px; height: 7px;
    background: var(--sage-light);
    border-radius: 50%;
    animation: bounce 1.2s infinite;
}
.dot:nth-child(2) { animation-delay: 0.2s; }
.dot:nth-child(3) { animation-delay: 0.4s; }
@keyframes bounce {
    0%, 60%, 100% { transform: translateY(0); }
    30% { transform: translateY(-6px); background: var(--sage); }
}

/* —— INPUT BAR —— */
.input-bar {
    padding: 16px 20px;
    background: white;
    border-top: 1px solid var(--border);
    flex-shrink: 0;
}

.input-wrap {
    max-width: 760px;
    margin: 0 auto;
    display: flex;
    gap: 10px;
    align-items: flex-end;
    background: var(--warm-white);
    border: 1.5px solid var(--border);
    border-radius: 16px;
    padding: 8px 8px 8px 16px;
    transition: border-color 0.2s, box-shadow 0.2s;
}
.input-wrap:focus-within {
    border-color: var(--sage-light);
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(107,158,120,0.12);
}

#userInput {
    flex: 1;
    border: none;
    background: transparent;
    font-family: 'Nunito', sans-serif;
    font-size: 14.5px;
    color: var(--text);
    outline: none;
    resize: none;
    max-height: 120px;
    line-height: 1.5;
    padding: 6px 0;
}
#userInput::placeholder { color: var(--text-lighter); }

.send-btn {
    width: 38px; height: 38px;
    background: var(--sage);
    border: none;

```



```

border-radius: 10px;
color: white;
font-size: 17px;
cursor: pointer;
transition: all 0.2s;
display: grid;
place-items: center;
flex-shrink: 0;
}
.send-btn:hover { background: var(--sage-dark); transform: scale(1.05); }
.send-btn:disabled { background: var(--sage-light); cursor: not-allowed; transform: none; }

```

```

.input-hint {
  text-align: center;
  font-size: 11px;
  color: var(--text-lighter);
  margin-top: 8px;
}

```

```

/* —— SCROLLBAR —— */
::-webkit-scrollbar { width: 5px; }
::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
::-webkit-scrollbar-thumb { background: var(--border); border-radius: 10px; }

```

```

/* —— MOBILE —— */
@media (max-width: 640px) {
  .sidebar { display: none; }
  .situation-pill .sit-btn { padding: 5px 9px; font-size: 11px; }
  .welcome-examples { grid-template-columns: 1fr; }
}

```

```

</style>
</head>
<body>

```

```

<header>
  <div class="logo">
    <div class="logo-mark"><img alt="leaf icon" data-bbox="321 583 345 600"/></div>
    <div class="logo-name">Farma<span>Mamá</span></div>
  </div>
  <div class="header-right">
    <div class="situation-pill">
      <button class="sit-btn active" onclick="setSituation('lm', this)"><img alt="lactating woman icon" data-bbox="654 662 674 679"/> Lactancia</button>
      <button class="sit-btn" onclick="setSituation('emb', this)"><img alt="pregnant woman icon" data-bbox="618 684 635 701"/> Embarazo</button>
      <button class="sit-btn" onclick="setSituation('both', this)">Ambas</button>
    </div>
  </div>
</header>

```

```

<div class="app">
  <!-- SIDEBAR -->
  <aside class="sidebar">
    <div class="sidebar-top">
      <div class="sidebar-title">Consultas</div>
      <button class="new-chat-btn" onclick="newChat()"><img alt="pencil icon" data-bbox="561 847 588 864"/> Nueva consulta</button>
    </div>
    <div class="sidebar-scroll">
      <div class="sidebar-section">
        <div class="sidebar-section-label">Preguntas frecuentes</div>

```

```

<button class="quick-item" onclick="sendQuick('¿Puedo tomar ibuprofeno dando el
pecho?')">
  <span class="quick-item-icon">💊</span> Ibuprofeno y lactancia
</button>
<button class="quick-item" onclick="sendQuick('¿Es seguro el Nolotil en el embarazo?')">
  <span class="quick-item-icon">🤰</span> Nolotil en embarazo
</button>
<button class="quick-item" onclick="sendQuick('¿Qué antibiótico puedo tomar si estoy
dando el pecho?')">
  <span class="quick-item-icon">🦠</span> Antibióticos seguros
</button>
<button class="quick-item" onclick="sendQuick('Tengo alergia y quiero tomar
antihistamínico, ¿cuál es más seguro en la lactancia?')">
  <span class="quick-item-icon">🌸</span> Antihistamínicos
</button>
<button class="quick-item" onclick="sendQuick('¿Puedo tomar omeprazol durante el
embarazo?')">
  <span class="quick-item-icon">👤</span> Omeprazol embarazo
</button>
<button class="quick-item" onclick="sendQuick('¿El fluconazol es compatible con la
lactancia?')">
  <span class="quick-item-icon">🍄</span> Fluconazol y lactancia
</button>
</div>

<div class="sidebar-section">
  <div class="sidebar-section-label">Buscar medicamento</div>
  <div style="padding: 0 4px; line-height: 1.8;">
    <span class="drug-chip" onclick="sendQuick('¿Paracetamol en
lactancia?')">Paracetamol</span>
    <span class="drug-chip" onclick="sendQuick('¿Ibuprofeno en embarazo?')">Ibuprofeno</
span>
    <span class="drug-chip" onclick="sendQuick('¿Nolotil en lactancia?')">Nolotil</span>
    <span class="drug-chip" onclick="sendQuick('¿Augmentine en
embarazo?')">Augmentine</span>
    <span class="drug-chip" onclick="sendQuick('¿Polaramine en lactancia?')">Polaramine</
span>
    <span class="drug-chip" onclick="sendQuick('¿Primperán en embarazo?')">Primperán</
span>
    <span class="drug-chip" onclick="sendQuick('¿Motilium en lactancia?')">Motilium</span>
    <span class="drug-chip" onclick="sendQuick('¿Hierro en embarazo?')">Hierro</span>
    <span class="drug-chip" onclick="sendQuick('¿Fortecortin en lactancia?')">Fortecortin</
span>
  </div>
</div>
</div>
</aside>

<!-- CHAT -->
<div class="chat-area">
  <div class="messages" id="messages">
    <div class="welcome" id="welcome">
      <span class="welcome-icon">👋</span>
      <h2>Hola, soy tu <em>farmacéutica virtual</em></h2>
      <p>Puedes preguntarme sobre cualquier medicamento durante el embarazo o la lactancia.
Te explicaré si es seguro, qué precauciones tener y qué alternativas existen — en lenguaje claro,
sin tecnicismos.</p>

```

```

<div class="welcome-examples">
  <div class="example-card" onclick="sendQuick('Me duele la cabeza y estoy dando el
pecho. ¿Puedo tomar algo?')">
    <strong>&img alt="pill icon" data-bbox="228 113 255 130"/> Dolor / Fiebre</strong>
    Me duele la cabeza y estoy dando el pecho. ¿Puedo tomar algo?
  </div>
  <div class="example-card" onclick="sendQuick('Tengo una infección urinaria en el
embarazo. ¿Qué antibiótico es seguro?')">
    <strong>&img alt="virus icon" data-bbox="228 193 255 210"/> Infección</strong>
    Tengo una infección urinaria en el embarazo. ¿Qué antibiótico es seguro?
  </div>
  <div class="example-card" onclick="sendQuick('¿Puedo tomar Nurofen gel para el dolor de
espalda en el tercer trimestre?')">
    <strong>&img alt="leaf icon" data-bbox="228 273 255 290"/> Tópicos</strong>
    ¿Puedo tomar Nurofen gel para el dolor de espalda en el tercer trimestre?
  </div>
  <div class="example-card" onclick="sendQuick('Estoy tomando amoxicilina y omeprazol.
¿Son compatibles entre sí durante la lactancia?')">
    <strong>&img alt="warning icon" data-bbox="228 353 255 370"/> Combinaciones</strong>
    Estoy tomando amoxicilina y omeprazol. ¿Son compatibles entre sí en lactancia?
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="input-bar">
  <div class="input-wrap">
    <textarea id="userInput" rows="1"
      placeholder="Escribe tu pregunta sobre un medicamento..."
      onkeydown="handleKey(event)"
      oninput="autoResize(this)"></textarea>
    <button class="send-btn" id="sendBtn" onclick="sendMessage()">>></button>
  </div>
  <div class="input-hint">&img alt="info icon" data-bbox="328 573 355 590"/> Información orientativa — no sustituye la consulta con tu médico
o farmacéutico</div>
</div>
</div>
</div>

<script>
// ——— DATABASE

```

```

const DB = [
  { inn:"Paracetamol", trade:"Apiretal, Efferalgan, Gelocatil, Termalgín", category:"Analgésico /
Antipirético", safety_lm:&img alt="green circle icon" data-bbox="298 748 325 765"/> Seguro, safety_emb:&img alt="green circle icon" data-bbox="298 748 325 765"/> Seguro, trimestres:"T1, T2, T3",
text_lm:"Es el analgésico más seguro durante la lactancia. Pasa a la leche en cantidades muy
pequeñas (menos del 2% de la dosis materna). No se han descrito efectos adversos en bebés
lactantes.", text_emb:"Analgésico de elección durante todo el embarazo. Se puede usar en los
tres trimestres a dosis habituales. Consultar al médico si se necesita más de unos pocos días
seguidos.", interactions:"Warfarina (potencia efecto anticoagulante con uso prolongado)",
sources:"LactMed, e-lactancia" },
  { inn:"Ibuprofeno", trade:"Nurofen, Bexifen, Espidifen, Dalsy", category:"Analgésico /
Antiinflamatorio (AINE)", safety_lm:&img alt="green circle icon" data-bbox="298 873 325 890"/> Seguro, safety_emb:&img alt="yellow circle icon" data-bbox="298 873 325 890"/> Precaución — evitar T3",
trimestres:"T1, T2 (evitar T3)", text_lm:"Compatible con la lactancia. Cantidad que pasa a la leche
muy baja. Uno de los antiinflamatorios preferidos en madres lactantes.", text_emb:"Evitar en el
tercer trimestre (semana 28+): puede afectar al riñón del bebé y cerrar prematuramente el ductus

```

arterioso. En T1 y T2 usar a dosis mínima el menor tiempo posible.", interactions:"AAS, corticoides, anticoagulantes, litio", sources:"LactMed, AEMPS, e-lactancia" },
 { inn:"Metamizol", trade:"Nolotil, Lasain, Metalgial", category:"Analgésico / Antipirético",
 safety_lm:"⚠️ Precaución", safety_emb:"⚠️ Precaución — evitar T3", trimestres:"Evitar T3",
 text_lm:"Riesgo teórico de agranulocitosis en el bebé. Primera opción: paracetamol. Si el médico lo considera necesario, uso puntual aceptable.", text_emb:"No es la primera opción. Evitar en T3 por riesgo de cierre del ductus. Usar solo si otros analgésicos son insuficientes, bajo prescripción.", interactions:"Ciclosporina, metotrexato", sources:"e-lactancia, AEMPS" },
 { inn:"Ácido acetilsalicílico", trade:"Aspirina, AAS, Adiro", category:"Analgésico / Antiagregante / AINE", safety_lm:"⚠️ Precaución según dosis", safety_emb:"⚠️ Precaución — depende de dosis", trimestres:"Dosis baja T1-T3; evitar dosis analgésica en T3", text_lm:"A dosis analgésicas desaconsejado (riesgo síndrome de Reye). A dosis bajas antiagregantes (75–150 mg) es compatible bajo control médico.", text_emb:"A dosis bajas indicado en embarazos de riesgo (preeclampsia). A dosis analgésicas evitar especialmente en T3.", interactions:"Anticoagulantes, ibuprofeno, corticoides, metotrexato", sources:"LactMed, AEMPS, e-lactancia" },
 { inn:"Amoxicilina", trade:"Amoxicilina Normon, Clamoxyl, Ardine", category:"Antibiótico (penicilina)", safety_lm:"✅ Seguro", safety_emb:"✅ Seguro", trimestres:"T1, T2, T3",
 text_lm:"Compatible con la lactancia. Cantidades en leche muy pequeñas. Puede alterar ligeramente la flora del bebé (heces blandas) sin representar riesgo real.", text_emb:"Antibiótico de primera elección en el embarazo. Sin efectos teratogénicos conocidos. Uso en los tres trimestres bajo prescripción.", interactions:"Anticoagulantes orales, metotrexato", sources:"LactMed, e-lactancia, AEMPS" },
 { inn:"Amoxicilina/clavulánico", trade:"Augmentine, Clavumox, Duonasa", category:"Antibiótico (penicilina + inhibidor β-lactamasa)", safety_lm:"✅ Seguro", safety_emb:"⚠️ Precaución — ver contexto", trimestres:"Precaución en amenaza de parto prematuro", text_lm:"Compatible con la lactancia. Puede causar heces blandas o candidiasis oral en el bebé. No interrumpir lactancia.", text_emb:"Precaución en amenaza de parto prematuro: asociado a mayor riesgo de enterocolitis necrotizante. En embarazos a término, sin esa preocupación.", interactions:"Anticoagulantes, metotrexato, alopurinol", sources:"LactMed, e-lactancia, AEMPS" },
 { inn:"Azitromicina", trade:"Zitromax, Hemomycin, Vinzam", category:"Antibiótico (macrólido)",
 safety_lm:"✅ Seguro", safety_emb:"✅ Seguro", trimestres:"T1, T2, T3", text_lm:"Compatible con la lactancia. Buena alternativa en alérgicas a penicilina.", text_emb:"Sin efectos teratogénicos conocidos. Alternativa habitual en alérgicas a penicilina.", interactions:"Warfarina, digoxina, ergotamina, antiácidos (reducen absorción)", sources:"LactMed, e-lactancia, AEMPS" },
 { inn:"Cefalexina", trade:"Keflex, Cefalexina Normon", category:"Antibiótico (cefalosporina 1ª gen.)", safety_lm:"✅ Seguro", safety_emb:"✅ Seguro", trimestres:"T1, T2, T3",
 text_lm:"Compatible con la lactancia. Cantidades en leche mínimas. Buena opción en mastitis, infecciones urinarias o cutáneas.", text_emb:"Sin efectos teratogénicos conocidos. Buena opción para infecciones urinarias, cutáneas o dentales.", interactions:"Probenecid, anticoagulantes orales", sources:"LactMed, e-lactancia, AEMPS" },
 { inn:"Metronidazol", trade:"Flagyl, Metronidazol Normon", category:"Antibiótico / Antiparasitario", safety_lm:"⚠️ Precaución según dosis", safety_emb:"⚠️ Precaución — evitar T1 a dosis altas", trimestres:"Evitar T1 a dosis altas", text_lm:"A dosis única (2g) algunos expertos recomiendan interrumpir lactancia 12–24h. A dosis habituales (250–500 mg/8h) mayoría de fuentes lo considera compatible.", text_emb:"Evitar en T1 a dosis altas. En T2 y T3 usar cuando indicado (vaginosis, tricomoniasis) bajo prescripción.", interactions:"Alcohol (efecto disulfiram), warfarina, litio, ciclosporina", sources:"LactMed, e-lactancia, AEMPS" },
 { inn:"Loratadina", trade:"Clarityne, Loratadina Normon", category:"Antihistamínico (2ª generación)", safety_lm:"✅ Seguro", safety_emb:"✅ Seguro", trimestres:"T1, T2, T3",
 text_lm:"Antihistamínico de primera elección en lactancia. Cantidades en leche mínimas. No produce sedación en el bebé.", text_emb:"Antihistamínico preferido en el embarazo. Sin efectos teratogénicos conocidos. Útil en rinitis alérgica gestacional.", interactions:"Ketoconazol, eritromicina (aumentan niveles levemente)", sources:"LactMed, e-lactancia, AEMPS" },
 { inn:"Cetirizina", trade:"Zyrtec, Alerlisin, Reactine", category:"Antihistamínico (2ª generación)",
 safety_lm:"✅ Seguro", safety_emb:"✅ Seguro", trimestres:"T1, T2, T3", text_lm:"Compatible con la lactancia. No produce sedación significativa. Buena alternativa a loratadina.",

text_emb:"Sin efectos teratogénicos conocidos. Junto con loratadina, opción preferida para alergias en el embarazo.", interactions:"Depresores del SNC (sedación leve), teofilina", sources:"LactMed, e-lactancia, AEMPS" },

{ inn:"Dexclorfeniramina", trade:"Polaramine", category:"Antihistamínico (1ª generación)", safety_lm:"⚠️ Precaución", safety_emb:"⚠️ Precaución — evitar T3 tardío", trimestres:"Evitar T3 tardío", text_lm:"Puede causar sedación en el bebé. Preferir loratadina o cetirizina. Uso puntual no es motivo de alarma.", text_emb:"Evitar en T3 tardío: depresión respiratoria neonatal o síndrome de abstinencia en el recién nacido.", interactions:"Alcohol, sedantes, IMAO (contraindicado)", sources:"LactMed, e-lactancia, AEMPS" },

{ inn:"Omeprazol", trade:"Losec, Omeprazol Normon, Belfa", category:"Inhibidor bomba de protones (IBP)", safety_lm:"✅ Seguro", safety_emb:"✅ Seguro", trimestres:"T1, T2, T3", text_lm:"Compatible con la lactancia. Se destruye en estómago ácido del bebé y no se absorbe significativamente. IBP más estudiado en lactancia.", text_emb:"No es teratogénico. IBP con más datos de seguridad en el embarazo. Útil en reflujo gestacional.", interactions:"Clopidogrel (reduce efecto antiagregante), metotrexato, atazanavir", sources:"LactMed, e-lactancia, AEMPS" },

{ inn:"Domperidona", trade:"Motilium, Domperidona Normon", category:"Procinético / Antiemético", safety_lm:"⚠️ Precaución", safety_emb:"⚠️ Precaución — evitar T1", trimestres:"Evitar T1", text_lm:"Aumenta prolactina. Riesgo teórico de arritmia en el bebé a dosis altas. No usar sin valoración médica.", text_emb:"Evitar en T1. En T2–T3 uso puntual bajo prescripción. AEMPS limita su uso por riesgo cardiovascular.", interactions:"Antifúngicos azólicos, macrólidos, antiarrítmicos (riesgo QT)", sources:"e-lactancia, AEMPS, EMA" },

{ inn:"Loperamida", trade:"Fortasec, Imodium", category:"Antidiarreico", safety_lm:"✅ Seguro", safety_emb:"⚠️ Precaución", trimestres:"Evitar T1, precaución T3", text_lm:"Pasa muy poco a la leche. Sin efectos adversos descritos en lactantes. Uso puntual para diarrea aguda.", text_emb:"Evitar en T1. En T2 uso puntual. En T3 precaución a dosis altas. Nunca en diarrea con fiebre o sangre sin evaluación médica.", interactions:"Quinidina, ritonavir (aumentan niveles)", sources:"LactMed, e-lactancia, AEMPS" },

{ inn:"Metoclopramida", trade:"Primperán, Metoclopramida Normon", category:"Antiemético / Procinético", safety_lm:"⚠️ Precaución", safety_emb:"✅ Seguro", trimestres:"T1, T2, T3", text_lm:"Aumenta prolactina. Pasa a la leche en cantidades moderadas. Puede causar irritabilidad o somnolencia en el bebé con uso prolongado. Uso breve aceptable bajo supervisión.", text_emb:"Sin efectos teratogénicos. Opción para náuseas/hiperemesis gravídica. Los tres trimestres bajo prescripción.", interactions:"Anticolinérgicos, opioides, antipsicóticos (riesgo extrapiramidal)", sources:"LactMed, e-lactancia, AEMPS" },

{ inn:"Ibuprofeno tópico", trade:"Dolocyl gel, Nurofen gel, Dolgit", category:"Analgésico tópico (AINE)", safety_lm:"✅ Seguro", safety_emb:"⚠️ Precaución — evitar T3", trimestres:"Evitar T3", text_lm:"Absorción sistémica muy baja. Cantidad en leche insignificante. Evitar aplicar cerca del pezón.", text_emb:"Evitar en T3 por precaución (igual que oral). En T1 y T2 uso puntual en zonas pequeñas.", interactions:"Mínimas. Precaución con anticoagulantes en grandes superficies.", sources:"LactMed, e-lactancia, AEMPS" },

{ inn:"Dexametasona", trade:"Fortecortin, Dexametasona Normon, Decadron", category:"Corticoide sistémico", safety_lm:"⚠️ Precaución", safety_emb:"⚠️ Depende de dosis y contexto", trimestres:"Precaución T1; indicado semanas 24–34 (maduración pulmonar)", text_lm:"Con dosis bajas y uso puntual el riesgo es mínimo. Dosis altas/prolongadas: posible supresión del eje hormonal del lactante.", text_emb:"Evitar dosis altas en T1. En semanas 24–34 indicado para maduración pulmonar fetal en riesgo de parto prematuro: tratamiento establecido y beneficioso.", interactions:"AINE (riesgo GI), diuréticos, antidiabéticos, vacunas vivas", sources:"LactMed, e-lactancia, AEMPS" },

{ inn:"Fluconazol", trade:"Diflucan, Fluconazol Normon, Zoltec", category:"Antifúngico (azol)", safety_lm:"⚠️ Precaución según dosis", safety_emb:"⚠️ Evitar T1 a dosis altas", trimestres:"Evitar T1 (dosis altas); precaución T2–T3", text_lm:"A dosis única 150 mg (candidiasis vaginal) exposición del bebé baja y generalmente aceptada. En tratamientos prolongados, consultar.", text_emb:"Evitar en T1 a dosis altas (riesgo malformaciones con 400–800 mg/día). A dosis única 150 mg el riesgo es menor. Preferir alternativas tópicas (clotrimazol) siempre que sea posible.", interactions:"Warfarina, estatinas, fenitoína, ciclosporina, domperidona (QT)", sources:"LactMed, e-lactancia, AEMPS, EMA" },

```
{ inn:"Hierro (sulfato ferroso)", trade:"Tardyferon, Ferrogradumet, Ferrograd, Ferplex",
category:"Suplemento mineral / Antianémico", safety_lm:" Seguro", safety_emb:" Seguro y
frecuentemente necesario", trimestres:"T1, T2, T3", text_lm:"Completamente seguro. El hierro en
leche se regula independientemente de la ingesta materna. Corregir anemia mejora el bienestar
general.", text_emb:"Seguro y frecuentemente necesario. La demanda de hierro aumenta en T2 y
T3. Tomar en ayunas o con vitamina C para mejor absorción.", interactions:"Antiácidos, IBP,
calcio, tetraciclinas, quinolonas, levotiroxina (reducen absorción — separar 2h)",
sources:"LactMed, OMS, AEMPS, SEGO" }
```

```
];
```

```
const DB_TEXT = DB.map(d =>
`[${d.inn}] | ${d.trade} | ${d.category}]
LM: ${d.safety_lm} — ${d.text_lm}
EMB: ${d.safety_emb} — ${d.text_emb}
Interacciones: ${d.interactions}
Fuentes: ${d.sources}`
).join("\n\n");
```

```
// — STATE
```

```
let situation = 'lm';
let conversationHistory = [];
let isLoading = false;
```

```
const SITUATION_LABELS = {
  lm: 'lactancia materna',
  emb: 'embarazo',
  both: 'lactancia materna y embarazo'
};
```

```
function setSituation(s, el) {
  situation = s;
  document.querySelectorAll('.sit-btn').forEach(b => b.classList.remove('active'));
  el.classList.add('active');
}
```

```
// — SYSTEM PROMPT
```

```
function buildSystemPrompt() {
  return `Eres FarmaMamá, una farmacéutica clínica experta en medicamentos durante el
embarazo y la lactancia materna. Trabajas para una aplicación española dirigida a madres.
```

Tu misión: responder de forma clara, cálida y sin tecnicismos sobre la seguridad de medicamentos. La usuaria es una madre española, no una profesional médica.

CONTEXTO ACTUAL: La usuaria está en situación de: \${SITUATION_LABELS[situation]}.

BASE DE DATOS DE MEDICAMENTOS (usa esta información como fuente primaria):
\${DB_TEXT}

INSTRUCCIONES DE RESPUESTA:

1. Responde SIEMPRE en español, con tono cálido y cercano (como una farmacéutica de confianza, no un robot).
2. Sé concisa: máximo 150–200 palabras por respuesta. Sin introducciones largas.
3. Estructura tu respuesta así cuando sea relevante:
 - Veredicto claro al inicio:  Seguro /  Con precaución /  Evitar
 - Explicación breve en 2–3 frases

- Si hay condición importante (trimestre, dosis), menciónala
 - Si hay alternativa más segura, sugiérrela
4. Si preguntan por un medicamento que NO está en tu base de datos, dilo honestamente y sugiere consultar e-lactancia.org o AEMPS.
 5. Si preguntan por combinaciones de medicamentos, analiza cada uno y comenta si hay interacciones relevantes.
 6. SIEMPRE termina recordando en 1 frase que consulten a su médico o farmacéutico para casos específicos.
 7. NO uses listas largas. Párrafos cortos. Lenguaje humano.
 8. Si la pregunta no es sobre medicamentos en embarazo/lactancia, redirige amablemente al tema.`;

// — CHAT LOGIC

```
function autoResize(el) {
  el.style.height = 'auto';
  el.style.height = Math.min(el.scrollHeight, 120) + 'px';
}
```

```
function handleKey(e) {
  if (e.key === 'Enter' && !e.shiftKey) {
    e.preventDefault();
    sendMessage();
  }
}
```

```
function sendQuick(text) {
  document.getElementById('userInput').value = text;
  sendMessage();
}
```

```
function newChat() {
  conversationHistory = [];
  const messages = document.getElementById('messages');
  messages.innerHTML = `
    <div class="welcome" id="welcome">
      <span class="welcome-icon">👩🏻‍⚕️</span>
      <h2>Hola, soy tu <em>farmacéutica virtual</em></h2>
      <p>Puedes preguntarme sobre cualquier medicamento durante el embarazo o la lactancia. Te
explicaré si es seguro, qué precauciones tener y qué alternativas existen — en lenguaje claro, sin
tecnicismos.</p>
      <div class="welcome-examples">
        <div class="example-card" onclick="sendQuick('Me duele la cabeza y estoy dando el pecho.
¿Puedo tomar algo?')">
          <strong>💊 Dolor / Fiebre</strong>
          Me duele la cabeza y estoy dando el pecho. ¿Puedo tomar algo?
        </div>
        <div class="example-card" onclick="sendQuick('Tengo una infección urinaria en el
embarazo. ¿Qué antibiótico es seguro?')">
          <strong>🦠 Infección</strong>
          Tengo una infección urinaria en el embarazo. ¿Qué antibiótico es seguro?
        </div>
        <div class="example-card" onclick="sendQuick('¿Puedo tomar Nurofen gel para el dolor de
espalda en el tercer trimestre?')">
          <strong>🌿 Tópicos</strong>
          ¿Puedo tomar Nurofen gel para el dolor de espalda en el tercer trimestre?
        </div>
      </div>
    </div>`
}
```

```

    </div>
    <div class="example-card" onclick="sendQuick('Estoy tomando amoxicilina y omeprazol.
¿Son compatibles entre sí durante la lactancia?')">
      <strong>⚠ Combinaciones</strong>
      Estoy tomando amoxicilina y omeprazol. ¿Son compatibles entre sí en lactancia?
    </div>
  </div>
</div>;
}

```

```

async function sendMessage() {
  if (isLoading) return;
  const input = document.getElementById('userInput');
  const text = input.value.trim();
  if (!text) return;

  // Hide welcome
  const welcome = document.getElementById('welcome');
  if (welcome) welcome.remove();

  // Add user message
  addMessage('user', text);
  input.value = '';
  input.style.height = 'auto';
  conversationHistory.push({ role: 'user', content: text });

  // Show typing
  const typingEl = addTyping();
  isLoading = true;
  document.getElementById('sendBtn').disabled = true;

  try {
    const response = await fetch('https://api.anthropic.com/v1/messages', {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify({
        model: 'claude-sonnet-4-20250514',
        max_tokens: 1000,
        system: buildSystemPrompt(),
        messages: conversationHistory
      })
    });
  };

  const data = await response.json();
  typingEl.remove();

  if (data.error) {
    addMessage('assistant', `Lo siento, ha ocurrido un error: ${data.error.message}`);
    conversationHistory.pop();
  } else {
    const reply = data.content.map(b => b.text || '').join("");
    addMessage('assistant', reply);
    conversationHistory.push({ role: 'assistant', content: reply });
  }
} catch (err) {
  typingEl.remove();
  addMessage('assistant', 'Lo siento, no he podido conectar con el servidor. Por favor, inténtalo de nuevo.');
```



```

isLoading = false;
document.getElementById('sendBtn').disabled = false;
}

function addMessage(role, text) {
  const messages = document.getElementById('messages');
  const div = document.createElement('div');
  div.className = `msg ${role}`;

  const avatar = role === 'user' ? '👤' : '🌿';
  const content = role === 'assistant' ? formatAI(text) : escapeHTML(text);

  div.innerHTML = `
    <div class="msg-avatar">${avatar}</div>
    <div class="msg-bubble">${content}</div>
  `;

  messages.appendChild(div);
  messages.scrollTop = messages.scrollHeight;
  return div;
}

function addTyping() {
  const messages = document.getElementById('messages');
  const div = document.createElement('div');
  div.className = 'msg assistant';
  div.innerHTML = `
    <div class="msg-avatar">🌿</div>
    <div class="typing"><div class="dot"></div><div class="dot"></div><div class="dot"></div></div>
  `;
  messages.appendChild(div);
  messages.scrollTop = messages.scrollHeight;
  return div;
}

function formatAI(text) {
  // Convert markdown-like formatting to HTML
  let html = escapeHTML(text);

  // Bold
  html = html.replace(/\*(.*?)\*/g, '<strong>$1</strong>');

  // Safety emojis → styled badges
  html = html.replace(/✅\s*(Seguro[^\n<]*)/g, '<span class="safety-inline green">✅ $1</span>');
  html = html.replace(/⚠️\s*(Con precaución[^\n<]*)|Precaución[^\n<]*)/g, '<span class="safety-inline yellow">⚠️ $1</span>');
  html = html.replace(/🚫\s*(Evitar[^\n<]*)/g, '<span class="safety-inline red">🚫 $1</span>');

  // Line breaks → paragraphs
  const parts = html.split(/\n\n+/);
  html = parts.map(p => {
    p = p.trim();
    if (!p) return '';
    // Handle single line breaks
  });

```

```
    p = p.replace(/\n/g, '<br>');
    return `<p>${p}</p>`;
  }).filter(Boolean).join('');

  return html;
}

function escapeHTML(str) {
  return str.replace(/&/g, '&amp;').replace(/</g, '&lt;').replace(/>/g, '&gt;').replace(/"/g, '&quot;');
}
</script>
</body>
</html>
```