

Универзитет у Београду  
Математички факултет

Мастер рад

---

# Игра ним

---

**Аутор:**

Марија Мијаиловић

**Ментор:**

Др Миодраг Живковић

Катедра за рачунарство и информатику



Београд, мај 2020

# Садржај

<b>1</b>	<b>Увод</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Ним</b>	<b>1</b>
2.1	Варијане игре ним . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Оптимална стратегија</b>	<b>4</b>
3.1	Рекурзивна стратегија . . . . .	8
3.2	Алгебарска стратегија . . . . .	9
3.3	Аритметичка стратегија . . . . .	10
<b>4</b>	<b>Имплементација и евалуација</b>	<b>14</b>
4.1	Рекурзивна стратегија . . . . .	14
4.2	Алгебарска стратегија . . . . .	15
4.3	Аритметичка стратегија . . . . .	16
4.4	Сумиран приказ времена извршавања свих стратегија . . . . .	18
4.5	Препознавање природе тренутне позиције . . . . .	19
<b>A</b>	<b>Додатак резултатима</b>	<b>22</b>
	<b>Литература</b>	<b>25</b>

# 1 Увод


## 2 Ним

Игра ним је игра са неколико гомила жетона за два играча. Број жетона и гомила је произвољан, тачније одређују их сами играчи. Играч који је на потезу може узети произвољан број жетона са једне гомиле, при чему мора узети бар један жетон и не сме узимати жетоне са више гомила. Играчи наизменично играју потезе. Постоје две варијанте игре: нормални и мизерни ним. У нормалном ниму побеђује играч који узме последњи жетон, док у мизерном губи играч који узме последњи жетон.

**Пример 1.** На почетку партије на столу су три гомиле, са три, четири и пет жетона респективно. Партију играју два играча А и Б, А игра први.

Могући ток игре нормалног нима је приказан на слици 1.

Слика 1: Ток игре ним



У општем случају, уколико се на столу налазе две гомиле, у зависности од броја жетона могући су следећи исходи нормалног нима:

- На столу су две гомиле са по једним жетоном. Први играч мора да узме бар један жетон, чиме оставља другом играчу да узме последњи жетон и победи. У овој ситуацији очигледно је да **први играч гарантовано губи**.
- На столу су две гомиле, на првој један жетон, на другој два жетона. **Први играч има победничку стратегију**: уколико узме један жетон са гомиле где су два жетона (на слици 1 узима 1 плави жетон), оставља следећем играчу две гомиле са по једним жетоном, што је за њега, као што смо видели, изгубљена позиција.
- На столу су две гомиле са по два жетона. Прва могућност јесте да први играч узме све са једне гомиле, чиме други играч истим тим потезом, узимајући све жетоне са друге гомиле

побеђује. Друга могућност је да први играч узме један жетон, тако да је следеће стање игре заправо стање из претходног примера, у коме играч који је на потезу може да победи. У овој ситуацији **први играч губи** уколико други играч зна како да игра ним.

Сада би требало да је јасно да у овој игри нема среће, односно да је свака позиција победничка или изгубљена за играча који је на потезу. Амерички математичар Чарлс Бутон (енг. *Charles Bouton*) је извршио комплетну математичку анализу игре 1902. године, односно одредио је све победничке и изгубљене позиције [2]. Идеја је да се бројеви жетона на свакој гомили запишу у бинарном бројном систему, а затим се примени ексклузивна дисјункција (XOR) бит по бит, тј бинарна сума без преноса.

**Пример 2.** Нека су на столу дате две гомиле са три и четири жетона, тада је њихова бинарна сума без преноса:

$$\begin{array}{r} 3 \\ +4 \\ \hline 7 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 011 \\ 100 \\ \hline 111 \end{array}$$

**Теорема 1.** У нормалном ниму, гарантовано ће победник бити играч након чијег потеза је бинарна сума без преноса жетона на свим гомилама једнака нула.

*Доказ.* Нека играч *A* игра први, играч *B* други. На столу је *n* гомила са редом  $x_1, x_2, \dots, x_n$  жетона, и нека је *s* ексклузивна дисјункција:

$$s = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \dots \oplus x_n.$$

Након што играч *A* одигра свој потез, *t* је ексклузивна дисјункција жетона:

$$t = y_1 \oplus y_2 \oplus y_3 \dots \oplus y_n.$$

Уколико је  $s = 0$ , како се жетони могу узети само са једне гомиле онда је  $x_k \neq y_k$  и  $x_i = y_i$  за  $i \neq k$ , стога је:

$$\begin{aligned} t &= 0 \oplus t \\ &= s \oplus s \oplus t \\ &= s \oplus (x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \dots \oplus x_n) \oplus (y_1 \oplus y_2 \oplus y_3 \dots \oplus y_n) \\ &= s \oplus (x_1 \oplus y_1) \oplus (x_2 \oplus y_2) \oplus \dots \oplus (x_n \oplus y_n) \\ &= s \oplus (x_k \oplus y_k). \end{aligned}$$

Уколико је  $s = 0$ , онда је  $t \neq 0$  јер важи  $x_k \neq y_k$  и  $x_k \oplus y_k$  никад неће бити нула. Овим је доказано да уколико је тренутна бинарна сума без преноса нула, шта год противник одиграо сума ће бити различита од нула.

Уколико је  $s \neq 0$ , нека је *d* позиција бита највеће тежине у *s* и нека је  $x_k$  гомила у којој је бит највеће тежине такође на позицији *d*, овакав бит увек постоји, јер бит највеће тежине из *s* долази од бита највеће тежине неких од гомила са  $x_1, x_2, \dots, x_n$  жетона. У овом случају са гомиле  $x_k$  узима се  $x_k - y_k$  жетона, где је  $y_k = s \oplus x_k$ , тако да је бинарна сума без преноса:

$$\begin{aligned} t &= s \oplus x_k \oplus y_k \\ &= s \oplus x_k \oplus s \oplus x_k \\ &= s \oplus s \oplus x_k \oplus x_k \\ &= 0 \end{aligned}$$

Овим је доказано да уколико тренутна бинарна сума без преноса није нула, увек је могуће направити потез тако да бинарна сума без преноса буде нула.

□

За мизерни ним се може пратити иста стратегија као у теорему 1 све док не остану само гомиле са по једним жетоном. Тада је победа гарантована ако играч који је на потезу остави непаран број гомила са по једним жетоном.

**Пример 3.** Нека су на столу дате три гомиле са седам, пет, дванаест жетона. Играч А игра први, играч Б игра други.

7	111
5	101
+12	1100
---	-----
24	1110

У 1110 бит највеће тежине је на позицији три, тако да играч А узима са треће гомиле  $1100 - (1100 \oplus 1110) = 12 - 2 = 10$  жетона.

7	111
5	101
+2	10
---	-----
14	000

Б узима са друге гомиле два жетона.

7	111
3	11
+2	10
---	-----
12	110

А узима са прве гомиле шест жетона.

1	1
3	11
+2	10
---	-----
6	00

Б узима са треће гомиле један жетон.

1	1
3	11
+1	1
---	-----
5	11

А узима са друге гомиле три жетона.

1	1
+1	1
---	-----
2	0

Б узима са прве гомиле један жетона.



А узима последњи жетон и побеђује.

## 2.1 Варијане игре ним

Постоје многе варијанте нима [6], које се од оригиналне верзије углавном разликују по томе што садрже бар једно додатно правило за игру. Неке од варијанти су:

- **Индекс  $k$  игра** (енг. *Index- $k$  nim*) у којој је дозвољено да играч у једном потезу узме жетоне са више гомила.
- **Грандијева игра** (енг. *Grundy's game*) се игра са једном гомилом жетона, где је једини дозвољен потез дељење текуће гомиле на две гомиле са различитим бројем жетона. Игра се завршава када остану гомиле са два или мање жетона.
- **Похлепни ним** (енг. *em Greedy nim*) у којој је дозвољено узимање жетона само са најбројније гомиле, а уколико је више таквих гомила онда је дозвољено узимање са произвољне најбројније гомиле.
- **Градитељски ним** (енг. *Building nim*) која се игра у две фазе. У првој фази играчи наизменично на  $n$  гомила распоређују  $p$  жетона, прво на гомиле без елемената, ова фаза се завршава када се распореде сви жетони. У другој фази се игра нормални ним.
- **Витховофа игра** (енг. *Wythoff's game*) [7] се игра са две гомиле жетона; играчи наизменично узимају жетоне са једне или обе гомиле. Приликом узимања жетона са обе гомиле, рецимо  $k(> 0)$  са једне и  $l(> 0)$  са друге, мора да буде испуњен услов  $|k - l| < a$ , где је  $a$  задати позитиван број који се одређује пре почетка партије и не мења се у току саме партије. Игра се завршава када број жетона на столу буде нула, а онај играч који је уклонио последњи жетон или жетоне је победник. Сваки играч када је на потезу мора да уклони бар један жетон. У класичној Витхоф игри  $a$  је 1, што значи да ако играч узима жетоне са обе гомиле, број узетих жетона мора бити једнак. Игра се еквивалентно може описати и као игра са краљицом на шаховској табли: негде на шаховској табли је краљица, играч који је на потезу може да помери краљицу произвољан број корака у правцу југа, запада, или југозапада. Победник је играч који први помери краљицу у доњи леви угао табле [1, 5]. Забележено је да се ова игра играла у Кини под именом "捡石子 jiǎn shízi", односно енгл. *picking stones* [8]. Холандски математичар В. А. Витхоф (W. A. Wythoff) је 1907. године објавио математичку анализу ове игре. [7]

## 3 Оптимална стратегија

Све позиције се елементарно могу одредити типови позиција, било која позиција се може представити паром бројева  $(x, y)$ , где је  $x \leq y$ . Овде  $x$  и  $y$  представљају бројеве жетона на две гомиле или координате позиције краљице (при чему су координате доњег левог угла  $(0, 0)$ ). Све могуће позиције могу се разврстати у две категорије, добијене и изгубљене.

**Дефиниција 1.** У изгубљеној позицији, играч који је на потезу губи ако противник игра како треба, другим речима наредни играч може да победи шта год одиграо противник. У добијеној позицији, играч који је на потезу побеђује ако игра како треба.

Класификација позиција на добијене и изгубљене се дефинише рекурзивно на следећи начин:

1.  $(0, 0)$  је по дефиницији изгубљена позиција јер играч који је на потезу не може да одигра ниједан валидан потез, па је његов противник победник.
2. Било која позиција из које је у једном потезу достижна изгубљена позиција је добијена позиција.

3. Ако сваки потез води ка некој добијеној позицији, онда је то изгубљена позиција.

*Jasno je da je pozicija  $(x,x)$  dobijena ako je  $x>0$ . Dalje, ako su  $(x',y')$ ,  $x'<y'$ , i  $(x'',y'')$ ,  $x''<y''$ , dve izgubljene pozicije, onda je  $\{x',y'\}\cap\{x'',y''\}=\emptyset$ : ako je npr.  $y'=x''$ , onda se iz izgubljene pozicije  $(x'',y'')$  skidanjem sa jedne gomile moze doci u poziciju  $(y''-(y''-x'),x'')=(x',y')$  koja je izgubljena za protivnika, sto je kontradikcija.*

Да би се Витхофова игра играла на најбољи могући начин, потребно је знати две ствари:

- Препознати природу тренутне позиције, да ли је добијена или изгубљена.
- Уколико је тренутна позиција добијена, треба одредити следећи потез тако да се противник нађе у изгубљеној позицији.


Класификација позиција на добијене и изгубљене је важна, јер ако је тренутна позиција добијена, постоји потез који води ка изгубљеној позицији, а тај потез се може одредити и победити. Са друге стране ако је тренутна позиција изгубљена не може се урадити ништа, само одиграти произвољан валидан потез и надати се да ће противник да одигра погрешан потез, с обзиром на то да се у једном потезу са изгубљене позиције стиже на добијену позицију, са које противник може да победи ако зна да одреди изгубљену позицију.

**Пример 4.** За  $a = 1$ , позиција  $(1,2)$  је изгубљена позиција, зато што су са ње у једном потезу достижне само позиције  $(0,1)$ ,  $(0,2)$ ,  $(1,0)$  и  $(1,1)$ , које су добијене позиције. Још неке изгубљене позиције приказане су у табели 1 и на слици 3 црвена поља су добијене позиције.

Табела 1: Приказ првих 10 изгубљених  $(A,B)$  позиција за  $a = 1$

n	A	B
0	0	0
1	1	2
2	3	5
3	4	7
4	6	10
5	8	13
6	9	15
7	11	18
8	12	20
9	14	23
10	16	26

Слика 2: Визуелни приказ изгубљених позиција за  $a = 1$




**Пример 5.** За  $a = 2$ , изгубљене позиције приказане су у табели 2 и на слици ?? црвена поља су добијене позиције.

Табела 2: Приказ првих 10 изгубљених  $(A, B)$  позиција за  $a = 2$

<b>n</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
0	0	0
1	1	3
2	2	6
3	4	10
4	5	13
5	7	17
6	8	20
7	9	23
8	11	27
9	12	30
10	14	34



Слика 3: Визуелни приказ изгубљених позиција за  $a = 2$




**Пример 6.** На столу је табела  $10 \times 10$ , на позицији  $(0,0)$  је циљ. Игру играју два играча А и Б, померајући наизменично краљицу од почетне позиције  $(x,y)$ . Дозвољено је краљицу померати ка југу, југозападу и западу у односу на текућу позицију. Победник је играч који први доведе краљицу до циља. На табли су све позиције  $(x,y)$ , а не само  $x \leq y$ .

Играч А игра први, Б други. На слици 4 је дат приказ изгубљених позиција (зелена поља) и како се до њих може доћи (плаве и црвене стреле). Уколико је краљица на позицији  $(0,y)$ ,  $(x,0)$  или  $(x,x)$ , при чему је  $x > 0, y > 0$ , играч А уколико игра како треба у једном потезу може довести краљицу до циља и победити. Уопште, уколико је краљица на позицији, из које се плавом или црвеном стрелицом може прећи у зелено поље, играч А може краљицу једним потезом довести до изгубљене позиције, са које су достижне само добијене позиције и са којих играч А може директно довести краљицу до циља или је померити на неку од преосталих изгубљених позиција ближих циљу. Уколико из тренутне позиције ниједан валидан потез не води до зеленог поља, онда је та позиција изгубљена.

Са позиције  $(4,9)$  може се доћи само на позиције покривене плавим или црвеним стрелицама. Због тога је та позиција изгубљена.

Слика 4: Приказ изгубљених позиција на табли  $10 \times 10$  за  $a = 2$



Свака позиција је добијена или изгубљена, лако се види како се, корак по корак, за сваку позицију може установити тип. У наставку следи приказ три начина да се одреде типови свих позиција: рекурзивна, алгебарска или аритметичка стратегија [4].

### 3.1 Рекурзивна стратегија

Рекурзивни поступак за одређивање изгубљених позиција заснива се на оператору  $\text{mex}$ .

**Дефиниција 2.**  $\text{mex}(A)$  означава најмањи природни број који није у скупу  $A$ , тј.  $\text{mex}(\emptyset) = 0$  и  $\text{mex}(A) = \min\{i | i \notin A\}$ .

Описани начин добијања изгубљених позиција  $(A_n, B_n)$ , може се поједноставити, што показује следећа теорема.

**Теорема 2** (Рекурзивна карактеризација изгубљених позиција). Нека је

$$A_n = \text{mex}\{A_i, B_i : i < n\} \quad (1)$$

$$B_n = A_n + an \quad (2)$$

Тада је скуп свих изгубљених позиција  $P = \cup_{i=0}^{\infty} \{(A_i, B_i)\}$ .

**Доказ.** Из дефиниција  $A_n$  и  $B_n$  датих у теорему важи да ако је  $A = \cup_{n=1}^{\infty} A_n$  и  $B = \cup_{n=1}^{\infty} B_n$  онда су  $A_n$  и  $B_n$  **комплементарни** скупови, тако да је  $A \cup B = \mathbb{Z}^+$  скуп целих позитивних бројева и  $A \cap B = \emptyset$ .  $A \cup B = \mathbb{Z}^+$  важи јер због дефиниције 2 ниједан број не може бити испуштен, а  $A \cap B = \emptyset$  јер у случају да је  $A_n = B_m$ , и  $n > m$ , следи да је  $A_n$   $\text{mex}$  скупа који садржи  $B_m = A_n$  што је у супротности са дефиницијом 2. Случај када је  $n \leq m$  је немогућ јер је тада  $B_m = A_m + am \geq A_n + an > A_n$ .

Да би се доказала теорема остаје да се докаже да се из неке позиције  $(A_n, B_n)$  не може доћи у неку претходну позицију  $(A_i, B_i)$ ,  $i < n$ , и да се из ове позиције једним потезом може прећи само у (за противника) добијене позиције.

Из изгубљене позиције, једним потезом може се прећи само у добијену позицију. Из позиције  $(A_n, B_n)$  узимањем жетона само са једне гомиле прелази се у другу позицију, нова позиција не може бити облика  $(A_i, B_i)$ . Ово следи из чињенице да су  $A_n$  и  $B_n$  комплементарни скупови. Уколико узима жетоне са обе гомиле такође прелази у позицију која није облика  $(A_i, B_i)$ . У противном би за нову позицију  $(A_i, B_i)$ , морало би да важи  $|(B_n - B_i) - (A_n - A_i)| < a$ . Међутим из једнакости  $B_n - A_n = an$  следи  $|(n - i)a| < a$ , што је тачно само ако је  $i = n$ , што је контрадикција.

Из добијене позиције, једним потезом може се прећи у изгубљену позицију. Размотримо позиције у које се може прећи из позиције  $(x, y)$ ,  $x \leq y$  која није облика  $(A_i, B_i)$ ,  $i \geq 0$ . Како су  $A_n$  и  $B_n$  комплементарни скупови, може се сматрати да је  $x = B_n$ , или је  $x = A_n$ , за неко  $n \geq 0$ .

- Случај 1: Ако је  $x = B_n$  онда се из позиције  $(x = B_n, y)$  може једним потезом прећи у изгубљену позицију  $(A_n, B_n)$
- Случај 2: Ако је  $x = A_n$  и  $y > B_n$ , онда се смањивањем  $y$  може доћи у позицију  $(A_n, B_n)$ . У противном, ако је  $A_n \leq y < B_n$  онда се смањивањем  $x$  и  $y$  може прећи у позицију  $(A_m, B_m)$ , где је  $m = \lfloor \frac{d}{a} \rfloor$  и  $d = y - x$ . Заиста, из  $d = y - A_n < B_n - A_n = an$ , следи да је  $m = \lfloor \frac{d}{a} \rfloor \leq \frac{d}{a} < n$ . Поред тога важи неједнакост  $y = A_n + d \geq A_m + am = B_m$ . Из позиције  $(x, y)$  смањивањем обе компоненте прелази се у позицију  $(A_m, B_m)$ , при чему за смањење компоненти важи неједнакост  $|(y - B_m) - (x - A_m)| = d - am < a$ .

□

**primer - objasnjenje dobijanja nekoliko brojeva u tabeli 2.**

Objasnjenje sta je strategija igre iz rada, dosta je dobra. Malo se prekalapa sa prethodnim, pa je potrebno uskladjivanje.

Ocena slozenosti  $O(\log x)$  za odredjivanje poteza iz pozicije  $(x, y)$

### 3.2 Алгебарска стратегија

Изгубљене позиције  $(A_n, B_n)$  могу се експлицитно изразити на следећи једноставан начин  $A_n = \lfloor \alpha n \rfloor$ ,  $B_n = \lfloor \beta n \rfloor$ , где је:

$$\alpha = \frac{2 - a + \sqrt{a^2 + 4}}{2} \quad (3)$$

$$\beta = \alpha + a \quad (4)$$

Овде су  $\alpha$  и  $\beta$  ирационални за свако  $a > 0$ , и  $\alpha$  је позитиван корен једначине  $\alpha^{-1} + \beta^{-1} = 1$ . Из ове једнакости следе неједнакости:  $1 < \alpha < 2$ : због  $\beta^{-1} = (\alpha + a)^{-1} < \frac{1}{2}$  мора да буде  $\alpha^{-1} > \frac{1}{2}$ .

Ако је  $\alpha$  произвољан ирационални број, онда се целобројни растући низ  $(\lfloor \alpha 0 \rfloor, \lfloor \alpha 1 \rfloor, \dots, \lfloor \alpha n \rfloor)$  зове Бетијев низ (енг. *Beatty*), где  $i = 0 \dots n$ .

Најпре следи доказ општег тврђења о Бетијевим низовима.

**Лема 1.** Нека су  $\alpha$  и  $\beta$  позитивни ирационални бројеви који задовољавају  $\alpha^{-1} + \beta^{-1} = 1$  и нека је

$$\begin{aligned} A'_n &= \lfloor \alpha n \rfloor \\ B'_n &= \lfloor \beta n \rfloor \\ A' &= \cup_{n=1}^{\infty} \{A'_n\} \\ B' &= \cup_{n=1}^{\infty} \{B'_n\} \end{aligned}$$

Тада су  $A'$  и  $B'$  комплементарни Беатијеви низови.

*Доказ.* Довољно је показати да се тачно један елемент уније  $A'_n \cup B'_n$  налази у интервалу  $[N, N+1)$ , за сваки позитиван број  $N$ , тј. довољно је да одредимо колико има бројева из скупа  $A'_n \cup B'_n$  који су мањи од  $N$ , ако је  $N > 1$ .

Бројева из  $A'_n$  мањих од  $N$  има  $\lfloor \frac{N}{\alpha} \rfloor$ .

Бројева из  $B'_n$  мањих од  $N$  има  $\lfloor \frac{N}{\beta} \rfloor$ .

Сабирањем двоструких неједнакости:

$$\begin{aligned} \frac{N}{\alpha} - 1 &< \lfloor \frac{N}{\alpha} \rfloor < \frac{N}{\alpha} \\ \frac{N}{\beta} - 1 &< \lfloor \frac{N}{\beta} \rfloor < \frac{N}{\beta} \end{aligned}$$

добија се:

$$N - 2 < \lfloor \frac{N}{\alpha} \rfloor + \lfloor \frac{N}{\beta} \rfloor < N$$

Одавде следи да је  $\lfloor \frac{N}{\alpha} \rfloor + \lfloor \frac{N}{\beta} \rfloor = N - 1$ , тј.  $N - 1$  бројева из уније  $A'_n \cup B'_n$  је мање од  $N$ . Слично важи и да је  $N$  бројева из  $A'_n \cup B'_n$  мање од  $N + 1$ . Према томе, тачно  $N - (N - 1) = 1$  елемент те уније припада интервалу  $[N, N + 1)$  и нема дупликата. □

**Лема 2.**  $n = \lfloor \frac{x+1}{\alpha} \rfloor$  (ovo sledi iz dvostruke nejednakosti  $\frac{x}{\alpha} < n < \frac{x+1}{\alpha}$  zbog toga sto je razlika  $\frac{x+1}{\alpha} - \frac{x}{\alpha} < 1$ , a interval duzine manje od 1 moze da sadrzi najvise jedan celi broj)

**Лема 3** (Алгебарска карактеризација изгубљених позиција). Нека су  $\alpha$  и  $\beta$  дефинисани једнакостима (3), (4). Тада је скуп свих изгубљених позиција  $P = \cup_{n=0}^{\infty} \{(\lfloor \alpha n \rfloor, \lfloor \beta n \rfloor)\}$ .

*Доказ.* Уочимо да је  $A'_0 = 0, B'_0 = 0$  и  $B'_n - A'_n = an$ . Такође како су  $A'_n$  и  $B'_n$  растући и комплементарни низови, важи још и да је  $A'_n = \max\{A'_i, B'_i : i < n\}$ . Из ове чињенице индукцијом следи да је  $A'_n = A_n$  и  $B'_n = B_n$  за  $n \geq 0$ .  $\square$

Нека је  $(x, y), x \leq y$  тренутна позиција игре. Тада је  $x = \lfloor n\alpha \rfloor = A_n$ , где је  $n = \lfloor \frac{x+1}{\alpha} \rfloor$  или је  $x = \lfloor n\beta \rfloor = B_n$ , где је  $n = \lfloor \frac{x+1}{\beta} \rfloor$ , видети доказ теореме 2 и леме 2. На пример, ако је  $x = \lfloor n\alpha \rfloor = A_n$ , и  $\lfloor n\alpha \rfloor < y < \lfloor n\beta \rfloor$  онда се смањивањем  $x$  и  $y$  може прећи у позицију  $(\lfloor m\alpha \rfloor, \lfloor m\beta \rfloor)$ , где је  $m = \lfloor \frac{d}{a} \rfloor$  и  $d = y - x$ , при чему за смањење компоненти важи неједнакост  $|(y - \lfloor m\beta \rfloor) - (x - \lfloor m\alpha \rfloor)| = d - am < a$ .

**Пример 7.** У специјалном случају за  $a = 1$  важи  $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ , што је златни пресек.

Низ  $\lfloor \alpha n \rfloor$  се назива доњи Витхофов низ ( $A_n$ ): 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16... Низ  $\lfloor (\alpha + 1)n \rfloor$  се назива горњи Витхофов низ ( $B_n$ ): 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 26...

### 3.3 Аритметичка стратегија

Сваки ирационални број се једнозначно може представити бесконачним верижним разломком. Нека је  $\alpha$  ирационалан број који се може једнозначно представити бесконачним верижним разломком облика:

$$\alpha = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}},$$

односно,

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} [a_0, a_1, a_2, a_3, \dots].$$

Чланови низа  $a_n$  добијају се поступком сличним Еуклидовом алгоритму, тј. број  $\alpha$  одређује низ  $a_n$ . Обрнуто сваки бесконачни верижни развој једнозначно одређује ирационални број. При томе, ако је  $n > 1$ , онда је  $a_n > 1$ .

Рационални бројеви  $a_0, a_0 + \frac{1}{a_1}, a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2}}, a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3}}}$  где је  $a_i > 0$  и  $i > 0$  су конвергенти броја  $\alpha$ .

Конвергенти су веома добре рационалне апроксимације  $\alpha$ . Показује се да ако је  $\alpha$  ирационалан и  $|\alpha - \frac{p_n}{q_n}| < \frac{1}{2q_n^2}$ , где су  $p_n$  и  $q_n$  узајамно прости, онда је  $\frac{p_n}{q_n}$  увек конвергент  $\alpha$ .

$$\frac{p_n}{q_n} = [1, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n]$$

**Лема 4.**  $p$  и  $q$  су низови рекурзивно дефинисани на следећи начин:

$$p_{-1} = 1, p_0 = a_0, p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, (n \geq 1) \quad (5)$$

$$q_{-1} = 0, q_0 = 1, q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}, (n \geq 1). \quad (6)$$

где је  $a_0, a_1, \dots$  јединствени бесконачни низ природних бројева за које важи  $a_0 = 1$  и  $a_1, a_2, \dots$ , су позитивни и  $a_n \neq 1$ .

*Доказ.* Индукцијом

<http://poincare.matf.bg.ac.rs/strane/92-93>  $\square$

. Нека је  $\alpha$  ирационалан број, који задовоља услов  $1 < \alpha < 2$ . Број  $\alpha$  може се једнозначно представити бесконачним верижним разломком:

Specijalno, verizni razvoj broja  $\alpha$  definisanog jednakoscju (??) je  $[1, a, a, a, \dots]$

to bi mogla da bude lema.

dokaz: predlazem da to dokazete direktno, prema postupku za odredjivanje veriznog razvoja. Da biste se bolje snasli, mozete da to uradite prvo za  $a=1$ , pa za  $a=2$ , pa onda za opsti slucaj. Naravno, u dokaz cete da stavite samo opsti slucaj.

// u radu u casopisu on moze da kaze da je nesto poznato. U mater radu vi te stvari morate da dokazete, ako nisu previse komplikovane; a nisu

Низ бројилаца  $p_n$  може се искористити као низ тежина за специјални бројни систем, за који кажемо да је  $p$ -систем. Слично, низ именилаца  $q_n$  може се искористити као низ тежина за други бројни систем, за који кажемо да је  $q$ -систем.

**Теорема 3.** У  $p$ -систему се сваки позитиван природни број  $N$  јединствено може записати на следећи начин:

$$N = \sum_{i=0}^m s_i p_i, 0 \leq s_i \leq a_{i+1} \quad (7)$$

ако је  $s_{i+1} = a_{i+2}$  онда је  $s_i = 0$  за свако  $i \geq 0$ .

Слично важи и за  $q$ -систем :

$$N = \sum_{i=0}^n t_i q_i, 0 \leq t_0 < a_1, 0 \leq t_i \leq a_{i+1} \quad (8)$$

ако је  $t_i = a_{i+1}$  онда је  $t_{i-1} = 0$  за свако  $i \geq 1$ .

Где су  $s_i$ , односно  $t_i$  цифре броја  $N$  у  $p$ -систему, односно  $q$ -систему.

*Доказ.* Дати број  $N$ , где је  $m$  највећа вредност тако да је задовољено  $p_m \leq N$ , може се разложити помоћу низа дељења са остатком на следећи начин:

$$\begin{aligned} N &= s_m p_m + r_m, 0 \leq r_m < p_m \\ r_m &= s_{m-1} p_{m-1} + r_{m-1}, 0 \leq r_{m-1} < p_{m-1} \\ &\vdots \\ r_2 &= s_1 p_1 + r_1, 0 \leq r_1 < p_1 \\ r_1 &= s_0 p_0 \end{aligned}$$

Другим речима, долази се до разлагања броја  $N$  у  $p$ -систему

$$N = \sum_{i=0}^m s_i p_i \quad (9)$$

Приметимо да разлагање (9) важи независно од тога какав је низ  $p_0 = 1 < p_1 < \dots$ . Специјално, ако је  $p_i = b^i, b > 1$ , онда је то уобичајена представа броја  $N$  у систему са основом  $b$ .

Цифре  $s_i$  у разлагању (9) задовољавају следеће услове:

$$s_i = \frac{r_{i+1} - r_i}{p_i} < \frac{r_{i+1}}{p_i} < \frac{p_{i+1}}{p_i} = \frac{a_{i+1} p_i + p_{i-1}}{p_i} = a_{i+1} + \frac{p_{i-1}}{p_i} \leq a_{i+1} + 1,$$

тако да је  $0 \leq s_i \leq a_{i+1}, i \geq 0$ .

Аналогне неједнакости  $0 \leq t_i \leq a_{i+1}$  важе за  $i > 0$ . Међутим, за  $i = 0$  због  $q_{-1} = 0$  добија се:

$$t_0 = \frac{r_1 - r_0}{q_0} \leq \frac{r_1}{q_0} < \frac{q_1}{q_0} = \frac{a_1 q_0 + q_{-1}}{q_0} = a_1,$$

тј. важи строга неједнакост.

Претпоставимо да је  $s_i = a_{i+1}$  и  $s_{i-1} \geq 1$  онда је

$$r_i = s_{i-1}p_{i-1} + r_{i-1} \geq p_{i-1} + r_{i-1} \geq p_{i-1},$$

и даље

$$r_{i+1} = s_i p_i + r_i = a_{i+1} p_i + r_i \geq a_{i+1} p_i + p_{i-1} \geq p_{i+1}$$

што је контрадикција. Према томе, ако је  $s_i = a_{i+1}$  онда је  $s_{i-1} = 0$  за свако  $i \geq 1$  □

**Ovde treba da dodate dokaz jedinstvenosti ovakve reprezentacije, to je bitna stvar.**  
Приказ првих неколико бројева записаних у  $p$  и  $q$  систему, за  $a_i = 2, i \geq 1$  дат је у табели 3.

Табела 3: Приказ првих неколико бројева записаних у  $p$  и  $q$  систему, за  $a_i = 2, i \geq 1$

q3	q2	q1	q0		p3	p2	p1	p0	n
12	5	2	1		17	7	3	1	1
		1	0					2	2
		1	1				1	0	3
		2	0				1	1	4
	1	0	0				1	2	5
	1	0	1				2	0	6
	1	1	0			1	0	0	7
	1	1	1			1	0	1	8
	1	2	0			1	0	2	9
	2	0	0			1	1	0	10
	2	0	1			1	1	1	11
1	0	0	0			1	1	2	12
1	0	0	1			1	2	0	13
1	0	1	0			2	0	0	14
1	0	1	1			2	0	1	15
1	0	2	0			2	0	2	16
1	1	0	0		1	0	0	0	17

**Дефиниција 3.** Репрезентација  $R$  је  $(m+1)$ -торка за коју важи :

$$R = (d_m, d_{m-1}, \dots, d_1, d_0), 0 \leq d_i \leq a_{i+1} \quad (10)$$

ако је  $d_{i+1} = a_{i+2}$  онда је  $d_i = 0$  за свако  $i \geq 0$ .

Нека је

$$I_p = \sum_{i=0}^m d_i p_i$$

$p$ -интерпретација репрезентације  $R$ .

Ако је  $d_0 < a_1$ , нека је

$$I_q = \sum_{i=0}^m d_i q_i$$

$q$ -интерпретација репрезентације  $R$ .

У супротном кажемо да не постоји  $q$ -интерпретација  $R$ .

За сваки позитиван број  $k = \sum_{i=0}^m d_i p_i$  важи да је:

$$R_p(k) = (d_m, d_{m-1}, \dots, d_1, d_0)$$

$p$ -репрезентација  $R_p(k)$ .

Ако је  $d_0 < a_1$  за сваки позитиван број  $k = \sum_{i=0}^m d_i q_i$  важи да је:

$$R_q(k) = (d_m, d_{m-1}, \dots, d_1, d_0)$$

$q$ -репрезентација  $R_q(k)$ .

Веза између  $p$ -интерпретације  $I_p$  и  $q$ -репрезентације  $R_q$  је:

$$I_p(R_q(k)) = I_p(d_m, d_{m-1}, \dots, d_1) = n$$

Уколико у  $R$  померимо сваку цифру  $d_i$  у лево за једно место добијамо  $R' = (d_m, d_{m-1}, \dots, d_1, d_0, 0)$ , а уколико је  $R$  репрезентација са  $d_0 = 0$  онда када сваку цифру  $d_i$  померимо за једно место у десно добијамо  $R'' = (d_m, d_{m-1}, \dots, d_1)$ .

**Пример 8.** Број  $R_q(12) = 1000$ , а  $I_p(1000) = 17$  (видети табелу 3).

Описани  $p$  и  $q$  бројни системи могу се искористити за још један начин добијања изгубљених позиција, користећи следећа својства.

**Својство 1.** Нека је  $n$  позитиван број. Уколико се репрезентација  $R_p(n)$  завршава парним бројем нула онда је  $n \in \{A_k | k > 0\}$  идентична вредности из скупа  $A_n$ , а ако се репрезентација  $R_p(n)$  завршава непарним бројем нула онда је  $n \in \{B_k | k > 0\}$  идентична вредности из скупа  $B_n$ .

Доказ. TODO

□

**Пример 9.** Посматрајући табеле 2 и 3, запажамо да се:

- $R_p(3) = 10$  се завршава са једном нулом (непаран број), па је 3 у низу  $B$ ,  $B_1 = 3$ .
- $R_p(7) = 100$  се завршава са две нуле (паран број), па је 7 у низу  $A$ ,  $A_5 = 7$ .
- $R_p(9) = 102$  се завршава са нула нула (паран број), па је 9 у низу  $A$ ,  $A_7 = 9$ .

**Својство 2.** За свако  $n \geq 1$   $p$  репрезентација броја  $B_n$  одговара левом померају  $p$  репрезентације  $R_p$  броја  $A_n$

$$R_p(B_n) = R'_p(A_n)$$

Доказ. TODO

□

**Пример 10.** Нека је  $n = 3$  тада је  $A_3 = 4$  и  $B_3 = 10$ .

$$\begin{aligned} R_p(B_3) &= R_p(10) = 110, \\ R_p(A_3) &= R_p(4) = 11, \\ R'_p(A_3) &= 110, \end{aligned}$$

видети табеле 2 и 3.

**Својство 3.** Нека је  $n$  позитиван број. Уколико се репрезентација  $R_q(n)$  завршава парним бројем нула онда је:

$$I_p(R_q(n)) = A_n$$

Уколико се репрезентација  $R_q(n)$  завршава непарним бројем нула онда је:

$$I_p(R_q(n)) = A_n + 1$$

Доказ. TODO

□

**Пример 11.** Посматрајући табеле 2 и 3, запажамо да се:

- $R_q(10) = 200$  се завршава са две нуле (паран број), па је  $I_p(200) = 14$ ,  $A_{10} = 14$ .
- $R_q(7) = 110$  се завршава са једном нулом (непаран број), па је  $I_p(110) = 10$ ,  $A_7 + 1 = 9 + 1 = 10$ .

**Treba da dodate dokaze ovih svojstava. Ako nesto zapne, tu sam.**

На основу својстава 1, 2 и 3 може се извршити карактеризација текуће позиције и одредити следећи потез.

Претпоставимо да је текућа позиција  $(x, y)$ ,  $0 < x \leq y$ . Најпре је потребно ирачунати  $R_p(x)$  и проверити да ли се завршава са парним или непарним бројем нула.

- Уколико се  $R_p(x)$  завршава непарним бројем нула, онда је  $x = B_n$ , тако да је победнички потез  $(x, y) \rightarrow (I_p(R_p''(x)), x)$ .
- Уколико се  $R_p(x)$  завршава парним бројем нула, онда је  $x = A_n$ . Ако је  $y > I_p(R_p'(x))$  победнички потез је  $(x, y) \rightarrow (x, I_p(R_p'(x)))$ . У противном, ако је  $y < I_p(R_p'(x))$ , рачунамо  $d = y - x$ ,  $m = \lfloor \frac{d}{a} \rfloor$ . Уколико се  $R_q(m)$  завршава са парним бројем нула, онда је  $A_m = I_p(R_q(m))$ ; у противном се завршава непарним бројем нула и  $A_m = I_p(R_q(m)) - 1$ . У оба случаја победнички потез је  $(x, y) \rightarrow (A_m, A_m + ma)$ .

## 4 Имплементација и евалуација

За сваку стратегију у табели 4 су приказани резултати рачунања П табеле у милисекундама зависно од  $n$ , при фиксном  $a = 2$ . За мерење је коришћена хроно библиотека (енг. *chrono library*) [3]. Сва мерења су извршена на раучунару са следећом конфигурацијом:

CPU: Intel(R) Core(TM) i7-4510U CPU @ 2.00GHz  
RAM: Kingston 8GB 1600MHz DDR3  
OS: Debian GNU/Linux 9 (stretch)  
Compiler: gcc 6.3.0

У табели 5 приказана је зависност парова жетона у односу на  $n$  реда величине до  $10^{31}$ .

### 4.1 Рекурзивна стратегија

За рачунање П табеле рекурзивном стратегијом прво је потребно да израчунамо  $A_i$ , тачније потребно је наћи *mex* (дефиниција (2)). За тражење је коришћен помоћни низ димензије  $2 * n$ , иницијализован нулама. Тражење *mex*-а своди се на проналажење индекса прве нуле, с обзиром да за елементе  $A$  важи  $a \leq 2 * n$  сложеност у најгорем случају је  $O(n)$ . Чиме је укупна временска сложеност конструкције П табеле  $O(n^2)$ .

Код 1: Рекурзивна стратегија рачунање П табеле

```
1 void Recursive::p_positions()
2 {
3     _A.push_back(0);
4     _B.push_back(0);
5
6     vector<int>::size_type c_size = vector<int>::size_type(2*_n+1);
7     _C.resize(c_size, 0);
8
9     for(int i=1; i<=_n; i++){
10         int mex = get_min_positive();
11         _A.push_back(mex);
12         int b = _A.at(vector<int>::size_type(i)) + _a*i;
13         _B.push_back(b);
14         _C.at(vector<int>::size_type(mex)) = mex;
15         if(b <= 2*_n){
16             _C.at(vector<int>::size_type(b)) = b;
17         }
18     }
19 }
20
21 int Recursive::get_min_positive()
```




```

22 {
23     auto it = find(_C.begin()+1,_C.end(),0);
24     return static_cast<int>(distance(_C.begin(), it));
25 }

```

Графички приказ зависности  $n$  и времена у милисекундама дат је на слици 5, за  $a = 2$ .

Слика 5: График рекурзивне стратегије за конструкцију П табеле



## 4.2 Алгебарска стратегија

За разлику од рекурзивне стратегије која користи имплицитну рекурзију, алгебарска стратегија користи експлицитну рекурзију, рачунајући  $\alpha$  и  $\beta$  (дефиниција (??)). Чиме је укупна временска сложеност конструкције П табеле  $O(n)$ .

Код 2: Алгебарска стратегија рачунање П табеле


```

1 void Algebraic::p_positions()
2 {
3     double alpha, beta;
4
5     alpha = (2+_a+sqrt(_a*_a+4))/2;
6     beta = alpha+_a;
7
8     _A.push_back(0);
9     _B.push_back(0);
10
11     for(int i=1;i<=_n;i++){
12         _A.push_back(static_cast<int>(floor(alpha*i)));
13         _B.push_back(static_cast<int>(floor(beta*i)));
14     }
15 }

```

Графички приказ зависности  $n$  и времена у милисекундама дат је на слици 6, за  $a = 2$ .

Слика 6: График алгебарске стратегије за конструкцију П табеле



### 4.3 Аритметичка стратегија

За рачунање П табеле аритметичком стратегијом прво је потребно конструисати једноставан коначан верижни разломак, што захтева  $O(n)$  времена.

Потом дефинишемо низове  $p$  и  $q$ , њихова димензија је највише  $\log(n)$ , стога је време потребно да дефинишемо ове низове  $O(\log(n))$ .

Преостаје још само да  $n$  бројева представимо у  $p$  и  $q$  систему, за њихово представљање у свакој итерацији имамо бинарну претрагу низова  $p$  и  $q$  којом се одређује са колико цифара треба представити број  $i$ , што је у најгорем случају једнако величини низова  $p$  и  $q$ , тачније  $\log(n)$ . Тако да је сложеност бинарне претраге  $O(\log(\log(n)))$ . Репрезентација броја  $k$  у  $p$  или  $q$  систему се добија тако што рачунамо количник и остатак дељења броја  $k$  са одговарајућом вредности низа  $p$  или  $q$ . Уколико имамо остатак потребно је и њега представити у  $p$  или  $q$  систему, његова  $p$  или  $q$  репрезентација је позната тако да је потребно само да је прекопирамо на крај текуће  $p$  или  $q$  репрезентације броја  $k$ , не мењајући притом унапред дефинисан број цифара. Сложеност операције копирања једнака је броју елемената који се копира, што је у најгорем случају  $\log(k) - 1$  цифара. Како имамо  $n$  итерација укупна сложеност представљања првих  $n$  бројева у  $p$  и  $q$  систему захтева  $O(n(\log(\log(n)) + \log(n) - 1))$  времена.

Чиме је укупна временска сложеност конструкције П табеле  $O(n\log(n))$

Код 3: Аритметичка стратегија рачунање П табеле

```

1 void Arithmetic::arithmetic_characterization_of_P_Position()
2 {
3     alpha_continued_fractions();
4     p_q_numerations();
5     p_system_calculation();
6     q_system_calculation();
7 }
8
9 void Arithmetic::alpha_continued_fractions()
10 {
11     _alpha.push_back(1);
12     fill_n(back_inserter(_alpha), _n, _a);
13 }
14
15 void Arithmetic::p_q_numerations()
16 {
17     int __p = 1;
18     int __q = 0;
19     _p.push_back(1);

```

```

20 _p.push_back(_alpha.at(1)*_p.at(0)+_p);
21 _q.push_back(1);
22 _q.push_back(_alpha.at(1)*_q.at(0)+_q);
23 vector<int>::size_type index=2;
24 int memoize = _alpha.at(2)*_p.at(1)+_p.at(0);
25 while(memoize <= _n) {
26     memoize = _alpha.at(index)*_p.at(index-1)+_p.at(index-2);
27     _p.push_back(memoize);
28     _q.push_back(_alpha.at(index)*_q.at(index-1)+_q.at(index-2));
29     index++;
30 }
31 }
32
33 void Arithmetic::p_system_calculation()
34 {
35     vector<int>::size_type size = 0;
36     int index;
37     for(int i = 1; i <= _n; i++){
38         int quotient = 0;
39         int remainder = 0;
40         //if the i is in the p, then initialize the vecor r with size zeors
41         //example: i = 1, 1 is in p[0], r = {0}
42         //           i = 3, 3 is in p[1], r = {0, 0}
43         if(binary_search(_p.begin(), _p.end(), i)){
44             size++;
45             index = i;
46         }
47         vector<int> r(size,0);
48         quotient = i/index;
49         remainder = i%index;
50         r.at(0) = quotient;
51         if(remainder != 0){
52             copy_backward(_p_system[remainder].begin(), _p_system[remainder].end
53                 (), r.end());
54         }
55         _p_system.insert(pair<int, vector<int>>(i, r));
56     }
57 }
58 void Arithmetic::q_system_calculation()
59 {
60     vector<int>::size_type size = 0;
61     int index;
62     for(int i = 1; i <= _n; i++){
63         int quotient = 0;
64         int remainder = 0;
65         //if the i is in the q, then initialize the vecor r with size zeors
66         //example: i = 1, 1 is in q[0], r = {0}
67         //           i = 3, 3 is in q[1], r = {0, 0}
68         if(binary_search(_q.begin(), _q.end(), i)){
69             size++;
70             index = i;
71         }
72         vector<int> r(size,0);
73         quotient = i/index;
74         remainder = i%index;
75         r.at(0) = quotient;
76         if(remainder != 0){

```


```

77     copy_backward(_q_system[remainder].begin(), _q_system[remainder].end
78                 (), r.end());
79     _q_system.insert(pair<int, vector<int>>(i, r));
80 }
81 }

```

Графички приказ зависности  $n$  и времена у милисекундама дат је на 7, за  $a = 2$ .


Слика 7: График аритметичке стратегије за конструкцију П табеле




#### 4.4 Сумиран приказ времена извршавања свих стратегија

Из претходне анализе се може закључити да је алгебарска стратегија најефикаснија, што се може видети и на обједињеним графицима 8 и 9.

Слика 8: Сумиран приказ извршавања свих стратегија за конструкцију П табеле



Слика 9: Сумиран приказ извршавања алгебарске и аритметичке стратегије за конструкцију П табеле



#### 4.5 Препознавање природе тренутне позиције

Када имамо израчунате изгубљене позиције, можемо да анализирамо природу тренутне позиције и да одредимо следећу позицију игре.

На 4, приказан је код за рекурзивну и алгебарску стратегију којим се проверава да ли је текућа позиција изгубљена, и ако није одређује се следећа позиција тако да она буде изгубљена позиција. За аритметичку стратегију, код је приказан на 5.

Код 4: Достицање изгубљене позиције рекурзивном и алгебарском стратегијом

```

1 void Recursive_and_Algebraic::reach_P_position(vector<int>& piles)
2 {
3     //two case:
4     //I : if piles(0) is B_n, save n, then x = piles(0) and y = A_n,
5     //II : if piles(0) is A_n, save n, if y > B_n then y = B_n
6     //      if y < B_n, d = y - x, m = floor(d/a)
7     //      then x = A_m, y = B_m, m < n
8     if(find(_B.begin(), _B.end(), piles.at(0)) != end(_B)) {
9         auto it = find(_B.begin(), _B.end(), piles.at(0));
10        vector<int>::size_type index = static_cast<vector<int>::size_type>(
11            distance(_B.begin(), it));
12        piles.at(1) = piles.at(0);
13        piles.at(0) = _A.at(index);
14    }
15    else if(find(_A.begin(), _A.end(), piles.at(0)) != end(_A)) {
16        auto it = find(_A.begin(), _A.end(), piles.at(0));
17        vector<int>::size_type index = static_cast<vector<int>::size_type>(
18            distance(_A.begin(), it));
19        if(piles.at(1) > _B.at(index)) {
20            piles.at(1) = _B.at(index);
21        }
22        else if(piles.at(1) < _B.at(index)) {
23            int d = abs(piles.at(1) - piles.at(0));
24            vector<int>::size_type m = static_cast<vector<int>::size_type>(floor(
25                d/_a));
26            piles.at(0) = _A.at(m);
27            piles.at(1) = _B.at(m);
28        }
29    }
30    else {

```

```

26     Game_Helper::computer_move(piles ,_a);
27 }
28 }
29 }

```

Код 5: Достицање изгубљене позиције аритметичком стратегијом

```

1  void Arithmetic::arithmetic_strategy(vector<int>& piles)
2  {
3      vector<int> _Rp = _p_system.find(piles.at(0))->second;
4      int number_of_zeros_p = number_of_zeros_from_end(_Rp);
5
6      if(fmod(number_of_zeros_p,2) != 0) {
7          odd_number_of_zeros(piles ,_Rp);
8      }
9      else {
10         even_number_of_zeros(piles ,_Rp);
11     }
12 }
13
14 int Arithmetic::number_of_zeros_from_end(vector<int>& R)
15 {
16     vector<int>::reverse_iterator index = find_if(R.rbegin(), R.rend(), [] (
17         int i) {
18         return (i != 0);
19     });
20     int result = static_cast<int>(distance(R.rbegin(), index));
21
22     return result;
23 }
24
25 void Arithmetic::odd_number_of_zeros(vector<int>& piles , vector<int>& R)
26 {
27     piles.at(1) = piles.at(0);
28     R.pop_back();
29     int _Ip = p_interpretation(R);
30     piles.at(0) = _Ip;
31 }
32
33 void Arithmetic::even_number_of_zeros(vector<int>& piles , vector<int>& R)
34 {
35     R.push_back(0);
36     int _Ip = p_interpretation(R);
37     if(piles.at(1) > _Ip) {
38         piles.at(1) = _Ip;
39     }
40     else if(piles.at(1) < _Ip) {
41         int d = abs(piles.at(1) - piles.at(0));
42         int m = static_cast<int>(floor(d/_a));
43         vector<int> _Rq = _q_system.find(m)->second;
44         int number_of_zeros_q = number_of_zeros_from_end(_Rq);
45         _Ip = p_interpretation(_Rq);
46         if(fmod(number_of_zeros_q, 2) != 0){
47             piles.at(0) = _Ip - 1;
48             piles.at(1) = _Ip - 1 + m*_a;
49         }
50         else {
51             piles.at(0) = _Ip;

```

```
52     piles.at(1) = _Ip + m*_a;
53     }
54 }
55 else {
56     Game_Helper::computer_move(piles ,_a);
57 }
58 }
```

---

## A Додатак резултатима

Табела 4: Времена извршавања у милисекундама конструкције  
II табеле

n	recursive	algebraic	arithmetic
10	0.009777	0.0063	0.036332
20	0.012459	0.005022	0.066619
40	0.024701	0.006737	0.136543
80	0.068748	0.009223	0.23613
160	0.181111	0.01631	0.471463
320	0.52075	0.025514	1.00452
640	1.88372	0.042335	2.06148
1280	7.33737	0.112218	4.33702
2560	29.0674	0.211089	9.17149
5120	116.413	0.241351	19.6074
10240	455.484	0.699545	41.4629
20480	2295.57	1.98725	84.9565
40960	10376.3	3.65746	179.124
81920	35663.2	8.41751	374.755
163840	179503	16.7582	786.699
327680	718040	17.85	1684.46
655360	2.87691e+06	30.3433	3487.31
1310720	1.1513e+07	60.9543	8186.19
2621440		133.61	17698.4
5242880		390.024	43597.4
10485760		1104.32	96394.5
20971520		2335.12	230089
41943040		3898.76	
83886080		5283.57	
167772160		12495.3	
335544320		24782.3	
671088640		42270.9	

Табела 5: Парови жетона II табеле

n	A	B
10	14	34
20	28	68
40	56	136
80	113	273
160	226	546
320	452	1092
640	905	2185
1280	1810	4370
2560	3620	8740
5120	7240	17480
10240	14481	34961
20480	28963	69923
40960	57926	139846
81920	115852	279692
163840	231704	559384
327680	463409	1118769
655360	926819	2237539
1310720	1853638	4475078
2621440	3707276	8950156
5242880	7414552	17900312



n	A	B
10485760	14829104	35800624
20971520	29658208	71601248
41943040	59316416	143202496
83886080	118632832	286404992
167772160	237265664	572809984
335544320	474531328	1145619968
671088640	949062656	2291239936
1342177280	1898125312	4582479872
2684354560	3796250624	9164959744
5368709120	7592501249	18329919489
10737418240	15185002499	36659838979
21474836480	30370004999	73319677959
42949672960	60740009999	146639355919
85899345920	121480019999	293278711839
171798691840	242960039998	586557423678
343597383680	485920079996	1173114847356
687194767360	971840159992	2346229694712
1374389534720	1943680319984	4692459389424
2748779069440	3887360639969	9384918778849
5497558138880	7774721279938	18769837557698
10995116277760	15549442559877	37539675115397
21990232555520	31098885119754	75079350230794
43980465111040	62197770239509	150158700461589
87960930222080	124395540479019	300317400923179
175921860444160	248791080958038	600634801846358
351843720888320	497582161916076	1201269603692716
703687441776640	995164323832152	2402539207385432
1407374883553280	1990328647664304	4805078414770864
2814749767106560	3980657295328608	9610156829541728
5629499534213120	7961314590657216	19220313659083456
11258999068426240	15922629181314432	38440627318166912
22517998136852480	31845258362628865	76881254636333825
45035996273704960	63690516725257730	153762509272667650
90071992547409920	127381033450515460	307525018545335300
180143985094819840	254762066901030920	615050037090670600
360287970189639680	509524133802061840	1230100074181341200
720575940379279360	1019048267604123680	2460200148362682400
1441151880758558720	2038096535208247360	4920400296725364800
2882303761517117440	4076193070416494720	9840800593450729600
5764607523034234880	8152386140832989440	19681601186901459200
11529215046068469760	16304772281665978880	39363202373802918400
23058430092136939520	32609544563331957760	78726404747605836800
46116860184273879040	65219089126663915520	157452809495211673600
92233720368547758080	130438178253327831040	314905618990423347200
184467440737095516160	260876356506655662080	629811237980846694400
368934881474191032320	521752713013311324160	1259622475961693388800
737869762948382064640	1043505426026622648320	2519244951923386777600
1475739525896764129280	2087010852053245296640	5038489903846773555200
2951479051793528258560	4174021704106490593280	10076979807693547110400
5902958103587056517120	8348043408212981186560	20153959615387094220800
11805916207174113034240	16696086816425962373120	40307919230774188441600
23611832414348226068480	33392173632851924746240	80615838461548376883200
47223664828696452136960	66784347265703849492480	161231676923096753766400
94447329657392904273920	133568694531407698984960	322463353846193507532800
188894659314785808547840	267137389062815397969920	644926707692387015065600
377789318629571617095680	534274778125630795939840	1289853415384774030131200
755578637259143234191360	1068549556251261591879680	2579706830769548060262400

n	A	B
1511157274518286468382720	2137099112502523183759360	5159413661539096120524800
3022314549036572936765440	4274198225005046367518720	10318827323078192241049600
6044629098073145873530880	8548396450010092735037440	20637654646156384482099200
12089258196146291747061760	17096792900020185470074880	41275309292312768964198400
24178516392292583494123520	34193585800040370940149760	82550618584625537928396800
48357032784585166988247040	68387171600080741880299520	165101237169251075856793600
96714065569170333976494080	136774343200161483760599040	330202474338502151713587200
193428131138340667952988160	273548686400322967521198080	660404948677004303427174400
386856262276681335905976320	547097372800645935042396160	1320809897354008606854348800
773712524553362671811952640	1094194745601291870084792320	2641619794708017213708697600
1547425049106725343623905280	2188389491202583740169584640	5283239589416034427417395200
3094850098213450687247810560	4376778982405167480339169280	10566479178832068854834790400
6189700196426901374495621120	8753557964810334960678338560	21132958357664137709669580800
12379400392853802748991242240	17507115929620669921356677120	42265916715328275419339161600
24758800785707605497982484480	35014231859241339842713354240	84531833430656550838678323200
49517601571415210995964968960	70028463718482679685426708480	169063666861313101677356646400
99035203142830421991929937920	140056927436965359370853416960	338127333722626203354713292800
198070406285660843983859875840	280113854873930718741706833920	676254667445252406709426585600
396140812571321687967719751680	560227709747861437483413667840	1352509334890504813418853171200
792281625142643375935439503360	1120455419495722874966827335680	2705018669781009626837706342400
1584563250285286751870879006720	2240910838991445749933654671360	5410037339562019253675412684800
3169126500570573503741758013440	4481821677982891499867309342720	10820074679124038507350825369600
6338253001141147007483516026880	8963643355965782999734618685440	21640149358248077014701650739200

## Литература

- [1] Alexander Bogomolny. Wythoff's nim. <https://www.cut-the-knot.org/pythagoras/withoff.shtml>.
- [2] Charles L. Bouton. Nim, a game with a complete mathematical theory. *Annals of Mathematics*, 3(1/4):35–39, 1901.
- [3] std::chrono library. <https://en.cppreference.com/w/cpp/chrono>.
- [4] Aviezri S. Fraenkel. How to beat your wythoff games' opponent on three fronts. *The American Mathematical Monthly*, 89(6):353–361, 1982.
- [5] James Grime. Wythoff's game (get home). [https://www.youtube.com/watch?v=AYOB-6wyK\\_I](https://www.youtube.com/watch?v=AYOB-6wyK_I).
- [6] Christopher Boo Calvin Lin Jimin Khim Arron Kau Ivan Koswara, Mateo Matijasevick. Nim. <https://brilliant.org/wiki/nim/>.
- [7] Willem A Wythoff. A modification of the game of nim. *Nieuw Arch. Wisk*, 7(2):199–202, 1907.
- [8] A. M. Yaglom and I. M. Yaglom. *Challenging Mathematical Problems with Elementary Solutions*. Holden-Day, USA, 1967.