Factorización de polinomios, por tipos

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

0. La ficha **2**

1. Los ejercicios **3**
1.1. Raíces racionales 4
1.2. Identidades notables 4
1.3. Una raíz racional y dos irracionales 4
1.4. Un factor de grado 2 irreducible 4
1.5. Sin raíces reales 5
1.6. Sin pistas 5

0. La ficha

Seis ejercicios para practicar la factorización de polinomios antes del examen del lunes 26 de octubre. Los cinco primeros siguen los cinco tipos de la ficha de clase de factorización, uno por ejercicio, con tres apartados de menos a más: el primero es más sencillo que el de la ficha, el segundo se le parece y el tercero va un paso más allá. El sexto no dice qué camino seguir, como puede pasar en el examen. Ningún polinomio está en la ficha de clase, en la unidad 5 ni en la otra ficha de esta sección, «Factorización de polinomios, por niveles».

En todos hay que factorizar del todo en $\mathbb{R}[x]$: escribir el polinomio como producto de factores irreducibles, que son los de grado 1 y los de grado 2 sin raíces reales. Además, se dan las raíces reales con su multiplicidad y se explica por qué es irreducible cada factor de grado 2 que quede. La teoría, con sus ejemplos, está en la unidad 5: las raíces racionales, en el subapartado 2.2, y el orden para factorizar, en el 3.1.

Método · Factorizar un polinomio en $\mathbb{R}[x]$

1. Saca factor común la mayor potencia de x que esté en todos los términos y, si los coeficientes son enteros, su máximo común divisor.
2. Busca una identidad notable: una diferencia de cuadrados, $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, o el cuadrado de una suma o de una diferencia, $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$.
3. Mira el grado de lo que queda:
   - Si es 2, resuelve la ecuación con la fórmula. Con raíces r_1 y r_2, se factoriza como $a(x-r_1)(x-r_2)$, sin olvidar el coeficiente principal a. Si el discriminante es negativo, es irreducible.
   - Si es mayor que 2, mira primero los atajos de abajo. Si ninguno sirve y los coeficientes son enteros, usa Ruffini con los candidatos $\frac{p}{q}$ (p divide al término independiente y q, al coeficiente principal) y vuelve al paso 1 con el cociente.

Atajos para el grado mayor que 2, antes de Ruffini:

- Si tiene cuatro términos, agrupa: saca factor común por parejas (ejercicio 6, apartado c).
- Si solo tiene potencias pares de x, llama t a x^2 y factoriza en t (ejercicio 5, apartado a). Al volver a x, con $r > 0$, $x^2 + r$ es irreducible y $x^2 - r$ se parte en $(x - \sqrt{r})\,(x + \sqrt{r})$.
- Si solo tiene potencias pares y en t no hay raíces reales, aún puede partirse: suma y resta lo que le falta para ser un cuadrado, y queda una diferencia de cuadrados (segundo ejemplo y ejercicio 5, apartados b y c).

Si ningún candidato anula el polinomio, no tiene raíces racionales, pero no por eso es irreducible: puede tener raíces irracionales. Así, $x^3 - 3$ no tiene raíces racionales y tiene la raíz $\sqrt[3]{3}$.

Al acabar, solo deben quedar factores de grado 1 y factores de grado 2 con discriminante negativo. Para comprobar la factorización, multiplica los factores: tiene que salir el polinomio.

Ejemplo

Factorizamos $P(x) = 3x^4 - 6x^3 - 24x^2$. Todos los términos llevan $3x^2$, que sale como factor común (paso 1):

$$P(x) = 3x^2\left(x^2 - 2x - 8\right)$$

El paréntesis no es una identidad notable y es de grado 2, así que va la fórmula (paso 3). Su discriminante es $4 + 32 = 36 > 0$, y sus raíces son $x = \frac{2 \pm 6}{2}$, es decir, $x = 4$ y $x = -2$.

Con el coeficiente principal, que es 1, $x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2)$, y

$$P(x) = 3x^2(x - 4)(x + 2)$$

Sus raíces son 0, doble, porque el factor x sale dos veces, y 4 y -2, simples. Al acabar se comprueba multiplicando: $3x^2\left(x^2 - 2x - 8\right) = 3x^4 - 6x^3 - 24x^2$, que es $P(x)$.

Ejemplo

Factorizamos $x^4 + x^2 + 1$. No hay factor común (paso 1) ni una identidad notable a la vista (paso 2). Es de grado 4 (paso 3), así que antes de Ruffini se miran los atajos. Solo tiene potencias pares: con $t = x^2$ queda $t^2 + t + 1$, cuyo discriminante es $1 - 4 = -3$. En t no hay raíces reales, pero eso no quiere decir que no se parta en x.

Se suma y se resta lo que le falta para ser un cuadrado. Como x^4 y 1 son los cuadrados de x^2 y de 1, el cuadrado que se busca es $\left(x^2 + 1\right)^2 = x^4 + 2x^2 + 1$. Le falta x^2, que es el cuadrado de x, así que queda una diferencia de cuadrados:

$$\begin{aligned} & x^4 + x^2 + 1 \\ = \; & x^4 + 2x^2 + 1 - x^2 \\ = \; & \left(x^2 + 1\right)^2 - x^2 \\ = \; & \left(x^2 - x + 1\right)\left(x^2 + x + 1\right) \end{aligned}$$

Los dos factores tienen discriminante $1 - 4 = -3$: son irreducibles, y ya no queda nada que partir. Al multiplicarlos, los términos en x^3 y en x se anulan y sale otra vez $x^4 + x^2 + 1$.

Atención

Con calculadora. En la fx-CG50, en el menú Equation, elige Polynomial y el grado, escribe los coeficientes y pulsa SOLVE: salen las raíces. Sirve para orientarte: si una raíz coincide con un candidato (por ejemplo, $0{,}5$ es $\frac{1}{2}$), ese es el que se prueba con Ruffini, y si no coincide ninguna, no hay raíces racionales. Pero no justifica nada: si el enunciado pide la forma exacta o prohíbe las aproximaciones, como el ejercicio 5, la respuesta tiene que salir con álgebra, y la calculadora solo sirve para comprobarla.

1. Los ejercicios

Un subapartado por tipo, con su idea en pocas líneas y su ejercicio. El último junta los tipos sin decir cuál toca.

1.1. Raíces racionales

Si la fracción irreducible $\frac{p}{q}$ es raíz de un polinomio de coeficientes enteros, p divide al término independiente y q, al coeficiente principal. Así salen los candidatos, y cada uno se prueba con la regla de Ruffini: es raíz si el resto es 0. Al final, el número que acompaña a cada factor $x - \frac{p}{q}$ se mete dentro, para escribirlo sin fracciones: $q\left(x - \frac{p}{q}\right) = qx - p$.

Ejercicios

1) Todas las raíces de estos polinomios son racionales. Factorice cada uno en factores irreducibles e indique sus raíces con su multiplicidad:
   a) $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$
   b) Ninguna raíz es entera: $P(x) = 12x^3 - 20x^2 - x + 6$
   c) Ninguna raíz es entera, y una es doble: $P(x) = 24x^4 - 20x^3 - 26x^2 + x + 3$

1.2. Identidades notables

Las dos que más salen son la diferencia de cuadrados, $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, y el cuadrado de una diferencia, $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$. Un factor $x^2 + c$ con $c > 0$ es irreducible, porque $x^2 + c \geq c > 0$ no se anula nunca. En cambio, $x^2 - c$ con $c > 0$ no lo es, aunque c no sea un cuadrado: $x^2 - c = \left(x - \sqrt{c}\right)\left(x + \sqrt{c}\right)$.

Ejercicios

2) Utilice las identidades notables (y, si hace falta, la regla de Ruffini) para factorizar en factores irreducibles de $\mathbb{R}[x]$:
   a) $Q(x) = x^4 - 81$
   b) $Q(x) = x^8 - 8x^4 + 16$
   c) $Q(x) = x^6 - 64$

1.3. Una raíz racional y dos irracionales

Se busca la raíz racional entre los candidatos y se divide con Ruffini. El cociente es de segundo grado, y sus raíces, que se hallan con la fórmula, son las dos irracionales.

Ejercicios

3) Cada polinomio tiene una raíz racional y dos irracionales. Factorícelo en factores irreducibles y halle sus tres raíces:
   a) $R(x) = x^3 - x^2 - 2x + 2$
   b) $R(x) = x^3 - 2x^2 - 7x + 2$
   c) $R(x) = 3x^3 + 5x^2 - 14x + 4$

1.4. Un factor de grado 2 irreducible

Un factor de segundo grado con discriminante negativo no tiene raíces reales. Si se pudiera partir en dos factores de primer grado, cada uno daría una raíz, así que es irreducible: la factorización se acaba ahí.

Ejercicios

4) Factorice en factores irreducibles, indique las raíces reales y explique por qué es irreducible el factor de grado 2 que queda:
   a) $S(x) = x^3 - x^2 + 2x + 4$
   b) $S(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 9x - 18$
   c) $S(x) = 2x^4 + x^3 - 3x^2 + 5x - 2$

1.5. Sin raíces reales

Primero se ve que el polinomio es siempre positivo, y así no tiene raíces reales. Después, si no se parte a simple vista, se suma y se resta lo que le falta para ser el cuadrado de una suma, y queda una diferencia de cuadrados. Sin raíces reales también se puede factorizar: los factores son de grado 2 e irreducibles.

Ejercicios

5) Muestre, sin calcular aproximaciones, que el polinomio no tiene raíces reales, y factorícelo en factores irreducibles de $\mathbb{R}[x]$:
   a) $T(x) = x^4 + 5x^2 + 4$
   b) $T(x) = 4x^4 + 81$
   c) $T(x) = x^4 - 3x^2 + 9$

1.6. Sin pistas

Aquí no se dice qué camino seguir: los tres pasos del método del apartado 0, con sus atajos.

Ejercicios

6) Factorice en factores irreducibles de $\mathbb{R}[x]$ e indique las raíces reales con su multiplicidad:
   a) $U(x) = x^5 - 2x^3 + x$
   b) $U(x) = 4x^4 - 17x^2 + 4$
   c) $U(x) = 2x^4 - x^3 - 2x + 1$