

Unidad 2: Combinatoria y binomio

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

1. Contar sin enumerar	2
1.1. Principios de multiplicación y de suma	2
1.2. El factorial	3
2. Permutaciones y combinaciones	4
2.1. Permutaciones	4
2.2. Ordenaciones con elementos repetidos	5
2.3. Combinaciones	6
3. El binomio de Newton	7
3.1. El desarrollo con números combinatorios	7
3.2. Problemas con el binomio	9
3.3. Exponentes negativos y fraccionarios	11
4. Práctica tipo examen	13
4.1. Prueba 1: sin calculadora	13
4.2. Prueba 2: con calculadora	13
4.3. Prueba 3: Nivel Superior	13

1. Contar sin enumerar

Muchas preguntas de probabilidad y del binomio de Newton se reducen a contar: cuántos resultados, cuántos grupos, cuántas ordenaciones. Cuando hay demasiados para escribirlos todos, se cuentan con dos principios y con el factorial.

1.1. Principios de multiplicación y de suma

Definición

- **Principio de multiplicación.** Si una elección se hace en varias etapas, con m opciones en la primera y n en la segunda, sean cuales sean las anteriores, hay $m \cdot n$ elecciones en total; con más etapas, se sigue multiplicando.
- **Principio de suma.** Si los casos se reparten en grupos sin elementos comunes, el total es la suma de lo que hay en cada grupo.

Un menú con 3 primeros, 4 segundos y 2 postres se puede componer de $3 \cdot 4 \cdot 2$ maneras. Un diagrama de árbol lo muestra: cada primero abre 4 ramas y cada una de ellas, 2.

$$\text{Menús: } 3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$$

$$\text{PIN de cuatro cifras: } 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$$

$$\text{PIN sin repetir cifras: } 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$$

Ejemplo

¿Cuántos números de una, dos o tres cifras se pueden formar con las cifras 1, 2, 3, 4 y 5 sin repetir ninguna?

Se separan los casos por el número de cifras, que no tienen elementos comunes, y cada uno se cuenta con el principio de multiplicación:

$$5 + 5 \cdot 4 + 5 \cdot 4 \cdot 3 = 5 + 20 + 60 = 85$$

Errores frecuentes

- « $3 + 4 + 2 = 9$ menús» no: cada primero se combina con cada segundo y con cada postre, $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$.
- Un PIN sin repetir cifras no son 10^4 códigos: cada cifra tiene una opción menos que la anterior, $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$.

Ejercicios

- 1) Con las cifras del 1 al 7:
 - a) ¿Cuántos números de tres cifras se pueden formar?
 - b) ¿Cuántos, si no se repite ninguna cifra?
 - c) ¿Cuántos de los de b) son pares?
- 2)
 - a) ¿Cuántos números de tres cifras son múltiplos de 5?
 - b) ¿Cuántos, si además tienen las tres cifras distintas?
- 3) Una camiseta se vende en 4 tallas y 6 colores, con capucha o sin ella. ¿Cuántos modelos distintos hay?

- 4) ¿Cuántos números de una, dos o tres cifras se pueden escribir con las cifras 2, 4 y 9, sin repetir ninguna?

(Libro) Oxford: ejercicio 1H, pregunta 8 (págs. 57 y 58). Soluciones del libro en la página 761.

1.2. El factorial

El número de ordenaciones de n objetos distintos aparece tanto que tiene nombre propio.

Definición

El **factorial** de un entero positivo n es el producto de todos los enteros de 1 a n :

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1$$

Por convenio, $0! = 1$. Se cumple $n! = n \cdot (n-1)!$, que permite simplificar cocientes sin calcular factoriales enormes.

$$\begin{aligned}\frac{9!}{7!} &= \frac{9 \cdot 8 \cdot 7!}{7!} = 72 \\ \frac{6!}{4! \cdot 2!} &= \frac{6 \cdot 5}{2} = 15 \\ \frac{(n+2)!}{n!} &= (n+2)(n+1)\end{aligned}$$

La calculadora tiene una tecla para el factorial; en GeoGebra y en Desmos se escribe $10!$.

Errores frecuentes

- $\frac{9!}{7!}$ no es $(\frac{9}{7})!$: se simplifica el $7!$ y queda $9 \cdot 8 = 72$.
- $(2 \cdot 3)! = 6! = 720$, no $2! \cdot 3! = 12$.
- $0! = 1$, no 0.

Ejercicios

5) Calcule sin calculadora:

$$\text{a) } \frac{12!}{10!} \quad \text{b) } \frac{5! \cdot 3!}{6!} \quad \text{c) } \frac{100!}{98! \cdot 2!}$$

6) Simplifique:

$$\text{a) } \frac{(n+2)!}{n \cdot n!} \quad \text{b) } \frac{(2n)!}{(2n-2)!}$$

7) Resuelva $\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 90$.

Ejercicios de clase

8) Simplifique:

$$\text{a) } \frac{20!}{18! \cdot 2!} \quad \text{b) } \frac{8!}{5! \cdot 3!} \quad \text{c) } \frac{20\,000!}{19\,999! \cdot 1!}$$

(Libro) Oxford: ejercicio 1H, preguntas 1 a 4 y 6 (págs. 57 y 58). Soluciones del libro en la página 761.

2. Permutaciones y combinaciones

2.1. Permutaciones

Definición

- n objetos distintos se pueden ordenar de $n!$ maneras.
- Elegir r objetos de n distintos **y ordenarlos** se puede hacer de

$${}^n P_r = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1)$$

maneras, que son las **permutaciones** de n elementos tomados de r en r .

La fórmula de ${}^n P_r$ está en el cuadernillo del examen. Muchos libros españoles las llaman **variaciones** y escriben $V_{n,r}$; el IB dice permutaciones. En la calculadora, en GeoGebra y en Desmos: $\text{nPr}(8,3)$.

Oro, plata y bronce entre 8 corredores: ${}^8 P_3 = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$

Método

Ordenaciones con condiciones.

1. Se colocan primero los lugares con condición (la primera cifra, los extremos...) y después el resto.
2. Si unos objetos tienen que ir **juntos**, se cuentan como un solo bloque y se multiplica por las ordenaciones dentro del bloque.
3. Si tienen que ir **separados**, se restan del total las ordenaciones en las que van juntos.

Ejemplo

Las 7 bicicletas de un club se colocan en fila; 2 son eléctricas.

Con las eléctricas juntas, el bloque y las otras 5 son 6 objetos, y el bloque se ordena por dentro de $2!$ maneras. Con las eléctricas separadas, se restan esas del total:

$$\text{Juntas: } 6! \cdot 2! = 1440$$

$$\text{Separadas: } 7! - 1440 = 3600$$

Atención

El IB no pide ordenaciones en círculo: en sus preguntas los objetos van siempre en fila.

Errores frecuentes

- Con las eléctricas juntas son $6! \cdot 2!$, no $6!$: dentro del bloque también se ordenan.
- «Separadas» son $7! - 6! \cdot 2!$, no $7! - 6!$.

Ejercicios

- 9) ¿De cuántas formas pueden quedar los cinco primeros puestos de una carrera con 12 participantes?

10) Con las letras de NUBE:

- a) ¿Cuántas ordenaciones hay?
- b) ¿Cuántas empiezan por vocal?
- c) ¿En cuántas van juntas las dos vocales?

11) Con las cifras del 1 al 7, sin repetir ninguna:

- a) ¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden formar?
- b) ¿Cuántos de ellos son mayores que 5000?

12) Seis personas se sientan en fila. ¿De cuántas formas pueden hacerlo si dos de ellas no quieren sentarse juntas?

(Libro) Oxford: ejercicio 1H, preguntas 7 y 10 (págs. 57 y 58), y repaso del capítulo 1, pregunta 13, apartados a y b (págs. 68 y 69). Soluciones del libro en las páginas 761 y 762.

2.2. Ordenaciones con elementos repetidos

Si algunos de los objetos que se ordenan son iguales, hay menos ordenaciones distintas. Con las letras a , a y b solo se pueden escribir tres palabras:

$$aab \quad aba \quad baa$$

Si las dos a fueran distintas, a_1 y a_2 , habría $3! = 6$ ordenaciones, y cada palabra saldría $2! = 2$ veces, una por cada forma de colocar a_1 y a_2 en sus dos lugares. Por eso hay $\frac{3!}{2!} = 3$.

Definición

n objetos entre los que hay p iguales de un tipo, q iguales de otro, y así sucesivamente, se pueden ordenar de

$$\frac{n!}{p! q! \dots}$$

maneras. Con dos tipos, r letras b y $n - r$ letras a , son $\frac{n!}{r! (n-r)!}$: el número combinatorio del subapartado siguiente.

$$\text{BANANA, con tres A y dos N: } \frac{6!}{3! 2!} = 60$$

Atención

El examen del IB no las pregunta: la guía de la asignatura deja fuera las ordenaciones con objetos repetidos. Aun así, la misma guía propone contar para llegar al binomio de Newton, y estas ordenaciones son la forma de hacerlo (apartado 3).

Errores frecuentes

- En BANANA se divide por $3!$ y por $2!$, no solo por $3!$: también las dos N se pueden intercambiar.

Ejercicios

- 13) ¿Cuántas ordenaciones distintas tienen las letras de TOMATE?
- 14) Con las letras de CASCADA:
- ¿Cuántas ordenaciones distintas hay?
 - ¿Cuántas empiezan por C?
- 15) Se lanza una moneda 9 veces y se anota la secuencia de caras y cruces. ¿En cuántas secuencias salen exactamente 2 caras?
- 16) En un mástil se izan, una encima de otra, 4 banderas rojas, 2 azules y 1 verde, iguales las del mismo color. ¿Cuántas señales distintas se pueden formar?

(Libro) El Oxford no trae ordenaciones con objetos repetidos, porque el IB no las pregunta en el examen.

2.3. Combinaciones

Si solo importa **qué** objetos se eligen y no en qué orden, cada grupo de r objetos aparece $r!$ veces entre las permutaciones, y se divide por $r!$.

Definición

Elegir r objetos de n distintos, **sin importar el orden**, se puede hacer de

$${}^nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

maneras, que son las **combinaciones** de n elementos tomados de r en r . El número nC_r se llama **número combinatorio** o coeficiente binomial, y $\binom{n}{r}$ se lee « n sobre r » (hay quien escribe k en lugar de r). Se cumplen ${}^nP_r = r! \cdot {}^nC_r$ y ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$, porque elegir los r que se quedan es elegir los $n-r$ que se van. Como $0! = 1$, ${}^nC_0 = {}^nC_n = 1$.

Es el mismo número que el de palabras con r letras b y $n-r$ letras a del subapartado anterior: elegir un grupo de r objetos es elegir en qué r lugares van las b .

La fórmula de nC_r también está en el cuadernillo; en la calculadora, en GeoGebra y en Desmos se escribe $nCr(9,5)$. Antes de contar, la pregunta es siempre la misma: ¿importa el orden?

$$\text{Equipos de 5 entre 9 personas: } {}^9C_5 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4!} = 126$$

Ejemplo

Un grupo de 8 chicas y 3 chicos forma un equipo de 5.

Con exactamente 2 chicos, se eligen los chicos y, aparte, las chicas. Con al menos un chico, se resta del total el caso sin chicos:

$$\text{Exactamente 2 chicos: } {}^3C_2 \cdot {}^8C_3 = 3 \cdot 56 = 168$$

$$\text{Al menos 1 chico: } {}^{11}C_5 - {}^8C_5 = 462 - 56 = 406$$

Errores frecuentes

- En un equipo no importa el orden: ${}^9C_5 = 126$, no ${}^9P_5 = 15\,120$.
- «Al menos un chico» no es $3 \cdot {}^{10}C_4$: cuenta varias veces los equipos con dos o tres chicos; se resta del total el caso sin chicos.

Ejercicios

- 17) Un examen tiene 10 preguntas y hay que contestar 7.
 a) ¿De cuántas formas se pueden elegir?
 b) ¿Y si hay que contestar al menos una de las dos primeras?
- 18) En una circunferencia se marcan 7 puntos. ¿Cuántas cuerdas y cuántos triángulos tienen sus extremos o sus vértices en esos puntos?
- 19) En una cuadrícula de 6×4 cuadrados se va de la esquina inferior izquierda a la superior derecha avanzando solo hacia la derecha o hacia arriba. ¿Cuántos caminos hay?
- 20) Resuelva ${}^nC_2 = 45$.
- 21) Demuestre que $r \cdot {}^nC_r = n \cdot {}^{n-1}C_{r-1}$ para $1 \leq r \leq n$.

(Libro) Oxford: ejercicio 1H, preguntas 5, 9, 11 y 12 (págs. 57 y 58), y repaso del capítulo 1, preguntas 5 y 13 c) (págs. 68 y 69). Soluciones del libro en las páginas 761 y 762.

3. El binomio de Newton**3.1. El desarrollo con números combinatorios**

Los números de cada fila del triángulo de Pascal son los nC_r : la fila n es ${}^nC_0, {}^nC_1, \dots, {}^nC_n$. La razón es un recuento. Al multiplicar $(a+b)(a+b)(a+b)$ sin agrupar, cada término es una palabra de tres letras, una de cada factor:

$$\begin{aligned}(a+b)^3 &= aaa + (aab + aba + baa) \\ &\quad + (abb + bab + bba) + bbb \\ &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\end{aligned}$$

El coeficiente de a^2b es el número de palabras con dos a y una b , ${}^3C_1 = 3$. En general, el término con b^r aparece tantas veces como palabras hay con r letras b y $n-r$ letras a : nC_r .

Definición

Binomio de Newton (está en el cuadernillo). Para $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}(a+b)^n &= a^n + {}^nC_1 a^{n-1}b + \dots \\ &\quad + {}^nC_r a^{n-r}b^r + \dots + b^n\end{aligned}$$

Con la notación sigma (unidad 3), que suma los términos que salen al dar a r los valores $0, 1, \dots, n$:

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}^nC_r a^{n-r}b^r$$

El **término general**, ${}^nC_r a^{n-r}b^r$, es el que lleva b^r y ocupa el lugar $r + 1$ (el primero es el de $r = 0$); se usa para hallar un término sin desarrollar todo el binomio.

$$\begin{aligned}(3-x)^4 &= 3^4 + 4 \cdot 3^3(-x) + 6 \cdot 3^2(-x)^2 \\ &\quad + 4 \cdot 3(-x)^3 + (-x)^4 \\ &= 81 - 108x + 54x^2 - 12x^3 + x^4\end{aligned}$$

Así escrito, el desarrollo va en **potencias ascendentes de x** : primero el término sin x y después los de $x, x^2, \dots$; en potencias descendentes, al revés.

Atención

Hay quien lo escribe al revés, empezando por b^n :

$$\begin{aligned}(a+b)^n &= b^n + {}^nC_1 ab^{n-1} + \dots \\ &\quad + {}^nC_r a^r b^{n-r} + \dots + a^n\end{aligned}$$

Es el mismo desarrollo, porque ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$. El cuadernillo lo escribe empezando por a^n , y en ese orden el término general, ${}^nC_r a^{n-r}b^r$, es el que lleva b^r .

Método

Un término concreto.

1. Se escribe el término general, con los signos y los coeficientes dentro de las potencias.
2. Se agrupan las potencias de x y se iguala el exponente al que se busca (0 para el término independiente).
3. Se despeja r , que tiene que ser un entero entre 0 y n , y se sustituye.

Ejemplo

Halle el término independiente del desarrollo de $(x - \frac{3}{x^2})^6$.

$$\begin{aligned}{}^6C_r x^{6-r} \left(-\frac{3}{x^2}\right)^r &= {}^6C_r (-3)^r x^{6-3r} \\ 6-3r &= 0 \Rightarrow r = 2 \\ {}^6C_2 (-3)^2 &= 15 \cdot 9 = 135\end{aligned}$$

Errores frecuentes

- En $(3-x)^4$ los signos se alternan: $-108x$ y $-12x^3$, no $+108x$.
- El término en x^4 de $(2+x)^6$ es ${}^6C_4 \cdot 2^2 x^4 = 60x^4$, no $15 \cdot 2 x^4$: el 2 también se eleva.
- El término independiente no es el primero del desarrollo, sino el de exponente 0: en el ejemplo, el de $r = 2$.
- Para un solo término no se desarrolla todo el binomio: basta el término general, como en el ejemplo.

Ejercicios

- 22) Desarrolle: a) $(1 - 5x)^4$. b) $(y + 3)^5$.
- 23) Halle el coeficiente de x^4 en el desarrollo de $(5 - 2x)^7$.
- 24) a) Muestre que el desarrollo de $(x^2 + \frac{1}{3x})^5$ no tiene término independiente.
b) Halle el coeficiente de x^4 .
- 25) Halle:
a) El término en x^5 del desarrollo de $(2 - \frac{x}{3})^7$.
b) El cuarto término del desarrollo de $(x - 2)^9$ en potencias descendentes de x .

Ejercicios de clase

- 26) Halle el coeficiente de x^7 en el desarrollo de $(2 + 3x)^{10}$. Dé la respuesta como un número entero.
- 27) Halle el coeficiente de x en el desarrollo de $(3x - \frac{2}{x})^5$.
- 28) Halle el coeficiente de x^3 en el desarrollo binomial de $(1 - \frac{1}{2}x)^8$.
- 29) Halle el coeficiente de x^3 en el desarrollo de $(2 - \frac{3x}{2})^6$.

(Libro) Oxford: ejercicio 11, preguntas 1, 2, 3, 5 y 9 (pág. 61), y repaso del capítulo 1, pregunta 6 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 761 y 762.

3.2. Problemas con el binomio

Las preguntas de examen sobre el binomio casi nunca se quedan en un desarrollo: dan un coeficiente y falta una constante o el exponente, piden los primeros términos de un producto o un resultado con raíces, o usan el desarrollo para calcular una potencia. Todas se resuelven con el término general.

Método

Si falta un dato del binomio (una constante o el exponente n).

1. Se escribe con el término general el término del que habla el enunciado, con la incógnita como letra.
2. Se iguala su coeficiente al dato y se resuelve la ecuación.
3. Si la incógnita es n , nC_r se escribe como producto y n tiene que ser natural: con $r = 2$ sale una ecuación de segundo grado; con $r = 3$, se buscan tres naturales consecutivos con el producto que pide la ecuación, o se usa la tabla de la calculadora.

Ejemplo

El término independiente del desarrollo de $(x + \frac{a}{x})^4$ es 24. Halle los valores posibles de a .

$${}^4C_r x^{4-r} \left(\frac{a}{x}\right)^r = {}^4C_r a^r x^{4-2r}$$

$$4 - 2r = 0 \Rightarrow r = 2$$

$${}^4C_2 a^2 = 6a^2 = 24 \Rightarrow a = \pm 2$$

Si lo que falta es el exponente, por ejemplo porque el coeficiente de x^2 en $(1+x)^n$ es 28:

$$\frac{n(n-1)}{2} = 28 \Rightarrow n(n-1) = 56 = 8 \cdot 7 \Rightarrow n = 8$$

Los **primeros términos de un producto** de dos binomios se hallan sin desarrollarlos enteros: cada factor, en potencias ascendentes de x , hasta el grado que se pide, y del producto, solo los términos de ese grado o menor. Cada uno reúne **todos** los productos de un término de cada factor que dan su grado.

Ejemplo

Halle los tres primeros términos, en potencias ascendentes de x , del desarrollo de $(1+x)^4(1-3x)^3$.

$$\begin{aligned}(1+x)^4 &= 1 + 4x + 6x^2 + \dots \\ (1-3x)^3 &= 1 - 9x + 27x^2 - \dots\end{aligned}$$

El término en x sale de $1 \cdot (-9x)$ y de $4x \cdot 1$; el de x^2 , de $1 \cdot 27x^2$, de $4x \cdot (-9x)$ y de $6x^2 \cdot 1$:

$$(1+x)^4(1-3x)^3 = 1 - 5x - 3x^2 + \dots$$

Con **raíces** se desarrolla igual; después se simplifican las potencias de la raíz y se agrupan los términos sin raíz y los que la llevan:

$$\begin{aligned}(2 + \sqrt{5})^3 &= 2^3 + 3 \cdot 2^2 \sqrt{5} + 3 \cdot 2 (\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^3 \\ &= 8 + 12\sqrt{5} + 30 + 5\sqrt{5} = 38 + 17\sqrt{5}\end{aligned}$$

El desarrollo sirve también para calcular **potencias de decimales**. Con todos los términos, el resultado es exacto:

$$\begin{aligned}1,1^4 &= (1 + 0,1)^4 \\ &= 1 + 0,4 + 0,06 + 0,004 + 0,0001 = 1,4641\end{aligned}$$

Si el número es cercano a 1, los primeros términos ya dan una buena aproximación, porque las potencias altas de un número pequeño apenas cuentan:

$$0,99^6 = (1 - 0,01)^6 \approx 1 - 6 \cdot 0,01 + 15 \cdot 0,0001 = 0,9415$$

Errores frecuentes

- En $(1+x)^4(1-3x)^3$ no se multiplican los términos uno a uno ($1 \cdot 1$, $4x \cdot (-9x)$, $6x^2 \cdot 27x^2$): el término en x^2 reúne los tres productos que dan x^2 .
- Con $a^2 = 4$ hay dos valores, $a = \pm 2$, no solo $a = 2$.
- $(\sqrt{5})^3 = 5\sqrt{5}$, no 5 ni $\sqrt{15}$.

Ejercicios

- 30) Halle los valores de k si el coeficiente de x^2 en $(1 + kx)^5$ es 160.
- 31) El coeficiente de x^3 en el desarrollo de $(x + \frac{k}{x^2})^9$ es 9. Halle los valores posibles de k .
- 32) En el desarrollo de $(1 + \frac{x}{5})^n$, con $n \in \mathbb{N}$, en potencias ascendentes de x , el coeficiente de x^3 es $\frac{4}{25}$.
- Halle el valor de n .
 - Halle el coeficiente de x^2 .
- 33) Halle los tres primeros términos del desarrollo de $(1 + 2x)^6(1 - x)^5$ en potencias ascendentes de x .
- 34) Exprese $(1 + \sqrt{2})^5$ en la forma $a + b\sqrt{2}$, con $a, b \in \mathbb{Z}$.
- 35) Utilice los tres primeros términos del desarrollo de $(1 + x)^9$ para hallar un valor aproximado de $1,003^9$ y compárelo con el valor de la calculadora.
- 36) a) Desarrolle $(10 + x)^4$.
- b) A partir de lo anterior, halle el valor exacto de $10,1^4$.

Ejercicios de clase

- 37) a) Desarrolle $(2 + x)^5$.
- b) Tomando $x = 0,01$, halle el valor exacto de $2,01^5$.
- 38) Exprese $(\sqrt{3} - 2)^3$ en la forma $a\sqrt{3} + b$, con $a, b \in \mathbb{Z}$.
- 39) El coeficiente de x en el desarrollo de $(x + \frac{1}{ax^2})^7$ es $\frac{7}{3}$. Halle los valores posibles de a .
- 40) Halle los tres primeros términos del desarrollo de $(1 - 2x)^5(1 + x)^7$ en potencias ascendentes de x .
- 41) Cuando se desarrolla $(1 + \frac{x}{2})^n$, con $n \in \mathbb{N}$, en potencias ascendentes de x , el coeficiente de x^3 es 70.
- Halle el valor de n .
 - Halle el coeficiente de x^2 .

(Libro) Oxford: ejercicio 11, preguntas 4, 6, 7 y 8 (pág. 61), y repaso del capítulo 1, pregunta 15 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 761 y 762.

3.3. Exponentes negativos y fraccionarios

En el Nivel Superior el binomio se extiende a cualquier exponente racional, con dos diferencias: el desarrollo no termina nunca y solo vale para algunos valores de x .

Definición

Para $n \in \mathbb{Q}$ y $|x| < 1$:

$$(1 + x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots$$

Si n es natural, los coeficientes acaban siendo 0 y se recupera el desarrollo del subapartado anterior.

Atención

Este desarrollo no está en el cuadernillo (el cuadernillo trae el binomio con n natural, nC_r y nP_r): hay que sabérselo, con su condición de validez.

Ejemplo

Desarrolle $\sqrt[3]{1+3x}$ hasta x^3 e indique para qué valores de x es válido.

Con $n = \frac{1}{3}$ y $3x$ en el lugar de x :

$$\begin{aligned}(1+3x)^{1/3} &= 1 + \frac{1}{3}(3x) + \frac{\frac{1}{3}(-\frac{2}{3})}{2}(3x)^2 \\ &\quad + \frac{\frac{1}{3}(-\frac{2}{3})(-\frac{5}{3})}{6}(3x)^3 + \dots \\ &= 1 + x - x^2 + \frac{5}{3}x^3 + \dots\end{aligned}$$

Vale para $|3x| < 1$, es decir, para $|x| < \frac{1}{3}$.

Método

Si el primer término no es 1. Se saca factor común: $(a+bx)^n = a^n \left(1 + \frac{b}{a}x\right)^n$, que vale para $\left|\frac{b}{a}x\right| < 1$.

$$\begin{aligned}\sqrt{4+x} &= 2 \left(1 + \frac{x}{4}\right)^{1/2} \approx 2 + \frac{x}{4} - \frac{x^2}{64}, \quad |x| < 4 \\ \sqrt{4,1} &\approx 2 + 0,025 - 0,00015625 = 2,02484 \dots\end{aligned}$$

La calculadora da $\sqrt{4,1} = 2,024846 \dots$: con tres términos coinciden las cinco primeras cifras decimales.

Errores frecuentes

- $\sqrt{4+x}$ no empieza por 1: se saca antes el 4, y queda $2 \left(1 + \frac{x}{4}\right)^{1/2}$.
- La validez de $\left(1 + \frac{x}{4}\right)^{1/2}$ es $\left|\frac{x}{4}\right| < 1$, es decir, $|x| < 4$, no $|x| < 1$.
- En $\frac{n(n-1)}{2!}$ con $n = \frac{1}{3}$, el factor $n-1$ es $-\frac{2}{3}$: el coeficiente sale negativo.

Ejercicios

- 42) Desarrolle hasta x^3 e indique para qué valores de x es válido: a) $(1+4x)^{-2}$. b) $\sqrt[4]{1+8x}$.
- 43) a) Halle los tres primeros términos del desarrollo de $\frac{1}{\sqrt{9+x}}$ e indique para qué valores de x es válido.
- b) A partir de lo anterior, halle un valor aproximado de $\frac{1}{\sqrt{9,09}}$.

(Libro) Oxford: ejercicio 1J, todas las preguntas (pág. 65), y repaso del capítulo 1, preguntas 4 b) y 16 (págs. 68 y 69; la 16 necesita las fracciones simples, que todavía no están en ninguna unidad). Soluciones del libro en las páginas 761 y 762.

4. Práctica tipo examen

Preguntas con el formato del IB: cada una lleva su puntuación máxima y cada parte, sus puntos entre corchetes. El formato de las pruebas, los términos de instrucción y los códigos de las soluciones se explican en el apartado 5 de la unidad 1. El recuento suele ir en la prueba 2, porque la calculadora da nC_r y nP_r ; el binomio sale en las dos. En un término concreto del binomio, el esquema de calificación suele dar **M1 A1** por el término general, **A1** por el valor de r y **A1** por el resultado.

4.1. Prueba 1: sin calculadora

Ejercicios

- 44) **[Puntuación máxima: 6]** El desarrollo de $(1 + kx)^n$, con $n \in \mathbb{Z}^+$, empieza así:

$$1 + 24x + 252x^2 + \dots$$

Halle n y k .

- 45) **[Puntuación máxima: 7]** Se ordenan las siete letras de la palabra ESTADIO.

- Halle cuántas ordenaciones empiezan y terminan por vocal. **[2]**
- Halle en cuántas van juntas las tres consonantes. **[2]**
- Halle cuántas empiezan por consonante. **[3]**

- 46) **[Puntuación máxima: 7]**

- Desarrolle $(1 + \frac{x}{2})^{-3}$ hasta x^2 e indique para qué valores de x es válido. **[4]**
- Halle el coeficiente de x^2 en el desarrollo de $(1 + 3x)(1 + \frac{x}{2})^{-3}$. **[3]**

- 47) **[Puntuación máxima: 5]** Demuestre que ${}^{2n}C_2 = 2 \cdot {}^nC_2 + n^2$ para todo entero $n \geq 2$.

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 1, preguntas tipo examen 18 y 20 (pág. 69). Soluciones del libro en las páginas 764 y 765.

4.2. Prueba 2: con calculadora

Ejercicios

- 48) **[Puntuación máxima: 7]** Un club tiene 10 chicas y 8 chicos, y se elige un equipo de 6.

- Halle cuántos equipos distintos se pueden formar. **[1]**
- Halle cuántos tienen exactamente 3 chicas. **[2]**
- Halle cuántos tienen al menos 2 chicos. **[4]**

- 49) **[Puntuación máxima: 6]**

- Escriba el término general del desarrollo de $(4 + 3x)^8$. **[2]**
- Halle el término del desarrollo que tiene el mayor coeficiente. **[4]**

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 1, preguntas tipo examen 17, 24 y 25 (pág. 69). Soluciones del libro en las páginas 764 y 765.

4.3. Prueba 3: Nivel Superior

Ejercicios

- 50) **[Puntuación máxima: 15]** Newton calculaba raíces con su desarrollo del binomio. En esta pregunta se aproximan $\sqrt{2}$ y $\sqrt{5}$.

- a) Escriba los cuatro primeros términos del desarrollo de $(1 + x)^{1/2}$ e indique para qué valores de x es válido. **[3]**
- b) Explique por qué no conviene aproximar $\sqrt{2}$ con $x = 1$ en ese desarrollo. **[1]**
- c) Muestre que $\left(\frac{7}{5}\right)^2 \left(1 + \frac{1}{49}\right) = 2$ y deduzca que $\sqrt{2} = \frac{7}{5} \left(1 + \frac{1}{49}\right)^{1/2}$. **[2]**
- d) A partir de lo anterior, halle un valor aproximado de $\sqrt{2}$ con los cuatro términos de a). **[3]**
- e) Halle el error absoluto de la aproximación de d). **[2]**
- f) Muestre que $\sqrt{5} = \frac{9}{4} \left(1 - \frac{1}{81}\right)^{1/2}$ y halle un valor aproximado de $\sqrt{5}$ con los cuatro términos de a). **[4]**