

Unidad 4: Métodos de demostración

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

1. Demostración directa	2
1.1. Igualdades e identidades	2
1.2. Pares, impares y múltiplos	3
2. Inducción matemática	5
2.1. El principio de inducción	5
2.2. Divisibilidad	7
2.3. Recurrencias y otros casos base	8
2.4. Desigualdades	9
3. Contradicción y contraejemplo	10
3.1. Demostración por contradicción	10
3.2. Contraejemplos	11
4. Práctica tipo examen	12
4.1. Cómo se puntúa una demostración	12
4.2. Prueba 1: sin calculadora	13
4.3. Prueba 2: con calculadora	13
4.4. Prueba 3: Nivel Superior	14

1. Demostración directa

Un resultado matemático no se acepta porque funcione en unos cuantos casos: se acepta cuando está **demostrado**, es decir, cuando se deduce paso a paso de lo que ya se sabe. El IB pide tres maneras de demostrar y una de refutar: la demostración directa, de este apartado; la inducción, del apartado 2, y la contradicción y el contraejemplo, del apartado 3. Los enunciados usan los términos de instrucción del IB: «Muestre que» pide los pasos que llevan a un resultado que ya da el enunciado, y «Demuestre», una cadena de pasos lógicos con todo el rigor.

1.1. Igualdades e identidades

Definición

- Una **ecuación** es una igualdad que solo se cumple para algunos valores: $x^2 = 5x$ solo es cierta para $x = 0$ y para $x = 5$.
- Una **identidad** es una igualdad que se cumple para todos los valores de sus variables. El IB la escribe con el signo $\equiv$, «idéntico a»: $(x - 4)^2 \equiv x^2 - 8x + 16$.

Demostrar una identidad es mostrar que sus dos miembros son la misma expresión escrita de dos maneras. El IB pide un esquema concreto: ir de un miembro al otro.

Método

Demostrar una identidad: de un miembro al otro.

1. Se parte de uno de los miembros, normalmente el más complicado.
2. Se transforma con pasos válidos (desarrollar, sacar factor común, operar fracciones, aplicar propiedades) hasta llegar exactamente al otro miembro.
3. Si es más cómodo, se transforma cada miembro por separado hasta llegar a la misma expresión.

Ejemplo

Muestre que $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \equiv \frac{2}{n(n+2)}$.

Se parte del miembro izquierdo y se llega al derecho:

$$\begin{aligned}\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} &= \frac{(n+2) - n}{n(n+2)} \\ &= \frac{2}{n(n+2)}\end{aligned}$$

La demostración también puede ser numérica: se parte de un número escrito de una forma y se llega a la otra.

$$\log_4 80 - \log_4 5 = \log_4 16 = 2$$

Errores frecuentes

- Escribir $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} = \frac{2}{n(n+2)}$, multiplicar los dos miembros por $n(n+2)$ y llegar a $2 = 2$ no demuestra nada: da por cierta la igualdad desde la primera línea.

- Comprobar la identidad con $n = 1$, $n = 2$ y $n = 3$ no la demuestra: solo demuestra esos tres casos.

Ejercicios

1) Muestre que:

$$a) (n+5)^2 - (n-5)^2 \equiv 20n$$

$$b) \frac{4}{x-1} - \frac{4}{x+3} \equiv \frac{16}{(x-1)(x+3)}$$

$$c) (x+1)^3 - (x-1)^3 \equiv 6x^2 + 2$$

2) Muestre que $n(n+1)(n+2) - (n-1)n(n+1) \equiv 3n(n+1)$.

3) Muestre que:

$$a) \frac{5}{\sqrt{21}-4} = \sqrt{21} + 4$$

$$b) \sqrt{7+4\sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$$

$$c) \log_3 162 - \log_3 2 = 4$$

4) Para demostrar que $\frac{a}{a-1} - \frac{1}{a+1} \equiv \frac{a^2+1}{a^2-1}$, alguien escribe:

$$\begin{aligned} \frac{a}{a-1} - \frac{1}{a+1} &= \frac{a^2+1}{a^2-1} \\ \Rightarrow a(a+1) - (a-1) &= a^2+1 \\ \Rightarrow a^2+1 &= a^2+1 \end{aligned}$$

- Explique por qué no es una demostración válida.
- Escriba una demostración correcta.

(Libro) Oxford: ejercicio 1E, preguntas 1, 4, 5, 7 y 8 (pág. 40), y repaso del capítulo 1, pregunta 4 a) (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 756 y 762.

1.2. Pares, impares y múltiplos

Para demostrar algo de todos los enteros de un tipo, se escriben con una letra.

Definición

Con $k \in \mathbb{Z}$:

- Un número **par** se escribe $2k$, y uno **impar**, $2k+1$.
- Un **múltiplo** de 5 se escribe $5k$.
- Tres enteros **consecutivos** se escriben n , $n+1$ y $n+2$.
- Al dividir un entero entre 3 el resto es 0, 1 o 2: todo entero es de la forma $3k$, $3k+1$ o $3k+2$.

Ejemplo

Demuestre que el producto de dos impares consecutivos es una unidad menor que un múltiplo de 4.

Dos impares consecutivos son $2k-1$ y $2k+1$, con $k \in \mathbb{Z}$, y

$$(2k - 1)(2k + 1) = 4k^2 - 1,$$

donde $4k^2$ es múltiplo de 4. Por ejemplo, $7 \cdot 9 = 63 = 64 - 1$.

Ejemplo

Demuestre que el cuadrado de un entero que no es múltiplo de 3 es una unidad mayor que un múltiplo de 3.

Si no es múltiplo de 3, el entero es $3k + 1$ o $3k + 2$. Se estudian los dos casos:

$$\begin{aligned}(3k + 1)^2 &= 9k^2 + 6k + 1 \\ &= 3(3k^2 + 2k) + 1 \\ (3k + 2)^2 &= 9k^2 + 12k + 4 \\ &= 3(3k^2 + 4k + 1) + 1\end{aligned}$$

Errores frecuentes

- Dos impares cualesquiera no son $2k + 1$ y $2k + 1$, que con la misma letra son el mismo número, sino $2k + 1$ y $2m + 1$.
- $5 \cdot 7 = 35 = 36 - 1$ y $11 \cdot 13 = 143 = 144 - 1$ no demuestran el primer ejemplo: son dos casos, y hacen falta todos.

Ejercicios

- 5) Demuestre que:
 - a) La suma de tres múltiplos de 3 consecutivos es múltiplo de 9.
 - b) Si a es par y b es impar, $a^2 + b^2$ es impar.
- 6) Demuestre que un número de dos cifras más el que resulta de invertir sus cifras es siempre múltiplo de 11.
- 7) Demuestre que el producto de tres enteros consecutivos, más el entero del medio, es el cubo de ese entero.
- 8)
 - a) Demuestre que el producto de dos enteros consecutivos es par.
 - b) A partir de lo anterior, demuestre que el cuadrado de cualquier impar es una unidad mayor que un múltiplo de 8.

Ejercicios de clase

- 9) **(Ficha de potencias, 3)** Demuestre que, si a y b son dos enteros consecutivos, $a^2 + b^2 + (ab)^2$ es un cuadrado perfecto.
 - 10) **(Ficha de potencias, 4)** Investigue en qué cifras pueden terminar los cuadrados y los cubos de los enteros.
- (Libro)** Oxford: ejercicio 1E, preguntas 2, 3 y 6 (pág. 40). Soluciones del libro en la página 756. Las páginas son las impresas al pie del libro.

2. Inducción matemática

Una fórmula para una suma, una divisibilidad, una desigualdad o el término general de una sucesión dicen algo de todos los enteros positivos, y no se pueden comprobar uno a uno porque son infinitos. La **inducción matemática** lo resuelve como una fila de fichas de dominó: si cae la primera y cada ficha tira a la siguiente, caen todas.

2.1. El principio de inducción

Definición

Principio de inducción matemática. Sea $P(n)$ una afirmación sobre el entero positivo n . Si $P(1)$ es verdadera y, para cada $k \in \mathbb{Z}^+$, que $P(k)$ sea verdadera implica que $P(k+1)$ lo es, entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

En clase se dice con la misma letra («si se cumple para n , también para $n+1$ ») y se escribe $\forall n \in \mathbb{N}$, «para todo n »; el IB usa otra letra, k , para no confundirla con la n del enunciado.

Método

Las cuatro partes de una demostración por inducción.

1. **Caso base.** Se comprueba $P(1)$, calculando por separado los dos miembros.
2. **Hipótesis.** Se escribe «supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ » y lo que eso significa.
3. **Paso inductivo.** Se escribe $P(k+1)$, que es lo que hay que demostrar, y se llega a ello usando la hipótesis.
4. **Conclusión.** Se escribe la frase completa: « $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$; por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ ».

Ejemplo

Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{r=1}^n (3r-2) = \frac{n(3n-1)}{2}$$

Sea $P(n)$ esa igualdad.

Caso base. Para $n=1$, el miembro izquierdo vale $3 \cdot 1 - 2 = 1$ y el derecho, $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$: $P(1)$ es verdadera.

Hipótesis. Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, es decir:

$$\sum_{r=1}^k (3r-2) = \frac{k(3k-1)}{2}$$

Paso inductivo. Hay que llegar a $\frac{(k+1)(3k+2)}{2}$, que es el miembro derecho con $n=k+1$. La suma hasta $k+1$ es la suma hasta k más el término $r=k+1$, que vale $3k+1$:

$$\begin{aligned}
 \sum_{r=1}^{k+1} (3r-2) &= \frac{k(3k-1)}{2} + 3k+1 \\
 &= \frac{3k^2 + 5k + 2}{2} \\
 &= \frac{(k+1)(3k+2)}{2}
 \end{aligned}$$

Conclusión. $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Atención

Hacen falta las dos partes. Con la afirmación « $n^2 + n$ es impar», el paso inductivo funciona: si $k^2 + k$ es impar, también lo es $(k+1)^2 + (k+1) = (k^2 + k) + 2(k+1)$, porque se le suma un par. Pero el caso base falla, ya que $1^2 + 1 = 2$, y la afirmación es falsa para todo n : $n^2 + n = n(n+1)$ siempre es par (ejercicio 8).

Errores frecuentes

- «Sea $n = k$ » no es la hipótesis; «supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ », sí: el IB no puntúa lo primero.
- En el ejemplo, a la hipótesis se le suma el término $r = k+1$, que es $3k+1$, no el $3k-2$ del término $r = k$.
- Con $n = k+1$, $\frac{n(3n-1)}{2}$ es $\frac{(k+1)(3k+2)}{2}$, no $\frac{k(3k-1)}{2} + 1$: cada n se cambia por $k+1$.
- De $\frac{k(3k-1)}{2} + 3k+1 = \frac{(k+1)(3k+2)}{2}$ no se despeja k : no es una ecuación, vale para todo k .
- Operar a la vez los dos miembros de la igualdad con $n = k+1$ solo vale si las líneas van unidas con $\Leftrightarrow$; lo más seguro es ir de la suma hasta $k+1$ al miembro derecho.
- «Queda demostrado» no es la conclusión: hay que decir que $P(1)$ es verdadera y que $P(k)$ implica $P(k+1)$.

Ejercicios

11) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \sum_{r=1}^n (4r+1) &= n(2n+3) \\
 \text{b) } \sum_{r=1}^n 2 \cdot 3^{r-1} &= 3^n - 1
 \end{aligned}$$

12) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{r=1}^n r(r+2) = \frac{n(n+1)(2n+7)}{6}$$

13) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{r=1}^n \frac{2r+1}{r^2(r+1)^2} = 1 - \frac{1}{(n+1)^2}$$

14) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{r=1}^n r \cdot 3^r = \frac{(2n-1)3^{n+1} + 3}{4}$$

Ejercicios de clase

15) **(Libreta)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

16) **(Ficha de sucesiones, 15)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

17) **(Ficha de sucesiones, 16)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right) \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{n}\right) = n + 1$$

(Libro) Oxford: ejercicio 1G, pregunta 1 y pregunta 2, apartados a, b, e, g, j, k y l (págs. 50 y 51), y repaso del capítulo 1, preguntas 10, 12 y 14 (pág. 68); la 10 usa el factorial y la 14 el binomio, de la unidad 2. El apartado e de la pregunta 2 es la suma de cubos del ejercicio 16, de clase. Soluciones del libro en las páginas 758 y 762.

2.2. Divisibilidad

Para demostrar que una expresión es divisible por m para todo n , la hipótesis se escribe como una igualdad con un entero: $f(k) = mA$, con $A \in \mathbb{Z}$. En el paso se escribe $f(k+1)$ de modo que aparezca $f(k)$, y se sustituye. En clase se escribe también $m \mid f(n)$, « m divide a $f(n)$ ».

Ejemplo

Utilice la inducción matemática para demostrar que $6^n + 4$ es divisible por 5 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Caso base. Para $n = 1$, $6 + 4 = 10 = 5 \cdot 2$.

Hipótesis. Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $6^k + 4 = 5A$ con $A \in \mathbb{Z}$.

Paso inductivo. Como $6^{k+1} = 6 \cdot 6^k$ y $6^k = 5A - 4$:

$$\begin{aligned} 6^{k+1} + 4 &= 6(5A - 4) + 4 \\ &= 30A - 20 \\ &= 5(6A - 4) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 5, porque $6A - 4$ es entero. También se llega sumando y restando:

$$6^{k+1} + 4 = 6(6^k + 4) - 20$$

Conclusión. Es cierto para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k + 1$. Por el principio de inducción matemática, $6^n + 4$ es divisible por 5 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Errores frecuentes

- « $6^k + 4 = 5$ » no es la hipótesis: ser divisible por 5 es ser igual a $5A$ con A entero, no ser igual a 5.
- 6^{k+1} es $6 \cdot 6^k$, no $6^k + 6$ ni 36^k .

Ejercicios

- 18) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$:
- $3^{n+1} + 4^{2n-1}$ es divisible por 13.
 - $n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$ es divisible por 9.
- 19) Utilice la inducción matemática para demostrar que $5^n + 2 \cdot 11^n$ es divisible por 3 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.
- 20) Utilice la inducción matemática para demostrar que $7^n + 3n - 1$ es divisible por 9 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Ejercicios de clase

- 21) **(Ficha de sucesiones, 17)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $2^{2n} - 3n - 1$ es divisible por 9 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

(Libro) Oxford: ejercicio 1G, pregunta 2, apartados h e i (págs. 50 y 51), y repaso del capítulo 1, pregunta 11 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 758 y 762.

2.3. Recurrencias y otros casos base

En la unidad 3 algunas sucesiones se daban con una ley de recurrencia. Los primeros términos sugieren un término general, y la inducción lo demuestra: el caso base es el primer término y el paso usa la ley de recurrencia.

Ejemplo

Una sucesión cumple $u_1 = 2$ y $u_{n+1} = 3u_n - 2$. Utilice la inducción matemática para demostrar que $u_n = 3^{n-1} + 1$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Caso base. $3^0 + 1 = 2 = u_1$.

Hipótesis. Supongamos que $u_k = 3^{k-1} + 1$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$.

Paso inductivo. Con la ley de recurrencia y la hipótesis, u_{k+1} sale con la fórmula para $n = k + 1$:

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= 3u_k - 2 \\ &= 3(3^{k-1} + 1) - 2 \\ &= 3^k + 1 \end{aligned}$$

Conclusión. La fórmula es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k + 1$. Por el principio de inducción matemática, es cierta para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Atención

Dónde empieza. En el IB, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ incluye el 0, a diferencia de Matemáticas I y de lo que se escribe en clase, donde $\mathbb{N}$ empieza en 1, y $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$. Si un enunciado

del IB dice «para todo $n \in \mathbb{N}$ », el caso base es $n = 0$; si dice «para todo entero $n \geq 4$ », es $n = 4$, y la hipótesis se hace para algún $k \geq 4$.

Errores frecuentes

- En «para todo $n \in \mathbb{N}$ » el caso base es $n = 0$, no $n = 1$: en el IB, $\mathbb{N}$ empieza en 0.
- Un caso base que da 0 no falla: 0 es múltiplo de cualquier entero, porque $0 = 5 \cdot 0$.

Ejercicios

- 22) Una sucesión cumple $u_1 = 6$ y $u_{n+1} = 2u_n - 5$.
- Escriba u_2 , u_3 y u_4 .
 - Sugiera una fórmula para u_n .
 - Demuestre esa fórmula por inducción matemática.
- 23) Una sucesión cumple $u_1 = \frac{1}{2}$ y $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n}$. Utilice la inducción matemática para demostrar que $u_n = \frac{1}{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.
- 24) Utilice la inducción matemática para demostrar que $7^n - 1$ es divisible por 6 para todo $n \in \mathbb{N}$.
- 25) Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo entero $n \geq 2$,

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$$

Ejercicios de clase

- 26) **(Ficha de sucesiones, 14)** En cierto país solo hay monedas de 3 y de 5 unidades monetarias. Demuestre que con ellas se puede pagar cualquier cantidad entera mayor o igual que 8.

(Libro) Oxford: ejercicio 1G, pregunta 2, apartados c, d y f, que empiezan en $n = 0$ (págs. 50 y 51). Soluciones del libro en la página 758.

2.4. Desigualdades

La inducción también demuestra desigualdades. El paso cambia: no se llega a una igualdad, sino que se encadenan comparaciones, todas en el mismo sentido, hasta la desigualdad con $n = k+1$. Muchas empiezan en un valor mayor que 1, porque en los primeros no se cumplen.

Ejemplo

Utilice la inducción matemática para demostrar que $3^n > 2n + 1$ para todo entero $n \geq 2$.

Caso base. Para $n = 2$: $3^2 = 9 > 5$. Para $n = 1$ sería $3 > 3$, que es falso: por eso empieza en 2.

Hipótesis. Supongamos que $3^k > 2k + 1$ para algún entero $k \geq 2$.

Paso inductivo. Hay que llegar a $3^{k+1} > 2(k+1) + 1 = 2k + 3$:

$$\begin{aligned} 3^{k+1} &= 3 \cdot 3^k \\ &> 3(2k + 1) \\ &= 6k + 3 > 2k + 3 \end{aligned}$$

La última comparación vale porque $6k > 2k$ para k positivo.

Conclusión. Es cierta para $n = 2$ y, si lo es para un $n = k \geq 2$, también para $n = k + 1$. Por el principio de inducción matemática, es cierta para todo entero $n \geq 2$.

Errores frecuentes

- $3^{k+1} > 6k + 3 > 2k + 3$ demuestra el paso porque las dos comparaciones van en el mismo sentido; con un « $<$ » en medio no se concluye nada.
- Comprobar $n = 1$ no es el caso base: da $3 > 3$, que es falso, y la desigualdad empieza en $n = 2$, el primer valor del enunciado.

Ejercicios

- 27) Utilice la inducción matemática para demostrar que $2^n \geq n + 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- 28) a) Muestre que $5^n > 4^n + 3^n$ es falsa para $n = 2$.
 b) Utilice la inducción matemática para demostrar que $5^n > 4^n + 3^n$ para todo entero $n \geq 3$.

3. Contradicción y contraejemplo

3.1. Demostración por contradicción

Para demostrar una afirmación por **contradicción**, o **reducción al absurdo**, se supone que es falsa y se razona hasta llegar a algo imposible. Un razonamiento correcto no lleva de algo verdadero a algo falso, así que la suposición era falsa: la afirmación es cierta. El ejemplo clásico, la demostración de que $\sqrt{2}$ es irracional, está en la unidad 1 de [Matemáticas I](#).

Método

Demostrar una afirmación por contradicción.

1. Se supone lo contrario de lo que se quiere demostrar, y se escribe con símbolos.
2. Se razona hasta llegar a una contradicción: algo que choca con la suposición o con un hecho conocido.
3. Se concluye: la suposición es falsa, así que la afirmación es verdadera.

Ejemplo

Demuestre por contradicción que $\log_2 7$ es irracional.

Supongamos que es racional. Como es positivo, $\log_2 7 = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}^+$, y entonces:

$$2^{p/q} = 7 \Rightarrow 2^p = 7^q$$

Pero 2^p es par y 7^q es impar, así que no pueden ser iguales. La suposición es falsa: $\log_2 7$ es irracional.

Ejemplo

Demuestre por contradicción que la ecuación $x^3 + x + 1 = 0$ no tiene soluciones enteras.

Supongamos que tiene una solución entera x . Si x es par, x^3 y x son pares, y $x^3 + x + 1$ es impar. Si x es impar, x^3 y x son impares, su suma es par y $x^3 + x + 1$ vuelve a ser impar. En los dos casos $x^3 + x + 1$ es impar y no puede valer 0, que es par. La suposición es falsa: la ecuación no tiene soluciones enteras.

Errores frecuentes

- « $2^p = 7^q$ es imposible porque las bases son distintas» no basta, porque $4^3 = 8^2$; la razón es que uno es par y el otro, impar.
- Llegar a la contradicción y no decir qué se concluye deja la demostración a medias: la última frase dice que la suposición era falsa.

Ejercicios

29) Demuestre por contradicción que son irracionales: a) $\log_5 2$. b) $\log_3 5$.

30) a) Demuestre por contradicción que, si n es entero y n^3 es múltiplo de 3, n es múltiplo de 3.

b) A partir de lo anterior, demuestre por contradicción que $\sqrt[3]{3}$ es irracional.

31) Demuestre por contradicción que $x + \frac{1}{x} \geq 2$ para todo $x > 0$.

32) Demuestre por contradicción que $n^2 + n + 1$ no es un cuadrado perfecto para ningún $n \in \mathbb{Z}^+$.

33) Se quiere demostrar que la ecuación $x^3 + 3x + 1 = 0$ no tiene soluciones racionales.

a) Suponga que tiene una solución racional $x = \frac{p}{q}$, con la fracción irreducible, y muestre que $p^3 + 3pq^2 + q^3 = 0$.

b) Estudiando si p y q son pares o impares, llegue a una contradicción.

(Libro) Oxford: ejercicio 1F, preguntas 1 a 9 (pág. 44), y repaso del capítulo 1, preguntas 7 y 8 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 757 y 762.

3.2. Contraejemplos

Una afirmación general, del tipo «para todo...», es falsa en cuanto falla en un solo caso: ese caso es un **contraejemplo**. Al revés no funciona: por muchos casos que se comprueben, no se demuestra nada.

Ejemplo

Muestre que la afirmación « $n^2 - n + 11$ es primo para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ » es falsa.

De $n = 1$ a $n = 10$ salen 11, 13, 17, 23, 31, 41, 53, 67, 83 y 101, todos primos. Pero con $n = 11$ sale un número que no es primo, así que $n = 11$ es un contraejemplo:

$$11^2 - 11 + 11 = 121 = 11^2$$

Errores frecuentes

- $n = 9$ no es un contraejemplo de «si n es primo, n es impar», porque 9 no es primo; el contraejemplo es $n = 2$, primo y par.
- Diez casos que funcionan no demuestran nada: la afirmación del ejemplo se cumple de $n = 1$ a $n = 10$ y falla en $n = 11$.

Ejercicios

34) Utilice un contraejemplo para mostrar que cada afirmación es falsa:

- Si $a^2 = b^2$, entonces $a = b$.
- Si $a > b$, entonces $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.
- $\sqrt{x^2} = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- La suma de dos irracionales es irracional.
- $\log(a + b) = \log a + \log b$ para todo $a, b > 0$.

35) a) Muestre que $2^{11} - 1 = 23 \cdot 89$.

b) A partir de lo anterior, muestre que es falsa la afirmación «si n es primo, $2^n - 1$ es primo».

36) Demuestre cada afirmación o dé un contraejemplo:

- $n^2 + 1$ no es múltiplo de 3 para ningún $n \in \mathbb{Z}$.
- $2^n > n^2$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.
- Si a y b son irracionales, ab es irracional.
- El producto de cuatro enteros consecutivos más 1 es un cuadrado perfecto.

(Libro) Oxford: ejercicio 1F, pregunta 10 (pág. 44), ejercicio 1G, pregunta 3, en la que hay que demostrar o refutar (págs. 50 y 51), y repaso del capítulo 1, pregunta 9 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 757, 758 y 762.

4. Práctica tipo examen

Preguntas con el formato del IB: cada una lleva su puntuación máxima y cada parte, sus puntos entre corchetes. El formato de las pruebas, los términos de instrucción y los códigos de las soluciones se explican en el apartado 5 de la unidad 1. Las demostraciones salen sobre todo en la prueba 1, porque no necesitan calculadora, pero pueden aparecer en las tres.

4.1. Cómo se puntúa una demostración

En «Muestre que» y en «Demuestre» el resultado está en el enunciado, así que lo que puntúa es el camino: la última línea, que coincide con lo que se pedía, lleva **AG** y no suma. Si el enunciado dice «por inducción» o «por contradicción», hay que usar ese método; si solo dice «Demuestre», hay que decir cuál se usa.

Ejemplo

Demuestre por contradicción que $\log_6 7$ es irracional. [4]

Supongamos que $\log_6 7 = \frac{p}{q}$, con $p, q \in \mathbb{Z}^+$ **M1**. Entonces $6^{p/q} = 7$, así que $6^p = 7^q$ **A1**. Pero 6^p es par y 7^q es impar **R1**: contradicción, así que $\log_6 7$ es irracional **R1**.

En los esquemas de calificación, una demostración por inducción de seis puntos se reparte así:

Parte	Código	Qué hace falta
Caso base	A1	Calcular los dos miembros, no solo decir que «se cumple».
Hipótesis	M1	«Supongamos que es verdadera para $n = k$ »; «sea $n = k$ » no puntúa.
Paso inductivo	M1	Escribir el caso $n = k + 1$ usando la hipótesis.
	A1 A1	El álgebra correcta hasta llegar a la expresión con $n = k + 1$.
Conclusión	R1	La frase completa; solo puntúa si se han ganado suficientes puntos en el resto.

4.2. Prueba 1: sin calculadora

Ejercicios

- 37) **[Puntuación máxima: 7]** Utilice la inducción matemática para demostrar que $5^{2n} - 3^n$ es divisible por 11 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.
- 38) **[Puntuación máxima: 5]** Demuestre por contradicción que no existen enteros positivos a y b tales que $a^2 - b^2 = 6$.
- 39) **[Puntuación máxima: 13]** Una sucesión cumple $u_1 = 1$ y $u_{n+1} = u_n + 4n$.
- Escriba u_2 , u_3 y u_4 . **[2]**
 - Utilice la inducción matemática para demostrar que $u_n = 2n^2 - 2n + 1$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. **[6]**
 - Muestre que $u_n = n^2 + (n - 1)^2$. **[1]**
 - Demuestre que u_n es impar para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. **[2]**
 - Se conjetura que u_n es primo para todo $n \geq 2$. Utilice un contraejemplo para mostrar que la conjetura es falsa. **[2]**

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 1, preguntas tipo examen 22 y 23 (pág. 69), y examen de práctica, prueba 1, pregunta 11 (pág. 748), que usa el factorial de la unidad 2. Soluciones del libro en las páginas 764, 834 y 835.

4.3. Prueba 2: con calculadora

Ejercicios

- 40) **[Puntuación máxima: 13]** Una sucesión cumple $u_1 = 3$ y $u_{n+1} = 1,5 u_n + 2$.
- Halle u_2 y u_3 . **[2]**
 - Utilice la inducción matemática para demostrar que $u_n = 7 \cdot 1,5^{n-1} - 4$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. **[6]**
 - Halle el menor valor de n para el que $u_n > 1000$. **[3]**
 - Halle el menor valor de n para el que $\sum_{r=1}^n u_r > 10\,000$. **[2]**

4.4. Prueba 3: Nivel Superior

Ejercicios

- 41) **[Puntuación máxima: 15]** Se trazan n rectas en el plano de modo que no haya dos paralelas ni tres que pasen por un mismo punto. Sea R_n el número de regiones en que queda dividido el plano. La figura muestra que $R_3 = 7$.




Figura 1: Con tres rectas, el plano queda dividido en siete regiones.

- Escriba R_1 y R_2 . **[1]**
- Se conjetura que $R_n = 2^n$. Muestre que la conjetura es falsa. **[1]**
- Explique por qué la recta número $n + 1$ queda dividida en $n + 1$ trozos por las anteriores y, a partir de lo anterior, por qué $R_{n+1} = R_n + n + 1$. **[3]**
- Halle R_4 y R_5 . **[2]**
- Utilice la inducción matemática para demostrar que $R_n = \frac{n^2+n+2}{2}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. **[6]**
- Halle el menor valor de n para el que $R_n \geq 1000$. **[2]**

(Libro) Oxford: examen de práctica, prueba 3, pregunta 1 (págs. 752 y 753), sobre una ley de recurrencia, con las torres de Hanói y una inducción; usa también las progresiones de la unidad 3. Soluciones del libro en la página 835.