Unidad 2: Trazados fundamentales en el plano · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. El lenguaje del dibujo geométrico

Los signos

Soluciones

1) a) $\boxed{m \perp t}$.
   b) $\boxed{\overline{CD} < \overline{EF}}$.
   c) $\boxed{a \parallel b}$.
2) Las rectas van con minúscula y los puntos con mayúscula:
   «la recta r corta a la recta s en el punto P».
3) Seis: $\overline{GH}$, $\overline{GJ}$, $\overline{GK}$, $\overline{HJ}$, $\overline{HK}$ y $\overline{JK}$. Cada segmento sale de elegir dos de los cuatro puntos.

2. La regla y el compás

El compás lleva medidas

Soluciones

4) Se siguen los cuatro pasos del método. La comprobación con el transportador no forma parte del trazado: solo sirve para ver que ha salido bien. Una diferencia de un grado es normal; si es mayor, el compás se ha movido entre un paso y otro.
5) No cambia ninguno. El arco del primer paso es más largo, porque los lados están más separados, y el del segundo paso tiene que ser igual de largo o más, para que el tercero lo alcance.
6) a) Falso. El compás guarda la medida en su abertura sin leerla, y así no se añade el error de leer la regla.
   b) Falso. Se cortan en dos puntos, en uno si son tangentes, o en ninguno.
   c) Verdadero. Pero el arco del segundo paso tiene que hacerse con ese mismo radio.

3. Operaciones con segmentos

Diferencia de segmentos

Soluciones

7) Los tres segmentos se llevan uno a continuación de otro desde el origen.
El resultado tiene que medir $25 + 40 + 32 = 97$ mm.

8) Los dos segmentos se llevan desde el mismo origen y hacia el mismo lado.
Lo que sobra mide $68 - 45 = 23$ mm.

9) a) Se lleva u dos veces seguidas y, a continuación, v.
Mide $30 + 30 + 18 = 78$ mm.
b) Se lleva v tres veces seguidas, que son 54 mm, y desde el mismo origen se lleva u. Lo que sobra mide $54 - 30 = 24$ mm.

10) El perímetro es la suma de los tres lados. Se toma cada lado con el compás y se llevan los tres, uno a continuación de otro, sobre la recta. Para comprobarlo, se miden los tres lados con la regla graduada y se suman: tiene que dar lo que mide el segmento dibujado.

4. Mediatriz y perpendiculares

Circunferencia que pasa por tres puntos

Soluciones

11) Se siguen los tres pasos del método, con un radio de unos 50 mm.
La mediatriz corta al segmento en su punto medio, a $76 : 2 = 38$ mm de cada extremo.

12) El arco con centro en F tiene que cortar a la recta en dos puntos: vale un radio de unos 60 mm. Con centro en esos dos puntos y sin cambiar la abertura, se trazan los dos arcos del otro lado. La recta que une su corte con F es la perpendicular. Se comprueba con la escuadra.

13) Se siguen los tres pasos del método. Que la recta esté inclinada no cambia nada: los dos puntos se marcan sobre ella, uno a cada lado de G.

14) La mediatriz del segmento lo parte en dos mitades de 48 mm.
La mediatriz de cada mitad la parte en dos trozos de 24 mm.
En total son tres mediatrices y cuatro partes iguales.

15) Se sigue el método de la perpendicular en el extremo, con el primer arco centrado en K. Los dos puntos y K forman un triángulo rectángulo con catetos de 35 y 84 mm. Como $35^2 + 84^2 = 91^2$,
tienen que quedar a 91 mm uno de otro. Si sale otra medida, la perpendicular está torcida.

16) a) O está en la mediatriz de PQ, que ya está dibujada, y en la de PR.
Queda **fuera** del triángulo, al otro lado de PQ y a unos $36{,}2$ mm de él;
el radio mide unos $53{,}2$ mm. Pasa porque el ángulo en R es obtuso, de unos

$133°$: cuando un triángulo tiene un ángulo obtuso, el centro queda fuera, al otro lado del lado mayor.

b) O es el punto medio de la hipotenusa, que mide 73 mm, y el radio mide $36{,}5$ mm. Pasa en todos los triángulos rectángulos: la hipotenusa es un diámetro de la circunferencia.

17) La mediatriz de la cuerda AB corta a la circunferencia en dos puntos: son los puntos medios de los dos arcos.
El del arco menor queda a 25 mm de la cuerda, y el del mayor, a 49 mm. Entre los dos hay 74 mm, el diámetro, porque la mediatriz pasa por el centro.

18) Los puntos que están a 40 mm de J forman la circunferencia de centro J y radio 40 mm. Los que están a la misma distancia de J que de K forman la mediatriz de JK, que pasa a 30 mm de J. Como $30 < 40$, la mediatriz corta a la circunferencia en dos puntos: hay dos soluciones, una a cada lado del segmento.

5. Paralelas

División de un segmento en partes iguales

Soluciones

19) Con las plantillas: la escuadra ajustada a r, el cartabón de guía y la escuadra deslizada hasta P. Con el compás, el método del apartado.
Las dos rectas tienen que coincidir. Para comprobarlo, mide la distancia entre r y la paralela sobre dos perpendiculares bien separadas: las dos tienen que dar 27 mm.

20) Primero, la perpendicular a s por Q, que es un punto exterior: la recta n, que corta a s en H. Después, la perpendicular a n por Q, que ahora es un punto de la recta. La recta s y la nueva son las dos perpendiculares a n, y
dos perpendiculares a una misma recta son paralelas.
El segmento QH tiene que medir 34 mm. Funciona, pero lleva más trazos que la paralela con regla y compás.

21) Se dibuja un lado de 74 mm. Por sus dos extremos se trazan las perpendiculares con escuadra y cartabón, y en cada una se llevan 43 mm con el compás. El cuarto lado une esas dos marcas y tiene que salir paralelo al primero.
Las dos diagonales tienen que medir lo mismo, unos $85{,}6$ mm; si no, algún ángulo no es recto.

22) Por el extremo A se traza una recta auxiliar bien abierta y se llevan sobre ella siete segmentos iguales, con una abertura cómoda, por ejemplo de 10 mm. El séptimo punto se une con B, y por los otros seis se trazan paralelas a esa recta con escuadra y cartabón. Cada parte mide unos $11{,}9$ mm, una medida que la regla no da: el error de cada marca se iría sumando a las siguientes. Para comprobarlo, la tercera división tiene que quedar a unos $35{,}6$ mm de A.

23) Se hace como la división en partes iguales, pero sobre la recta auxiliar se llevan $2 + 3 + 4 = 9$ segmentos iguales. El noveno punto se une con B, y las paralelas se trazan solo por el segundo y por el quinto. Las partes miden 18, 27 y 36 mm.

24) a) Falso. Son paralelas entre sí.

b) Verdadero. Si a y c se cortaran, por ese punto pasarían dos paralelas a b, y por un punto exterior a una recta solo pasa una.

c) Falso. Con mediatrices salen 2, 4, 8… partes, y el 6 no está en la lista. Hace falta el teorema de Tales.

d) Falso. Se mide sobre la perpendicular, que es el segmento más corto. Cualquier otro mide más.

6. Ángulos

Ángulos con escuadra y cartabón

Soluciones

25) a) $92°83'$. Como $83'$ son $1°23'$, el resultado es $\boxed{93°23'}$.

b) $90° - 61°18' = 89°60' - 61°18' = \boxed{28°42'}$.

c) $180° - 116°49' = 179°60' - 116°49' = \boxed{63°11'}$.

d) $\boxed{26°30'}$, porque medio grado son $30'$.

26) Su alterno interno mide lo mismo, $\boxed{57°}$. Su conjugado interno es su suplementario: $180° - 57° = \boxed{123°}$. De los ocho ángulos, cuatro miden $57°$ y los otros cuatro, $123°$.

27) En C, la paralela y los lados CA y CB forman tres ángulos seguidos que juntos hacen un llano, $180°$. El de en medio es el ángulo C del triángulo. El de al lado de CA es alterno interno del ángulo A, con CA como secante, y mide lo mismo que él. El de al lado de CB es alterno interno del ángulo B, con CB como secante. Así, $\boxed{A + B + C = 180°}$. Para comprobarlo, mide los tres ángulos con el transportador y súmalos: tiene que salir $180°$, con uno o dos grados de error.

28) Para la suma, se llevan los dos ángulos uno a continuación del otro sobre una semirrecta. Para la diferencia, primero β y después α encima, desde el mismo lado. Todos los arcos, con la misma abertura. Con el transportador,
la suma tiene que medir $108°$, y la diferencia, $\boxed{26°}$.

29) La bisectriz lo parte en dos ángulos de $59°$, y la bisectriz de cada uno de ellos, en $\boxed{\text{cuatro de } 29°30'}$. Son tres bisectrices. Medio grado no se aprecia con el transportador: basta con que los cuatro ángulos midan lo mismo, entre $29°$ y $30°$.

30) Forman un ángulo recto. Los dos ángulos adyacentes suman $180°$, y cada bisectriz se queda con la mitad de su ángulo. Entre las dos queda la mitad de $180°$, que es $90°$. Se comprueba con la escuadra.

31) $135°$: sobre una recta se marca el vértice O y se traza por él la perpendicular, que forma dos ángulos rectos. Se traza la bisectriz de uno de ellos. Entre esa bisectriz y la semirrecta del otro lado hay $90° + 45° = \boxed{135°}$. $52°30'$: sobre una semirrecta se construyen, hacia el mismo lado, $45°$ (la bisectriz del ángulo recto) y $60°$ (el triángulo equilátero). Entre los dos lados nuevos quedan $15°$, y la bisectriz de ese ángulo está a $45° + 7°30' = \boxed{52°30'}$ de la semirrecta. Los dos se comprueban con el transportador.

32) Se divide el recto en tres partes: sus lados nuevos forman $30°$ y $60°$ con el primer lado. La bisectriz del tercio del medio forma $45°$, y la bisectriz entre el lado de $30°$ y el de $45°$ forma $30° + 7°30' = \boxed{37°30'}$ con el primer lado. Con el transportador sale entre $37°$ y $38°$.

33) Los arcos con la abertura del primero cortan siempre a $60°$ de cada lado, sea cual sea el ángulo
En el recto, $90° - 60° = 30°$ es justo un tercio; en el de $84°$, $84° - 60° = 24°$ no lo es, porque su tercio mide $28°$.

34) $165°$ es el suplementario de $15°$. Se construye un ángulo de $15°$, $45° - 30°$ como en la tabla, sobre una de las dos semirrectas de la recta. Con la otra semirrecta, ese mismo lado forma $180° - 15° = 165°$. Para comprobarlo, el transportador tiene que dar $165°$ por un lado y $15°$ por el otro. Uno de $50°$, no: sumando y restando $30°$, $45°$, $60°$ y $90°$ solo salen múltiplos de $15°$, y 50 no lo es.

7. Rectas que se cortan fuera del papel

La recta que va al vértice

Soluciones

35) Tiene que pasar por el vértice y formar $17°$ con cada lado. Antes de desdoblar se comprueba con V': la perpendicular desde V' a cada lado mide d.

36) Tiene que pasar por V. Si no pasa, alguna de las tres perpendiculares está torcida: se comprueban con la escuadra.

37) Si d es muy pequeña, las paralelas se cortan cerca del vértice de verdad, y V' también puede quedar fuera del papel. Si es muy grande, V' cae cerca del otro borde y no queda sitio para trazar su bisectriz.
Conviene una d que deje V' más o menos a un tercio del papel.

8. Problemas

Dos condiciones, dos lugares geométricos

Soluciones




Figura 1: Las soluciones de los problemas 38, 39 y 40, sobre el mismo triángulo.

38) El vértice C cumple dos condiciones: está a 64 mm de A y a 56 mm de B. Se dibuja el lado AB, se traza un arco de 64 mm con centro en A y otro de 56 mm con centro

en B, y su corte es C. Los arcos se cortan también al otro lado de AB: esa segunda solución es el mismo triángulo, dado la vuelta.

39) Es la perpendicular a una recta por un punto exterior. Un arco con centro en C corta a AB en dos puntos, y con centro en ellos se trazan los dos arcos del otro lado. El segmento CH tiene que medir unos $47{,}7$ mm.

40) El centro está a la misma distancia de A, de B y de C. Por equidistar de A y de B, está en la mediatriz de AB. Por equidistar de A y de C, está en la mediatriz de AC. El centro O es el corte de las dos, y el radio, la distancia de O a cualquier vértice: unos $37{,}6$ mm. La mediatriz del tercer lado pasa también por O.




Figura 2: Las soluciones de los problemas 41, 42 y 43.

41) X está en r y equidista de E y de F: es el corte de r con la mediatriz del segmento EF. Queda a unos $31{,}9$ mm de D. Para comprobarlo, el compás pinchado en X y abierto hasta E tiene que pasar por F.

42) Se dibuja el lado KL sobre una recta, que se alarga por el lado de K. Por K se traza la perpendicular, con el método del punto de la recta, y sobre ella se lleva el lado: es el vértice N. El cuarto vértice, M, está a 46 mm de N y a 46 mm de L: dos arcos con esa abertura lo dan. Las dos diagonales tienen que medir lo mismo, unos 65 mm.

43) Se marcan tres puntos del arco, T, U y V, y se trazan las mediatrices de los segmentos TU y UV. Se cortan en el centro, O. Funciona porque el centro está a la misma distancia de todos los puntos del arco: equidista de T y de U, así que está en la mediatriz de TU, y lo mismo con U y V. Para comprobarlo, el compás pinchado en O tiene que repasar el arco entero.




Figura 3: Las soluciones de los problemas 44, 45 y 46.

44) El ángulo en C no se puede construir, porque C es justo lo que se busca. Pero los tres ángulos de un triángulo suman $180°$, así que el ángulo en B mide $180° - 45° - 105° = 30°$. Sobre el lado AB se construyen, hacia el mismo lado, $45°$ en A (la bisectriz del ángulo recto) y $30°$ en B (la bisectriz del de $60°$), con el compás o con la escuadra y el cartabón. Los dos lados nuevos se cortan en C. Hay una solución: la del otro lado de AB es el mismo triángulo, dado la vuelta.
AC mide unos $34{,}2$ mm, y BC, unos $48{,}3$ mm. Para comprobarlo, el transportador tiene que dar $105°$ en C.

45) Cada condición da un lugar geométrico. Los puntos que están a 21 mm de r forman dos paralelas a r, una a cada lado: se traza una perpendicular a r, se llevan sobre ella 21 mm hacia cada lado y por esas dos marcas se trazan las paralelas. Los puntos que están a la misma distancia de r que de s forman las bisectrices de los ángulos que forman las dos rectas. Son **dos** rectas, perpendiculares entre sí: la de los ángulos de $60°$ y la de los de $120°$. Cada paralela corta a las dos bisectrices, así que hay **cuatro** soluciones. Si trazas solo una bisectriz, te dejas dos.
Los dos puntos de la bisectriz de los ángulos de $60°$ quedan a 42 mm de O, el doble de 21: el punto, O y el pie de la perpendicular a r forman medio triángulo equilátero. Los otros dos quedan a unos $24{,}2$ mm. Los cuatro salen también con dos paralelas a r y dos a s: son los vértices del rombo que forman.

46) Si los lados se ponen uno a continuación de otro, forman un segmento de 114 mm, el perímetro. Se dibuja ese segmento, MN, y se divide con el teorema de Tales en partes proporcionales a 3, 4 y 5: sobre una recta auxiliar que sale de M se llevan $3 + 4 + 5 = 12$ segmentos iguales, el último punto se une con N y por el tercero y el séptimo se trazan paralelas a esa recta. Cortan a MN en P y en Q, y los trozos MP, PQ y QN son los tres lados: $28{,}5$, 38 y $47{,}5$ mm. El triángulo se levanta sobre PQ: con centro en P y radio PM, y con centro en Q y radio QN, dos arcos que se cortan en R. Hay una solución, y su ángulo mayor, el de P, es recto: como $3^2 + 4^2 = 5^2$, también $28{,}5^2 + 38^2 = 47{,}5^2$. Se comprueba con la escuadra.