

Realizado avaliação do sistema carotídeo-vertebral, bilateral. O registro de imagens em tempo real (Ecografia Bidimensional), Doppler pulsado e Color Doppler, mostrou-se adequado para análise. Imagens armazenadas em arquivos digitais.

SISTEMA CAROTÍDEO DIREITO

- **Carótida comum:** apresenta calibre e velocidades normais; espessura médio-intimal normal = 0,60 mm (VR $\leq$ 0,8 mm).
- **Bulbo:** calibre e velocidades normais; ausência de placas ateromatosas significativas
- **Carótida interna:** calibre e velocidades normais; ausência de placas ateromatosas significativas
- **Carótida externa:** calibre e velocidades normais; ausência de placas ateromatosas significativas
- **Artéria vertebral:** p rvia, com bom fluxo em dire  o encef lica, velocidades normais.

SISTEMA CAROT DEO ESQUERDO

- **Car tida comum:** apresenta calibre e velocidades normais; espessura m dio-intimal normal = 0,65 mm (VR $\leq$ 0,8 mm).
- **Bulbo:** calibre e velocidades normais; aus ncia de placas ateromatosas significativas
- **Car tida interna:** calibre e velocidades normais; aus ncia de placas ateromatosas significativas
- **Car tida externa:** calibre e velocidades normais; aus ncia de placas ateromatosas significativas
- **Art ria vertebral:** p rvia, com bom fluxo em dire  o encef lica, velocidades normais.

- Equipamento: GE VIVID T8.

CONCLUS O

1. **Car tida direita:** P rvia, com espessura m dio-intimal normal, sem sinais de estenoses.
2. **Car tida esquerda:** P rvia, com espessura m dio-intimal normal, sem sinais de estenoses.
3. **Vertebrais:** P rvias, sem sinais de estenoses.