

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

MAT356
Géométrie analytique

Examen final
Hiver 2015

Du mardi 14 avril 2015 à 9 h au mercredi 15 avril 2015 à 9 h.
Professeur : Mario Lambert

Notes : Toute documentation est autorisée.

Toute tentative de plagiat sera sévèrement sanctionnée.

L'examen est d'une durée de 24 heures

et comprend en tout 13 pages et 4 questions.

À la fin de l'examen figure la mention FIN DE L'EXAMEN.

Vérifier attentivement que vous avez en main l'examen complet avant de débiter.

L'examen est sur 100 points et la pondération de chaque question

est écrite entre crochets avant chaque question.

Répondez directement sur le questionnaire dans l'espace prévu.

Tout texte en dehors des espaces prévus ne sera pas corrigé.

Justifier toutes vos réponses.

Les points seront accordés en fonction de la qualité de la démarche.

**Dans toutes les questions faisant intervenir GeoGebra, on prendra
soin de changer les noms des objets pour qu'ils correspondent
à la nomenclature utilisée dans cet examen.**

**Aucun examen ou fichier ne sera accepté une fois
la période de 24 h terminée.**

Bon courage !

IDENTIFICATION DE L'ÉTUDIANT(E)

Nom : PAQUETTE

Prénom : Pier-Luc

Signature :

Matricule : 14058672

Question 1 - [35 points] Considérons l'équation du deuxième degré $-7x^2 - 4xy + 6y^2 + 0x + 4y + 9 = 0$.

[3] Calculer Γ , ∂ puis Δ .

Réponse:

[3] Déduire de la partie précédente si la conique est une ellipse, une hyperbole, une parabole, un cercle, un point ou une paire de droites (confondues, parallèles ou sécantes).

Réponse:

[9] Trouver $\alpha \in \mathbb{R}$ et des constantes réelles a' , c' , d' , e' et f de telle sorte que la conique puisse s'écrire sous la forme $a'X^2 + c'Y^2 + 2d'X + 2e'Y + f = 0$. Arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

Réponse:

[9] Trouver $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ et une constante réelle f' de telle sorte que l'équation de la partie précédente puisse s'écrire sous la forme $a'\mathcal{X}^2 + c'\mathcal{Y}^2 + f' = 0$. Arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

Réponse:

[4] Réécrire la conique sous sa forme canonique ($\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$ pour une ellipse, par exemple) et déterminer, lorsqu'elle est définie, l'excentricité de celle-ci.

Réponse:

[7] Soumettre un fichier 14058672_Q1.ggb à l'aide de Moodle où vous aurez représenté :

1. la conique ;
2. ses sommets, si elle en a ;
3. ses directrices, si elle en a ;
4. ses asymptotes, si elle en a ;
5. ses axes focal et non focal, si elle en a ;
6. son centre, si elle en a.

Réponse:

Question 2 - [20 points]

[5] Soit $x\mathcal{O}y$ le repère cartésien usuel. On a effectué une transformation d'axes sur ce repère en translatant l'origine en $(-5, 3)$. Ensuite, on a fait subir aux axes une rotation d'un angle $\alpha = \arctan \frac{2}{13}$. Sachant que les coordonnées du point $P = (5, -15)$ sont données par rapport au nouveau système d'axes, déterminer les coordonnées de P par rapport à l'ancien système d'axes. Arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

Réponse:

[5] Soit $x\mathcal{O}y$ le repère cartésien usuel. On a effectué une transformation d'axes sur ce repère en translatant l'origine en $(-5, 11)$. Ensuite, on a fait subir aux axes une rotation d'un angle $\alpha = \arctan \frac{3}{14}$. Sachant que les coordonnées du point $P = (-10, 2)$ sont données par rapport à l'ancien système d'axes, déterminer les coordonnées de P par rapport au nouveau système d'axes. Arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

Réponse:

[10] Soient $\Gamma : f(x, y) \equiv 10x^2 + 6x * y + 9y^2 + 6x + 2y - 10 = 0$ et $\Gamma' : g(x, y) \equiv 10x^2 + 6x * y + 9y^2 + 18x + 8y + 4 = 0$ et A et B les points d'intersection de Γ et Γ' . Montrer que $f(x, y) - g(x, y) = 0$ est l'équation de la droite passant par A et B puis calculer celle-ci.

Réponse:

Question 3 - [35 points] À l'aide de GeoGebra,

1. représenter la courbe $y^2 = 32x$, puis le point $P = (5, 0)$;
2. entrer « $m = 8$ » dans le champ de saisie puis, en choisissant « propriétés » après avoir fait un clic droit sur l'objet ainsi créé, afficher un curseur d'intervalle $[-10, 10]$, d'incrément 0,01 et de largeur 400 ;
3. construire la droite D de pente m passant par le point P (pour obtenir les coordonnées en x et en y d'un point A , on saisit simplement $x(A)$ et $y(A)$ dans le champ de saisie) ;
4. construire les points M_1 et M_2 d'intersection de cette droite avec la courbe, puis le point M , milieu du segment M_1M_2 , en prenant soin d'activer la trace de ce dernier point.

[10] Montrer algébriquement que les coordonnées de M sont $x = 5 + \frac{2 \cdot 8}{(8)^2}$ et $y = \frac{2 \cdot 8}{8}$.

Réponse:

[10] Déterminer algébriquement le lieu géométrique que crée M lorsqu'on fait varier m .

Réponse:

[15] Soumettre un fichier 14058672_Q3.ggb à l'aide de Moodle où vous aurez représenté :

1. la conique ainsi créée ;
2. ses sommets, si elle en a ;
3. ses directrices, si elle en a ;
4. ses asymptotes, si elle en a ;
5. ses axes focal et non focal, si elle en a ;
6. son centre, si elle en a.

Réponse:

Question 4 - [10 points] Vrai ou faux. Justifier.

[5] Soit $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$ une courbe de genre $\partial \neq 0$. Soit $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ une solution du système d'équations

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -d \\ -e \end{pmatrix}.$$

Si $f' = dx_0 + ey_0 + f$, alors $f' = \frac{\Delta}{\partial}$.

Réponse:

[5] La courbe $-11x^2 - 16xy - 13y^2 + 0x + 18y + 12 = 0$ admet un centre de symétrie. Si c'est vrai, le calculer et si c'est faux, expliquer pourquoi elle n'en admet pas.

Réponse:

Fin de l'examen
L'examen comporte 100 points
Bonne chance !