

黎曼标准模型：连续与离散世界观的对话

基于离散同步演化的计算宇宙假说


中文逐章修订 · 累计稿（已完成第 0、1、2、3、4 章） · 2026-09-23

摘要

本文提出“黎曼标准模型”（RSM）这一假设性研究框架，探索微观离散动力学如何形成宏观连续描述。受黎曼零点的谱统计联系及作者已发表的非自治映射数值研究启发，框架假设部分结构参数随内部演化缓慢变化，并以 $1/\ln^2(R/R_*)$ 为主要候选响应，其中 R 为内部演化坐标， R_* 为同量纲参考尺度。框架以离散状态、同步更新和辛结构组织动力学，将状态关联、局部传播与有效参数演化纳入同一研究构想，并在工程层面提出以实体—组件—系统（ECS）组织模拟实现的方案。作为在连续模型时间下演化的可计算基准，我们构造内部时钟与非线性格点共享的哈密顿量，得到双向反馈和一致的能量收支。在纯包络、固定有限格点及指定正能量分支下，时钟速度趋于正极限，回复系数相对常数极限保留预设的逆对数平方晚时形式；长波展开与数值比较建立了指定条件下的格点—连续场连接。接入真实零点间距残差后，八个评价块的能量交换指标均位于替代集合的中心95%范围内，尚无特殊算术响应证据；实际驱动匹配与检出能力仍待完善。精细结构常数、宇宙膨胀及量子现象是这一框架的后续检验方向，真实物质相互作用和引力—量子统一尚未从算术结构导出。本文据此提出一条由结构假设、条件推导通向数值与观测检验的研究路线。


关键词： 黎曼零点；非自治动力学；逆对数平方响应；离散同步演化；辛结构；微观—宏观连接

图 A: RSM 总体构架



图A: RSM 总体构架。算术及非自治动力学研究提供启发；逆对数平方响应作为输入假设进入内部时钟与离散格点的候选模型。状态关联的逻辑描述与局部传播的空间描述分列，二者和量子关联、真实时空的物理对应仍待建立。下方列出目前已完成的时钟—格点双向反馈、长波连续近似和算术残差对照；ECS 表示拟议的工程组织方案，当前基准程序尚不等于完整ECS引擎。章号指向沿用原文顺序的中文稿。

图 B: RSM 想法的来源与检验路径



图B: RSM 想法的来源与检验路径。黎曼零点谱统计背景和作者已发表的非自治映射数值研究，启发但不唯一推出 $1/\ln^2(R/R_*)$ 候选响应。实线仅连接给定模型内已定义、推导或计算的环节；虚线表示启发、额外假设及尚待建立的物理桥接。现有八个真实零点块的终点能量交换未相对于预定替代集合显示特殊响应；此结论受检验量、对照匹配和检出能力限制。真实物质耦合及内部坐标与宇宙时间的标定完成后，才能进一步以原子钟、光谱和宇宙膨胀史检验特定物理模型。

目录

摘要	1
图 A: RSM 总体构架	2
图 B: RSM 想法的来源与检验路径	3
第0章 介绍：从算术动力学到物理框架	6
I. 研究背景：离散演化、连续描述与参数变化	6
II. 动力学来源：黎曼结构与非自治响应	6
III. 形式化：宇宙同步架构	7
IV. 数学框架：辛结构、反馈与连续描述	8
V. 数值依据与观测接口	9
VI. 预测与解释：把整体设想转成具体问题	10
VII. 黎曼引擎：用于检验框架的计算平台	10
VIII. 本文的研究路线与章节安排	11
第1章 系统异常：物理问题与研究动机	12
1.1 引言：观测分歧提出了什么问题	12
1.2 第一朵乌云：膨胀率推断与物理时钟	12
1.3 第二朵乌云：真空能与跨尺度引力描述	13
1.4 从工程诊断到共同响应的检验	14
1.5 小结：从异常线索走向动力学构造	16
第2章 源代码：算术结构与非自治动力学	17
2.1 启动规则：从素数筛到离散编码	17
2.2 动力学逆向研究：带合并点及其适用范围	18
2.3 对数尺度与系数：怎样理解约12.73	19
2.4 黎曼零点、谱统计与非自治响应	20
2.5 小结：从离散规则进入物理架构	23
第3章 形式化：宇宙同步架构	24
3.1 架构综合：从元胞自动机到同步演化	24
3.2 离散状态系统与已有更新基准	24
3.3 两层同步：状态关联与物理因果	26
3.4 架构小结：把状态、动力学与观测连接起来	28
第4章 数学框架：辛演化与离散—连续映射	29
4.1 离散演化算符：从正则状态到辛更新	29
4.2 从场方程到状态更新：格点与连续描述	31

4.3 离散流形映射：算术输入与宏观描述	33
4.4 影子哈密顿量与截断：误差怎样进入物理解释	34
参考文献	36

第0章 介绍：从算术动力学到物理框架

I. 研究背景：离散演化、连续描述与参数变化

微观相互作用如何形成宏观规律，是连接不同物理尺度的基本问题。本文沿着这一问题提出“黎曼标准模型”（Riemann Standard Model, RSM）：以非线性动力学描述底层状态，以辛结构约束演化，再研究连续场、集体行为和有效参数如何从这些状态中形成。这里的“标准模型”沿用本研究的框架名称；当前目标是建立可以逐步推导和检验的候选体系。

这一设想的特别之处，是把微观结构参数的缓慢演化纳入起点。若有效相互作用受到内部自由度调制，那么只观察物质子系统时，原本固定的系数可能表现出时间依赖。赋予这种变化明确的动力学和物质耦合，已有可变精细结构常数理论提供了建模先例。¹ 本文进一步追问：作者此前算术动力学研究中的逆对数平方形式，能否启发一个兼具反馈、连续描述和可检验后果的物理候选？

常数与宇宙学参数的观测研究为这一问题提供检验入口。精细结构常数 α 的可能变化涉及无量纲耦合；宇宙膨胀则需区分本就随时间演化的 $H(t)$ 与当前值 $H_0 = H(t_0)$ 。例如，Planck在给定宇宙学模型下由早期信号推断今日参数，距离阶梯在另一测量链上估计今日膨胀率；两者不是对两个时代的 $H(t)$ 直接采样。^{2, 3} 本框架因此把观测分歧视为待解释的问题，要求候选动力学同时面对校准、系统误差和背景模型的检验。

本文的研究顺序是：定义离散状态及演化规则，建立微观到宏观的条件联系，再指定实际读数并检验数据。前置图A给出总体构架，图B给出从数学启发到物理检验的路径。本章沿此顺序介绍全篇，并说明哪些环节已有推导和计算，哪些仍属于框架的研究目标。

II. 动力学来源：黎曼结构与非自治响应

II.1 零点、谱统计与已发表前作

黎曼零点与量子谱研究之间的联系，是本框架的思想起点。Montgomery研究了零点的成对关联，Dyson指出其与随机矩阵统计的联系；Odlyzko的数值工作进一步检验了零点间距统计。^{4, 5} Hilbert–Pólya思路及Berry–Keating研究则把问题引向算符谱和经典动力学。⁶ 这些结果提示可以研究算术结构的动力学表示；谱统计相似所确定的信息，仍少于一个真实物质系统所需的哈密顿量和测量规则。

作者已发表的素数研究考察了筛序列与低维二次映射符号动力学之间的对应，并报告相关统计的数值复现。⁷ 随后的零点研究采用非自治二次映射

$$x_{n+1} = 1 - u_n x_n^2, \quad (0.1)$$

通过含逆对数平方主项的参数演化和经验谱校准，建立了与黎曼零点的探索性数值对应。⁸ 这里 n 是映射迭代索引。前作报告的对应具有校准依赖，模型自身的局部间距统计尚未复现高斯酉系综（GUE），也未构造Hilbert–Pólya型物理自伴算符。因此，本文继承的是非自治结构和候选函数形式，并在此基础上另行提出物理建模假设。

II.2 从符号编码到物理自由度

原构想以0、1编码算术序列，并将其作为生成复杂结构的起点。新框架保留这一研究方向，同时明确编码、状态和相互作用的分工：比特串可以表示符号轨道，物理候选还需要说明状态空间、邻接关系、能量及观测映射。当前可计算基准采用经典正则格点自由度；它为研究集体动力学提供载

体，但这些自由度尚未由素数编码唯一导出。

式(0.1)的一维二次映射本身也不等于后文的辛动力学。引入正则坐标、动量和共同哈密顿量，是连接算术启发与物理候选所增加的一步。由此可以分别检验“某种序列能够被动力学表示”和“某种相互作用能够产生真实物理读数”，而不把两个问题的结论相互替代。

II.3 算术输入与可观测响应

黎曼零点在本研究中是固定的数学对象。模型使用的是有限精度零点表及其展开后的间距残差，变化的是驱动状态或对输入的响应。原文关于算术复杂性充当随机性来源的设想，在这里转化为一个可计算问题：保留若干低阶统计后，真实残差的排列是否还会产生不同的宏观读数？

为回答这一问题，真实残差需要与统计匹配的替代输入比较，并预先固定读数和评价区间。这样得到的结果首先约束所选输入一响应关系；进一步连接量子概率，还需要状态制备、测量及相关函数的定义。

II.4 逆对数平方作为明确假设

当前选取的平滑响应为

$$M_{\text{env}}^2(R) = m_0^2 + b \left[\frac{1}{\ln^2(R/R_*)} - \frac{1}{\ln^2(R_i/R_*)} \right], \quad R > R_* > 0. \quad (0.2)$$

R 为内部演化坐标， $R_i > R_*$ 为其初值， R_* 为同量纲参考尺度； M^2 表示格点方程中的线性回复系数， b 控制响应幅度。在当前无量纲基准中， R 与 R_* 均为无量纲量；恢复单位时，对数自变量仍须为无量纲比值。平方指数、耦合位置和参数幅度均属于所选候选，不能直接由谱统计联系确定。

这一选择明确了原稿中不同对数形式的分工：素数密度的逆对数行为、映射参数的逆对数平方演化以及真实物理读数，是三个不同对象。本文以式(0.2)为核心响应，后续再研究何种观测量继承它。零点序号 j 、映射步数 n 、数值步号 k 、内部坐标 R 、模型时间 τ 和宇宙时间 t 分别定义，时间标定本身也是待建立的联系。

III. 形式化：宇宙同步架构

III.1 同步思想与当前基准

RSM保留原文的离散状态和同步更新构想：在一次更新中明确哪些状态被读取、哪些变量被演化，以及更新顺序如何体现相互作用。确定性离散模型与量子描述之间的关系已有独立研究，例如't Hooft的元胞自动机解释。⁹ 本文借鉴这种从状态演化提出问题的方式，采用的具体动力学仍须自行定义和检验。

目前完成的基准在连续模型时间 τ 下演化，并通过离散积分计算轨迹。同步数值更新保证了算法的定义；把更新节拍赋予基本物理时间、尤其普朗克时间的意义，是更强的假设。后者需要检验可观测后果及其与相对论的相容性，不能从一个运行稳定的程序直接确定。

III.2 内部时钟与双向作用

驱动被赋予正则坐标 R 及其动量，因而能够与格点交换能量。整个系统可以具有不显含 τ 的哈密顿量；沿着内部轨迹考察格点时， $M^2(R(\tau))$ 却呈现时间依赖。这样，完整系统的自主性与子系统的

有效非自治响应能够同时存在。子系统的轨迹仍依赖共同演化的时钟，自身并非独立闭合。

当前 R 是全体格点共享的均匀模式。它使反作用可以直接计算，但也带来全局耦合。建立具有局域传播的驱动场，并说明何时可约化为这一均匀模式，是从当前基准推进到物理架构的重要步骤。

III.3 逻辑描述与空间描述

原文区分状态关联的逻辑层与局部传播的空间层。新框架保留这一区分：前者描述状态标识、联合变量和读取规则，后者描述空间邻接与传播。对一个物理候选，还必须说明两层如何共同决定可观测量。共享状态或同时更新可以是程序结构，但量子关联需要实际概率分布，因果性需要可操作的信号定义。相应问题在第3章与第6章分别展开。

IV. 数学框架：辛结构、反馈与连续描述

IV.1 从共同哈密顿量出发

在长度为 L 的周期区间上取 N 个格点，格距为 $a = L/N$ ，并取 $p_\ell = a\dot{q}_\ell$ 、 $P_R = I\dot{R}$ ；点号表示 $d/d\tau$ 。当前基准的共同哈密顿量为

$$H = \frac{P_R^2}{2I} + H_{\text{field}}, \quad (0.3)$$

$$H_{\text{field}} = \sum_{\ell=0}^{N-1} \left[\frac{p_\ell^2}{2a} + \frac{v^2(q_{\ell+1} - q_\ell)^2}{2a} + \frac{a}{2}M^2(R)q_\ell^2 + \frac{ag}{4}q_\ell^4 \right], \quad q_N = q_0.$$

其中 $I > 0$ 为时钟惯量， $v > 0$ 控制近邻传播， $g \geq 0$ 控制局部非线性。纯包络取 $M^2 = M_{\text{env}}^2$ ；算术检验另外加入固定窗化残差，具体定义留待第4章和第8章。正则方程同时给出系数调制与时钟反作用，连续精确演化满足

$$\frac{dH_{\text{field}}}{d\tau} = -\frac{d}{d\tau} \left(\frac{P_R^2}{2I} \right), \quad \frac{dH}{d\tau} = 0. \quad (0.4)$$

式(0.4)说明能量在场与内部时钟之间交换。数值实现采用辛方法并检查能量误差；辛性与逐步精确保存原哈密顿量是不同性质，长期可靠性仍须结合步长、稳定域和误差控制判断。¹⁰

IV.2 反馈下的晚时响应

对纯包络、固定有限格点、有限初始能量，另要求初速度 $u_i = \dot{R}(0) > 0$ 及 $0 < b < m_0^2 \ln^2(R_i/R_*)$ 。在这一分支上，轨迹保持 $R(\tau) \geq R_i$ ，已有推导得到

$$\dot{R}(\tau) \longrightarrow u_\infty > 0, \quad (0.5)$$

$$M_{\text{env}}^2(R(\tau)) - M_\infty^2 \sim \frac{b}{\ln^2(\tau/\tau_{\text{eff}})},$$

其中 $M_\infty^2 = m_0^2 - b/\ln^2(R_i/R_*) > 0$ ， $\tau_{\text{eff}} = R_*/u_\infty$ 。反馈改变有限时间轨迹和参考时间尺度，同时保留预设响应的晚时主导形式。该结果回答的是平方律在特定反馈下能否保持；它没有从辛结构中唯一选出平方指数。含算术残差的轨迹需要另行判断，不能直接套用纯包络分支的单调性结论。完整推导和计算记录已有保存。¹¹

IV.3 从格点到长波场

对足够光滑且在所考察时段内导数受控的场，在长波范围对近邻空间差分作形式展开，可以得到

$$\phi_{\tau\tau} = v^2 \phi_{xx} - M^2(R)\phi - g\phi^3 + \frac{v^2 a^2}{12} \phi_{xxx} + O(a^4). \quad (0.6)$$

这一表达式给出连续主阶和首个格距修正。已有独立求解在指定平滑初态与有限时段比较了格点和连续方程：固定系数基准的主阶空间误差接近二阶，加入首修正后接近四阶；时间积分误差另行测量。¹¹ 高频模式和更长演化时间仍需分别检验。

这使原文“微观离散过程形成宏观连续描述”的设想获得了一个具体实例。当前连续场来自所选经典格点；通向热力学需要统计态和约化规则，通向真实引力或电磁相互作用还需要相应的自由度、对称性与物质耦合。第4章将把这些层次及其成立条件分别列出。

V. 数值依据与观测接口

V.1 算术结构是否带来额外响应

在同一平滑包络上接入真实零点间距残差后，已有计算比较了八个固定评价块。每块包含一条真实输入、99条迭代振幅调整傅里叶变换（IAAFT）替代输入及99条配对精确节点谱输入，再加一条纯包络基线，共1593例。IAAFT用来构造保持指定输入统计的对照。¹²

八个真实块的预设终点能量交换指标均位于两族替代集合的中心95%范围内，当前没有检出特殊算术响应。这里的范围描述所构造的替代集合，并非物理参数置信区间。窗化插值后的实际驱动及其导数尚未严格匹配，检出能力也未量化；因此，这一结果不能解释为各种输入物理等效。它直接确定了下一轮应改进的对照层次。¹¹

V.2 四类物理方向的不同作用

此前围绕常数、膨胀、测量精度与宇宙微波背景开展的项目，为整体框架提供了不同的检验工具。下表概括已保存分析的状态；这些分支尚未构成同一物理机制的联合验证。¹¹

方向	已有分析提供的基础	对当前框架的约束
精细结构常数与原子钟	以同一耦合连接当前漂移和高红移变化，比较不同时间形式。	已有联合拟合与零演化相容，平方指数尚未被独立识别。
宇宙膨胀	使用距离数据、协方差与校准，求解时间—红移—距离关系。	不同候选仍有退化；不能把不同方法的 H_0 摘要值直接串成演化曲线。
零点测量与高红移光谱	区份额外测量不确定度、谱线均值及仪器/气体模型的影响。	已见条件位移尚不足以确定宇宙时间效应；精度假说与均值漂移是不同命题。
宇宙微波背景	格点传递、固定初始谱比较与自由初始场反演。	天图重建可能吸收初值自由度；现有模型尚未匹配整串声学峰。

原稿的统一愿景因而可以保留为共同问题：这些方向是否可能由同一内部动力学联系起来？要使答案具有物理意义，需要先定义各自的响应算子、量纲、背景和共享参数，再处理数据重叠及协方差。函数形式相似提供研究线索，联合约束则要求更具体的机制。

V.3 连接当前漂移与过去变化

以 α 为例，若额外假定内部响应可以映射为同一宇宙时间律，则候选观测接口可写为

$$\begin{aligned}\frac{\alpha(t) - \alpha(t_0)}{\alpha(t_0)} &= \Gamma [\mathcal{L}(t)^{-2} - \mathcal{L}(t_0)^{-2}], \\ \mathcal{L}(t) &= \ln(t/t_*), \quad t > t_* > 0, \\ D_0 &\equiv \left. \frac{d \ln \alpha}{dt} \right|_{t_0} = -\frac{2\Gamma}{t_0 \mathcal{L}(t_0)^3}.\end{aligned}\tag{0.7}$$

Γ 为无量纲响应幅度， t_* 为物理参考时间， t_0 为当前时间；适用域还要求 $\alpha(t) > 0$ 。该接口采用同一低能定义并固定其他相关无量纲常数，真实钟频率比与谱线读数还需通过独立确定的跃迁敏感度转换为 α 约束。在共同、无屏蔽的时间演化假设下，同一幅度必须同时符合原子钟与过去光谱。它不能由“变化很慢”这一描述任意规避当前漂移约束。式(0.7)是额外的物理接口，不是式(0.2)自动产生的宇宙学结论；一般背景应使用实际动力学轨迹和导数。

已有合成恢复实验沿用观测设计检验了幅度估计，但现有设计不能有效区分逆对数的一次、二次和三次形式。¹¹ 因而后续实验既要问是否能检出变化，也要问是否能区分变化形式；原子钟未检出、天文数据相容以及检出能力不足，各自具有不同含义。

VI. 预测与解释：把整体设想转成具体问题

本框架的物理价值取决于可区分的后果。最接近当前计算的检验，是在实际驱动匹配和检出能力明确后，判断新零点块是否产生额外响应；最接近观测的检验，是检查同一组物理参数能否同时解释当前漂移、过去变化和环境依赖。两类检验都应预先确定评价量，保留常数模型及其他时间形式作为对照。

原稿关于量子、真空和引力的解释，在全篇中继续保留为机制问题：

原构想	进一步需要建立的内容
有限分辨率与不确定性	从状态及测量规则计算概率分布和不确定度，区分物理涨落与估计误差。
状态关联与纠缠	指定可制备态、可选择测量和联合概率，并检验Be11相关及无信号条件。
截断结构与真空效应	定义物理能量、参考态及其引力耦合，区分物理截断与数值舍入。
局部演化与引力时间效应	从局域动力学建立钟读数、有效几何及其对称性和守恒关系。
多尺度表示与波粒行为	建立传播、干涉和探测的同一概率模型；自适应数值分辨率仅是实现工具。

例如，Be11研究表明，解释量子关联必须认真处理所采用的局域性等假设。¹³ 程序中的共享地址本身没有给出这些条件下的测量统计。同样，控制数值截断误差并未得到可提取的真空能量。将这些机制明确化，才能判断原构想的哪些部分可以成为物理命题。

VII. 黎曼引擎：用于检验框架的计算平台

黎曼引擎的作用是把假设落实为可复核的计算。设计上采用实体—组件—系统（ECS）划分状态标识、属性数据和演化规则，使算术输入、内部驱动、格点相互作用及观测读数可以分别替换。这样的工程分工有助于比较模型，但不决定宇宙实际采用何种计算组织。

当前已有程序完成了固定系数基准、完整反馈、独立连续参考、零点残差与替代输入比较，以

及合成信号恢复。后续整合应保留四项能力：显式记录初值与假设；分别控制时间、空间和参考求解误差；在相同数据与规则下比较候选；保存未检出、匹配不足和精度失败。¹¹ ECS统一调度、跨硬件逐位一致及自动参数探索仍按设计目标推进，现有基准程序不等于完整引擎已经建成。

计算速度可以帮助扩大对照规模，却不能增加某个模型的物理证据。已有线性传播问题可利用Fourier结构计算末态，其效率优势有特定任务条件；含非线性和反作用的演化需要另外计时与验证。第7章讨论实现组织，第8章用具体案例说明它能检验哪些命题。

VIII. 本文的研究路线与章节安排

本文保留从算术与计算视角研究物理的整体愿景，并以已经建立的时钟一格点模型作为数学与数值起点。目前可以明确陈述的成果是：逆对数平方响应已接入具有双向反馈的共同哈密顿体系；在指定分支下得到晚时保持结果；长波描述已有条件数值比较；真实零点残差已经进入受控计算，其特殊响应尚未检出。真实物理相互作用仍待从算术结构导出。

后续第1章提出物理问题与观测动机，第2章梳理算术及非自治动力学来源，第3章定义同步架构，第4章展开数学模型与微观—宏观联系；第5章处理观测证据与约束，第6章讨论预测及物理解释，第7章给出引擎设计，第8章组织模拟与验证，第9章总结框架及尚待解决的问题。各章共同遵循从输入假设到条件结果、再到独立检验的顺序。

这一安排把原文“从几何到计算”的设想具体化为一项逐步推进的研究：首先让动力学、能量收支和可观测量定义清楚，然后检验算术结构是否具有额外预测能力，最后再判断哪些候选能够连接真实物质和宇宙演化。

第1章 系统异常：物理问题与研究动机

本章提要。 本章沿用原稿的“两朵乌云”：哈勃张力与真空能问题。前者涉及不同测量链在给定模型下的参数一致性，后者涉及微观能量对宏观引力的贡献及其稳定性。两者促使我们重新考察时间标定、结构参数和跨尺度描述。RSM据此提出一个工作假设：部分宏观系数可能是内部动力学的有效响应，并在适当条件下继承逆对数平方的缓慢演化。已有膨胀史、精细结构常数、光谱与CMB研究，使这一设想开始具有具体的检验对象；它们也限定了当前框架能够提出的解释范围。

1.1 引言：观测分歧提出了什么问题

基础框架需要同时解释成功的测量和持续存在的困难。对于宇宙学，这意味着既要面对距离阶梯与早期宇宙推断之间的张力，也要保留标准宇宙学对多种数据的解释能力。观测分歧提供寻找新机制的理由，判断机制是否成立则需要可区分的预测。

JWST提高了部分距离阶梯环节的分辨能力。2025年的一项JWST与HST造父变星联合分析报告 $H_0 = 73.49 \pm 0.93 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ ，支持较高的本地膨胀率。¹⁴ 不同恒星指标和校准路径仍须分别比较。例如，CCHP的HST与JWST红巨星分支尖端（TRGB）路径报告 $70.39 \pm 1.22 (\text{stat}) \pm 1.33 (\text{sys}) \pm 0.70 (\text{SN})$ ，单位相同，后三项分别为该文列出的误差贡献。¹⁵ 因而，“JWST的测量”并非一个脱离样本、恒星模型和距离阶梯构造的唯一数值。

2026年发表的本地距离网络联合分析进一步给出 $H_0 = 73.50 \pm 0.81 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ 。¹⁶ 这是处理共享数据和协方差的网络结果，不能再与其组成部分当作完全独立的测量累加显著性。上述进展使若干具体的系统误差解释受到更强约束，但一次分辨率提升不能排除整个测量链的所有误差，也不能单独决定应修改哪一项物理假设。

本章使用“系统异常”描述这种需要进一步定位的问题。我们关心的是：跨时代推断中，哪些变化来自已知宇宙演化，哪些来自标定或模型选择，哪些才需要新的动力学自由度？后续模型应回答这些问题，并接受同一测量链上的检验。

1.2 第一朵乌云：膨胀率推断与物理时钟

1.2.1 当前值与膨胀历史

以宇宙共动观测者的固有时间 t 定义膨胀率，令 $a_{\text{cos}}(t)$ 为宇宙尺度因子，则

$$H(t) = \frac{1}{a_{\text{cos}}(t)} \frac{da_{\text{cos}}}{dt}, \quad H_0 = H(t_0). \quad (1.1)$$

这里 a_{cos} 与第0章的格距 a 不同。标准宇宙学中的 $H(t)$ 本就随时间变化； H_0 是在选定当前时刻定义参数。Planck基于平直六参数 Λ CDM模型推断 $H_0 = 67.4 \pm 0.5 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ ，而SHOES在2022年报告的距离阶梯值为 $73.04 \pm 1.04 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ 。^{2, 3} 两者都以今日膨胀率为目标。因此，不能把67.4与73.04直接排列成早期与晚期的两次 $H(t)$ 观测，再据此确定一条时间演化曲线。

红移分箱中出现的“有效 $H_0(z)$ ”也需要明确其定义：它通常表示在指定背景函数、校准或拟合方法下，从不同子样本推断的归一化。其趋势可以用于检查模型与数据的一致性，但只有回到红移、距离、声学尺度及其协方差，才能判断趋势要求何种物理变化。

DESI提供了更细致的距离历史检验。2025年的DR2宇宙学分析在特定 $w_0 w_a$ 暗能量模型中，得到随超新星组合变化的演化暗能量偏好。¹⁷ 2026年7月发布、8月修订的DR2 Ly α 森林分析又结合Alcock–Paczynski信息更新了高红移距离约束；其中所列组合的偏好为DESI+CMB下约 2.7σ ，加入该文超新星组合后约 3.2σ 。¹⁸ 这些显著性对应指定模型和数据组合；它们既不直接测量微观常数漂

移，也没有选出 $1/\ln^2 t$ 这一函数。

1.2.2 将“时钟漂移”变为物理假设

原稿以运行中的计算系统作类比，提出时间基准可能受到内部状态影响。要使这一想法进入物理模型，必须定义实际钟读数。例如，设某类原子钟在共同时间 t 上的累计读数为 τ_{at} ，其响应函数为 $C(R) > 0$ ，且今天校准为 $C(R_0) = 1$ ，则

$$d\tau_{\text{at}} = C(R(t)) dt, \quad H_{\text{at}} = \frac{1}{a_{\text{cos}}} \frac{da_{\text{cos}}}{d\tau_{\text{at}}} = \frac{H}{C(R(t))}. \quad (1.2)$$

式(1.2)只是给定读数映射后的链式法则。若所有钟尺及物理过程都随之作同一个时间重参数化，无量纲观测结果不因此改变。可检验的新效应需要不同物理过程之间存在相对响应，例如两个跃迁频率之比改变，或物质时钟与由具体动力学定义的几何关系改变。这样的响应还会进入光子频率、距离标定和可能的声学标尺，不能仅在最终 H_0 上乘一个因子。

RSM现有的内部时钟提供了一种动力学起点： R 与物质子系统共同演化，结构系数随 R 改变，并通过反作用交换能量。第0章所述条件结果表明，预设的逆对数平方响应在特定晚时分支上能够保留。¹¹ 从这里到式(1.2)仍需要真实原子响应、几何和传播机制。“运行时间长”本身不决定漂移方向，熵增长也未被推导成计算负载或钟速下降。

1.2.3 膨胀史小论文提供的进展

在已有膨胀史项目中，我们使用DESI距离产品、Pantheon+完整协方差及造父变星校准，自洽计算时间、红移和距离关系，并比较对数、指数与幂律时间族。¹⁹ 在固定时钟参数及未来归一化为正的分支中，相对于常归一化模型，三者的 $\Delta\chi^2$ 改善约为0.84、4.94和0.84。这里定义 $\Delta\chi^2 = \chi_{\text{baseline}}^2 - \chi_{\text{model}}^2$ ，正值表示拟合改善；它本身不等于发现显著性。指数模型较好的分支对应负斜率；改为要求归一化随时间不减时，其改善降至约1.17。

这些结果说明时间响应能够被放入实际距离似然并与其他形式比较，但当前拟合没有独有地选中平方对数形式。较高的拟合 H_0 主要继承距离阶梯锚点，尚不能据此声称消除了早晚期张力。已有标量背景重建还通过48次独立正向求解恢复拟合的 $H(z)$ ；这检查了指定引力、物质和初值下的背景一致性，完整扰动、早期历史及独立数据检验仍需补齐。¹⁹

1.3 第二朵乌云：真空能与跨尺度引力描述

1.3.1 困难在于小值及其稳定性

真空能问题与哈勃张力的性质不同。它首先是量子场论与引力相接时的理论问题。以自然单位 $\hbar = c = 1$ 为例，一个自由玻色自由度的零点模态和，在硬动量截止 $K_{\text{UV}} \gg m$ 下给出示意估计

$$\rho_{\text{zp}}(K_{\text{UV}}) = \frac{1}{2} \int_{|\kappa| < K_{\text{UV}}} \frac{d^3\kappa}{(2\pi)^3} \sqrt{\kappa^2 + m^2} \sim \frac{K_{\text{UV}}^4}{16\pi^2}. \quad (1.3)$$

这展示了对高能尺度的敏感性。常说的约 10^{120} 量级差异，依赖普朗克尺度等截止估计；它不是量子场论在完成重整化后给出的无参数精确预言。硬三动量截止也不自动给出协变的真空应力张量。²⁰

在包含引力的有效描述中，可示意写成

$$\rho_{\Lambda,\text{eff}} = \rho_{\Lambda}(\mu) + \rho_{\text{vac}}^{\text{ren}}(\mu), \quad (1.4)$$

其中 μ 为重整化尺度，右边两项分别表示引力作用量中的常数项与重整化物质真空贡献；一致计算中的可观测总量不应依赖任意 μ 。核心困难是：为何总量很小，以及纳入粒子阈值、相变和量子修正后，这一小值如何保持稳定。只在某一阶调整能量零点，尚未给出这种稳定机制。²¹

1.3.2 从分层类比到有效作用量

原稿提出微观层与宏观层可能采用不同的能量描述。这一思想可以保留为粗粒化问题：消去哪些自由度，保留哪些可观测量，由此生成怎样的有效作用量和应力张量？物理上需要计算高频自由度对低频系数的贡献，并检验相应的守恒关系。简单删除高频模态或把能量数值归零，并不能完成这一步。

这里也需要区分物理截止与计算精度。物理格距若是理论的一部分，应具有明确单位和可检验后果；积分步长、机器字长和舍入误差则属于求解器。暗能量的候选预测必须在求解精度提高后保持稳定，不能随换用一种浮点格式而改变。因此，本框架把“有限分辨结构能否形成很小且稳定的宏观引力项”保留为研究问题，不把浮点舍入残差直接认定为暗能量。

1.3.3 现有动力学桥接可以承担什么

当前辛格点模型已经给出内部时钟与场的共同哈密顿量、相反的能流，以及长波条件下的连续方程。这说明时间依赖的子系统系数可以来自完整系统中的动力学自由度，因而能够明确追踪能量去向。¹¹ 这一构造有助于建立跨尺度理论，但它目前是经典模型，尚未计算量子真空态，也未导出使能量产生时空曲率的引力作用量。

真空方向下一步需要回答的是：候选宏观项的量纲、符号和状态方程是什么，它是否对任意数值截止稳定，又如何与局域引力及其他物质能量一致耦合？这些要求同时约束可能的解释。若宏观项随时间变化，它也不能只以一个外加 $\Lambda(t)$ 插入守恒方程，而必须说明所需动力学及能量交换。

1.4 从工程诊断到共同响应的检验

1.4.1 逆对数平方假设的具体位置

前述两类问题使我们关注结构参数随内部演化变化的可能性。作者已发表的算术动力学前作提供了数值模型与函数形式的动机。^{7, 8} 在RSM中，可以把共同响应的候选写成

$$Y_A(t) - Y_A(t_0) = g_A \left[\frac{1}{\ln^2(R(t)/R_*)} - \frac{1}{\ln^2(R(t_0)/R_*)} \right], \quad R(t) > R_* > 0. \quad (1.5)$$

Y_A 是事先定义并无量纲化的第 A 类系数或读数， g_A 为其响应幅度。式(1.5)是一种待检验的共同慢变量假设；观测量也可能依赖其导数、积分或传播后的结果。仅在指定了 $R(t)$ 与物理时间的联系后，才能讨论相应的 $1/\ln^2(t/t_*)$ 形式。参考尺度、有效时间范围和读数映射都属于模型定义。

统一框架的价值在于约束不同响应之间的关系。例如，若微观耦合能够给出 g_A/g_B 或共同的时间标定，就可能产生跨观测预测。当前各小论文的耦合尚未由一个共同作用量确定；若每个幅度、每个初始条件和每条时间映射都自由调整，函数同形本身提供的解释力有限。因此，第4—6章需要逐步把这些接口连接起来。

1.4.2 已有小论文如何约束这一假设

精细结构常数研究已用同一个幅度连接过去的吸收光谱与今天的原子钟漂移。293条类星体测量单独给出 $\Delta\chi^2 \simeq 3.08$ ，加入长期光钟后为0.53；在该项目的时间与参考尺度约定下，联合幅度 $\Gamma = -0.00347 \pm 0.00476$ ，与零相容。²² 这是共同、同质且无屏蔽演化版本受到的约束。固定当前漂移后，不同对数指数的曲线还十分接近，因此相似的拟合质量也没有确认平方指数。

光谱项目进一步检查了观测读数本身。对17次ESPRESSO原生曝光和32份UVES光谱的分析中，同一Fe II 2600跃迁在相邻级次仍出现约 -59 m s^{-1} 的条件相对位移。²³ 同一跃迁的真实频率不能依赖探测器级次，这个负对照表明仪器、提取和模板处理必须先受到约束。六个候选中，四个可报告依赖模型的条件位移，两个仍属于拟合失配诊断；它们尚未构成六个已标定的宇宙年龄演化点。原来的零点可测精度假说涉及额外不确定度，将其延伸为原子频率均值变化还需增加响应假设。数学零点、两条谱线的相对频率和完整能级间距分布也属于不同对象。

CMB项目则把检验推进到空间统计与传播。固定初始谱下的2048个格点实现，可用于区分传播响应与初始统计的作用。在高多极薄壳扩展中，逆对数平方模型使第一声学峰附近的训练谱形偏差从0.473降至0.294，但后续保留频段的偏差从0.679增至1.244。²⁴ 这些是项目定义的谱形指标，不是官方宇宙学似然；完整声学峰序列仍未匹配。自由初始场可以重建出相似的天图，却会吸收传播规律的变化，所以图像拟合不能单独确定底层动力学。

表1.1归纳这些工作对统一框架的作用。四个方向目前均为探索性工作稿或分析记录；两篇已发表的算术前作提供其研究起点，发表状态与物理证据分别判断。

表1.1 已有分析对共同时间响应提出的要求。

检验接口	已建立的基础	框架需要继续解释的内容
宇宙膨胀	含校准与协方差的距离拟合；条件背景重建	与早期约束、扰动及物质时钟相容的同一历史
精细结构常数	同一幅度连接当前漂移与高红移响应	真实电磁耦合；非零幅度与函数形状的可识别性
相对光谱与零点测量	原生曝光、重复测量及同线负对照	独立标定后的年龄项；均值与不确定度机制的区别
CMB传播	固定初始统计、成对实现和保留频段检验	完整声学峰、偏振与透镜的共同预测

1.4.3 统一解释应接受怎样的检验

检验从常规解释开始：在明确的误差模型下，先判断残差是否仍需要额外响应，再与逆对数平方及其他候选比较。给候选增加参数通常可以降低训练误差；更有辨别力的是预先保留的数据、独立标定的读数，以及由同一组参数连接的不同观测量。未来光谱方案据此优先安排同线重复、不同灵敏度跃迁和跨年龄目标，先约束仪器与气体模型，再检验共同年龄响应。²³

当前各项目采用的背景、参数和数据并不完全相同，不能直接相加拟合改善来形成统一理论的显著性。真正的联合检验需要一致的 $t(z)$ 、物质响应与共享数据协方差。即使最终未检出变化，这些检验也能限制相应耦合；若某个指定分支只能靠不断放开初始条件或逐目标偏移才能保留，它的预测能力便需要重新评估。

1.5 小结：从异常线索走向动力学构造

本章保留原稿从膨胀率与真空能问题出发的构想，并把“系统诊断”落实为时间读数、能量收支和跨尺度响应三个问题。膨胀史工作展示了含时间响应的距离模型如何被拟合，精细结构常数与光谱研究提供了跨时代约束和负对照，CMB工作给出了完整谱形必须通过的检验。它们共同帮助我们定义模型应解释什么，而尚未共同确认一种宇宙时间机制。

RSM由此提出的方向是：把逆对数平方作为明确的结构假设，让内部自由度与微观系统共同演化，再推导可观测的宏观后果。下一章回到这一假设的算术来源，讨论已发表前作中的符号序列、非自治映射及零点数值对应，并说明从数学索引进入物理动力学还需要哪些联系。

第2章 源代码：算术结构与非自治动力学

本章提要。 本章沿着“素数筛—符号动力学—零点谱—物理响应”的顺序，说明RSM的算术来源。素数与黎曼零点提供确定的数学对象，非线性映射提供研究其结构的一种表示，逆对数平方则是从已有数值研究中选取的候选响应。作者已发表的两篇前作分别研究素数统计与非自治谱对应；它们采用的编码、观测规则和参数演化并不相同。本章据此区分算术事实、统计匹配与新增物理假设，并说明怎样把这一研究动机接入已有的内部时钟与辛格点模型。

2.1 启动规则：从素数筛到离散编码

如果要从简单规则研究复杂结构，素数筛是一个自然的数学起点。给定整数上界，埃拉托斯特尼筛通过依次排除素数的适当倍数，确定哪些整数为素数。对整数 $m \geq 1$ ，可定义二值编码

$$b_m = \begin{cases} 1, & m \text{ 为素数,} \\ 0, & m \text{ 不为素数.} \end{cases} \quad (2.1)$$

例如， $m = 1, \dots, 10$ 对应 $0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0$ 。这里1既不是素数也不是合数，因此0表示“非素数”，不能全部解释成“合数”。筛法是产生这一编码的确定性算法；二值表示本身尚未规定空间位置、相互作用或物理时间。

素数定理给出

$$\pi(X) = \sum_{m \leq X} b_m \sim \frac{X}{\ln X}, \quad X \rightarrow \infty. \quad (2.2)$$

其中 X 为无量纲整数尺度， $\pi(X)$ 是素数计数函数。²⁵ 它描述平均稀疏程度的渐近变化，不规定每个素数的位置，也不把整数大小解释成宇宙年龄。局部间距、短区间波动及素数对关联还包含平均密度之外的信息。

RSM保留原构想中“从简单离散规则出发”的方向。其具体问题是：哪些算术结构能够由低维动力学表示，这种表示保留了哪些信息，又能否启发产生可检验宏观规律的状态系统？将比特作为物理本体，是比编码更强的假设。即使选择这一假设，仍须给出状态的读取、组合与演化规则；素数定义并不直接指定引力、电磁作用或粒子种类。

从算术筛选到符号动力学

两个各自明确的编码对象；建立对应需要指定规则并进行检验




图2.1 算术编码与动力学编码的分工。 上支由筛法产生素数指示序列，下支由映射轨道及指定分区产生符号序列。两者之间需要说明比较对象、尺度及保留的统计量。相同的0/1字母表不意味着两种生成规则相同，也不直接赋予比特物理含义。本图为定义示意，没有新增拟合。

2.2 动力学逆向研究：带合并点及其适用范围

2.2.1 映射、轨道与符号

作者的素数研究采用二次映射及其符号动力学，考察筛序列与轨道模式之间的对应。⁷ 本文统一写为

$$x_{n+1} = f_u(x_n) = 1 - ux_n^2. \quad (2.3)$$

在指定分区后，可将 $x_n < 0$ 记为 L 、 $x_n > 0$ 记为 R ，临界点 $x_n = 0$ 另记为 C 。映射参数 u 、初态和分区共同决定符号轨道； LRL 等有限词则定义待统计的轨道事件。这里 n 是映射迭代索引，与式(2.1)的整数标签 m 先分别定义。二次映射展示简单规则产生复杂行为的能力，是研究这种表示的合适基准。²⁶

素数前作提出了启发式的对应、猜想及统计匹配方案，并报告相关数值结果。⁷ 对应关系的强弱取决于实际建立的映射：有限符号词的出现频率相近，弱于逐项序列相同；逐项编码相同，也仍需额外条件才能构成整个动力系统的拓扑共轭。本文沿用前作提供的研究线索，不把这些层次合并为已经建立的物理同构。

2.2.2 两种参数约定与两个不同事件

通常称为logistic映射的另一形式是 $g_r(y) = ry(1 - y)$ 。对固定 $r > 2$ ，取

$$y = A_r(x) = \frac{1}{2} + \frac{r-2}{4}x, \quad u = \frac{r(r-2)}{4}, \quad A_r \circ f_u = g_r \circ A_r. \quad (2.4)$$

这个固定参数坐标关系说明，比较数值之前必须说明使用的是 u 还是 r 。它也帮助区分两个经常被“混沌边缘”一词混用的事件：主倍周期级联的积聚点为 $u_F \simeq 1.401155$ ，对应 $r_F \simeq 3.569946$ ；两个混沌带合为一个的带合并点为 $u_M \simeq 1.543689$ ，对应 $r_M \simeq 3.678574$ 。27，28 两篇算术前作使用的主要基准是后者。

带合并点提供了具体可研究的轨道结构；它并不意味着一侧全为周期运动、另一侧全为无结构的混沌。二次族还包含更细的周期窗口和分岔结构。“临界”这一标签也不单独给出Lyapunov指数、遍历性或物理稳定性，更不能据此推导泡利原理等量子约束。

若参数改为 u_n ，式(2.4)还须谨慎使用。令 $u_n = r_n(r_n - 2)/4$ 及 $y_n = A_{r_n}(x_n)$ ，则实际变换为 $y_{n+1} = A_{r_{n+1}} \circ f_{u_n} \circ A_{r_n}^{-1}(y_n)$ ，一般不等于 $g_{r_n}(y_n)$ 。因此，非自治轨道不能只换一个参数名称便视为同一系统。




图2.2 固定参数二次族的两个不同事件。 图中区分倍周期积聚点与双带合并点，并列出logistic坐标下的对应参数。横向位置是参数示意，不是本轮计算的分岔图；未将整段参数区间划为单一动力学状态。数值与坐标约定见式(2.4)及文献27、28。

2.3 对数尺度与系数：怎样理解约12.73

2.3.1 平均稀疏、符号事件与条件匹配

素数平均密度中的 $1/\ln X$ ，与素数对统计中的平方对数具有不同来源。对相距2的素数对，令 $\pi_2(X)$ 计数满足 $p \leq X$ 且 $p, p+2$ 均为素数的 p 。Hardy–Littlewood猜想的相应形式为

$$\pi_2(X) \sim 2C_2 \int_2^X \frac{ds}{\ln^2 s}, \quad C_2 = \prod_{p>2} \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2}\right) \simeq 0.6601618, \quad (2.5)$$

乘积遍历大于2的素数。²⁹ 此处将该猜想系数作为匹配目标；它与式(2.2)的素数定理具有不同的数学地位。

设固定二次映射中的 LRL 事件具有正的长期频率 μ_{LRL} 。若构造一个加权计数，并假设相应加权渐近关系成立，则

$$\hat{\pi}_2(N) = \kappa \sum_{n=n_0}^N \frac{1_{LRL}(n)}{\ln^2 n} \sim \kappa \mu_{LRL} \int_{n_0}^N \frac{ds}{\ln^2 s}, \quad n_0 > 1. \quad (2.6)$$

于是，为使首项系数与式(2.5)一致，需要选择

$$\kappa \mu_{LRL} = 2C_2, \quad \kappa = \frac{2C_2}{\mu_{LRL}}. \quad (2.7)$$

这给出了前作约12.73这一系数的含义：在指定映射、符号事件和归一化下的条件匹配。线性响应或窗口规则中的比例系数若被吸收进 κ ，也成为这一约定的一部分。由于右端已经使用 C_2 ，式(2.7)本身不构成从混沌独立预测双素数常数；它也没有能量或时间单位，不能直接解释为宇宙耗散率。⁷

2.3.2 观测规则变化与映射参数变化

前作配套实现使这一分工更具体：双素数常数示例固定 $u = 1.543689$ ，对 LRL 事件按 $\kappa/\ln^2 n$ 累加权重；另一间距比较示例在固定映射上，对选定事件再施加随索引变化的随机稀疏化。³⁰ 后者的输出还包含随机选择。它们展示如何在动力学骨架上构造变化的统计读数，与每一步直接改变映射参数 u_n 是两种实现。

这种区别并不削弱研究非自治模型的动机，而是明确非平稳性位于哪里。若一条轨道对固定事件具有正的长期频率，那么这个频率不能同时渐近为零；为了描述素数稀疏性，可以改变观测窗口、权重、参数，或扩展状态系统。素数定理只约束输出计数，并不唯一决定采用其中哪一种机制。概率模型也可以研究确定性整数序列的统计，不必将其理解为素数本身由随机过程产生。

RSM的选择是在后续物理候选中显式引入内部演化自由度，使响应系数随之变化。平方对数因此具有可追溯的算术与数值动机，但其在动力学中的位置、幅度及与物质的耦合，仍由候选模型另行规定。

2.4 黎曼零点、谱统计与非自治响应

2.4.1 谱的索引与物理时间

黎曼零点与量子谱的联系，是把算术问题引向物理思考的重要线索。Montgomery的成对关联研究、Dyson指出的随机矩阵联系，以及Odlyzko的零点数值分析，为这种联系提供了不同层面的依据。⁴ Hilbert–Pólya思路则提出寻找适当自伴算符的可能性；构造其谱与全部非平凡零点的严格对应，比匹配有限谱统计要求更强。⁶

随机矩阵描述中的系综还取决于系统对称性。时间反演等条件影响比较正交、酉还是辛类型的统计，不能把所有重原子核能谱一概写成GUE。³¹ 同样，核能级、原子电子跃迁和数学零点也不因某种间距统计相似而逐项相同。

零点序号 j 和零点高度 γ_j 描述同一个数学谱的不同位置。用更多迭代去计算更高的零点，改变的是计算过程及采样范围；数学零点本身不会随宇宙时间老化。物理上，固定哈密顿量的定态能级

保持不变；若耦合或环境随时间变化，瞬时谱也可能变化。因此真正需要建立的联系是“哪个物理自由度改变了哪个算符”，而不是把谱索引的变化直接认作时间变化。

2.4.2 已发表零点模型的具体推进

作者的零点前作进一步让二次映射参数显式依赖迭代步数。沿用其式(3)的结构、把映射参数统一记作 u_n ，可写为

$$x_{n+1} = 1 - u_n x_n^2, \quad u_n = u_M + \frac{k_1}{\ln^2 n} + \frac{k_2}{\ln^3 n}, \quad n > 1. \quad (2.8)$$

其中 k_1, k_2 为该模型的参数，不等于式(2.7)的匹配系数 κ 。前作选取的参数从上方趋向 u_M ；一般而言，趋近方向取决于系数符号，逆对数项趋零只意味着与极限的偏离消失。⁸ 例如，单独取 $u_n = u_M - \kappa / \ln^2 n$ 且 $\kappa > 0$ 时，参数随 n 增大而上升。本文因而将“衰减”用于明确的偏离量或响应项。

平方指数还有一条更直接的谱尺度动机：高度 T 附近的零点平均间距渐近具有 $2\pi / \ln(T/2\pi)$ 的尺度；若再假定所用谱代理的相位间距与参数扰动幅度的平方根成比例，就会得到逆对数平方的候选扰动。^{5, 8} 这条推理中，平均谱密度、假定的平方根响应及把谱尺度关联到迭代索引，是分别需要说明的环节。前作尚未为其经验转移矩阵证明该响应定律；它给出了选取平方指数的现象学理由，而未排除其他响应指数。

该研究利用经验耗散转移矩阵的特征相位及低阶零点校准，报告了探索性的数值谱对应。其时间平均矩阵是非自治传播的启发式替代，不等同于逐步有序乘积的谱；留出误差高于训练误差，模型自身展开后的局部间距统计尚未复现GUE。⁸ 这些结果使非自治谱构造成为可继续研究的对象，也明确了改进谱预测与解释算符含义的任务。

2.4.3 从候选结构参数到可计算的集体频率

RSM在上述动机上增加物理建模的一步：以内部坐标 R 及共轭动量参与共同哈密顿量，并让格点回复系数采用第0章式(0.2)的逆对数平方响应。标量二次映射本身是非可逆的一维映射，不直接携带后续正则体系所需的非退化辛结构；引入格点坐标、动量及共同能量，是需要明确说明的构造。

这一步已经能够产生可计算的频率响应。对第0章格点模型，冻结 $R = \bar{R}$ ，并在线性极限 $g = 0$ 取周期模态，则

$$\omega_a^2(\kappa_m; \bar{R}) = M^2(\bar{R}) + \frac{4v^2}{a^2} \sin^2\left(\frac{\kappa_m a}{2}\right), \quad \kappa_m = \frac{2\pi m}{L}. \quad (2.9)$$

m 在这里为模态整数， a 为格距， L 为区间长度； κ_m 为空间波数，与匹配系数 κ 不同。式(2.9)沿用已有格点一连续场推导，表明回复系数变化如何进入集体模的频率平方。¹¹ 它是冻结算子的诊断；沿真实时变轨道使用瞬时频率，还需要慢变等条件。当前模型的经典集体模尚未被识别为真实原子能级。

这也说明物理读数不必原样复制输入函数。即使 M^2 含有逆对数平方，频率仍取平方根，频率比还依赖两个模态的响应，天文信号又可能包含传播和投影。精细结构常数、Hubble归一化、测量不确定度和CMB谱因此分别需要自己的读数映射；第1章汇总的四个小项目正是这些接口的初步检验。^{19, 22, 23, 24}

从算术数值对应到物理检验

保留研究动机，同时逐层给出新增假设与可计算对象




图2.3 从数值对应到物理假设。 已发表算术研究提供模型与启发，虚线连接标示需要额外建立的时间、相互作用和读数关系。辛动力学与连续描述使其中一部分可以计算；独立数据及替代输入用于检验具体候选。谱统计联系、参数随迭代变化和物理常数随宇宙时间变化，分别属于链条中的不同命题。

2.4.4 真实算术输入是否带来特殊响应

除平滑包络外，我们已经把真实零点间距残差接入共同哈密顿量，检查算术排列能否带来额外的宏观特征。¹¹ 使用有限精度零点表展开间距后，固定归一化区间及八个评价块，并与每块99个IAAFT替代输入及其节点谱配对版本比较；加上基线，共完成1593例主计算。¹²

真实输入能够改变所选场与时钟轨迹，但八块的主能量交换指标均位于两类替代集合的中心95%范围内。当前尚未检出该桥接中特殊的算术响应。同时，节点统计匹配并未保证插值、窗化后的实际驱动及其导数具有相同功率谱，检出能力也未完成量化。因此这一结果约束的是已实施的候选与对照范围，既不能当作算术物理联系的确认，也不能排除所有可能联系。

该计算使“黎曼结构进入动力学”成为一个具体、可追踪的问题：算术数据如何归一化，通过哪个项作用于系统，是否保留反作用，又用什么读数判断差异。后续最有价值的推进，是从微观机制约束这些选择，并在改进对照后检验新的固定评价区间。

2.5 小结：从离散规则进入物理架构

本章建立了RSM的算术来路：素数筛给出确定的编码，符号动力学提供比较结构的方法，双素数的对数尺度启发条件匹配，已发表零点模型进一步研究显式非自治的谱构造。平方对数由此成为有明确来源的候选形式；现有证据尚未把它唯一确定为真实物理相互作用的规律。

我们进一步提出，让内部演化与物质自由度共享动力学，使缓慢变化的结构参数能够产生可计算的集体响应。已有辛格点、连续近似和算术残差检验，为这一步提供了具体基准。下一章将据此展开宇宙同步架构：定义完整状态、局部关联、更新规则及时间含义，使“源代码”的比喻转化为可以逐项检验的模型。

第3章 形式化：宇宙同步架构

本章提要。 前两章给出了物理问题与算术动机，本章进一步定义承载这些设想的状态系统。RSM保留原稿的同步演化及逻辑—空间双层构想，以完整状态、共同动力学和明确读数组织模型。现有基准已经把逆对数平方响应、内部时钟反作用与格点演化放入同一个计算过程；将其解释为基本时间节拍、量子关联或真实时空，则需要另外建立物理对应。本章据此说明架构怎样支持可复现计算，以及局域传播、守恒和测量应分别接受什么检验。

3.1 架构综合：从元胞自动机到同步演化

3.1.1 同步规则的研究用途

元胞自动机以状态及局部更新规则研究集体行为，为从离散过程构造宏观描述提供了一种思路。⁹ t Hooft的元胞自动机解释进一步探索确定性结构与量子描述之间的关系。³² 量子元胞自动机也有以离散时间、局部状态代数和有限传播为起点的明确构造。³² 这些研究说明可以把“离散演化”转成数学问题；各自的状态、可逆性和测量含义仍须具体定义。

RSM采用同步演化作为当前模型的组织原则：在约定的阶段边界记录完整状态，明确每个更新读取哪些变量，再按同一动力学产生下一状态。同步并不要求程序的所有指令在硬件上同时执行，而要求执行顺序不悄悄改变模型中的依赖关系。它使相同初态、相同输入和相同规则具有明确的比较对象，适合检查非自治响应与反馈。

这里的统一序号首先是模型的时间标签。把它提升为宇宙基本时间的假设，需要进一步解释不同观测者的钟读数及相对论关系。守恒定律、纠缠或计算规模本身尚不能唯一选定某种同步架构。

3.1.2 状态组织与物理内容

原稿提出实体—组件—系统（ECS）来组织模拟。这一设计可以保留：实体标识负责区分对象，组件记录状态数据，系统实现相互作用和更新。对现有格点基准，位置索引、场坐标与动量便是可操作的对象；粒子质量、自旋及其他物理属性则需要由具体模型定义，不能仅靠组件名称获得物理含义。

ECS是可替换的实现方式，物理内容由状态、动力学及读数决定。当前代码使用数组、力评估与分阶段积分，尚未实现完整ECS调度器。并行实现可以使用缓冲区或其他方法维持相同读取语义；这些软件选择将在第7章展开。

按观察范围改变计算分辨率，也可以作为数值近似，但须控制其对预测的误差。若进一步假设观测行为改变物理状态，就必须定义观测者、测量作用及概率规则。单纯的细节层次管理不能承担波粒二象性的推导。

3.2 离散状态系统与已有更新基准

3.2.1 完整状态、空间与时间

当前计算采用一维周期格点及一个空间均匀的内部时钟。对固定 N 、 L 和 $a = L/N$ ，完整状态写为

$$Z_k = (q_0^k, \dots, q_{N-1}^k, R^k; p_0^k, \dots, p_{N-1}^k, P_R^k), \quad \tau_k = kh. \quad (3.1)$$

其中 $p_\ell = a dq_\ell/d\tau$ ， $P_R = I dR/d\tau$ ， $I > 0$ ； k 为数值步号， h 为固定积分步长， τ 为模型演化时间。第2章的映射索引 n 、零点序号 j 及物理宇宙时间 t 另行定义。内部坐标 R 通过动力学变化，并不

是每一步手动增加的帧计数器。

式(3.1)定义的是有限维经典相空间。空间采样离散，而坐标和动量仍为实变量；数学状态并不是有限比特集合。若以后改用量子态空间，还需指定局部自由度、算符代数、演化与测量。本文不以态矢符号代替这些尚待完成的定义。

目前的一维周期盒用于建立可计算基准。三维邻接、边界、动态几何或基本物理格距，都是需要明确构造的扩展。将 a 直接命名为普朗克长度，并不能使当前模型自动获得这些性质。

3.2.2 逆对数响应进入共同动力学

将配置和动量分别记为 $Q = (q_0, \dots, q_{N-1}, R)$ 、 $P = (p_0, \dots, p_{N-1}, P_R)$ 。第0章的共同哈密顿量可以分为

$$H(Q, P) = T(P) + V(Q), \quad T(P) = \frac{1}{2}P^T M^{-1}P, \quad M = \text{diag}(a, \dots, a, I). \quad (3.2)$$

V 包含最近邻差分能、 $M^2(R)q_\ell^2$ 回复项及局部四次势。纯包络的 $M^2(R)$ 取式(0.2)；算术检验另加 $\varepsilon_{\text{ar}}w(R)S(R)$ 。响应在 $R > R_*$ 的有效域内定义，窗口、样条和参考尺度在一次计算中保持固定。¹¹

这让非自治思想有了明确位置：整体 H 不显含 τ ，而物质子系统沿共同轨迹感受到随 $R(\tau)$ 变化的系数。内部时钟既调制场，也承担反作用；算术残差的完整导数同样进入时钟方程。因此，增加时间响应不再只是每隔若干步改一个外部参数，而成为完整状态中的相互作用。

3.2.3 同一配置评估与分阶段提交

现有实现采用Störmer-Verlet的半步动量—整步位置—半步动量更新。^{10, 11}用式(3.2)的向量记号，可写为

$$\begin{aligned} P_{k+1/2} &= P_k - \frac{h}{2}\nabla_Q V(Q_k), \\ Q_{k+1} &= Q_k + hM^{-1}P_{k+1/2}, \\ P_{k+1} &= P_{k+1/2} - \frac{h}{2}\nabla_Q V(Q_{k+1}). \end{aligned} \quad (3.3)$$

第一次力评估同时读取旧的场与时钟配置，第二次读取已完成位置更新后的共同配置。每一次评估中，所有分量来自同一个 Q 。代码以速度存储动量等价量，先形成完整加速度数组，再更新各变量；在固定 a, I 下与式(3.3)一致。逐格原地更新位置并立即让后续格点读取新邻点，则一般会改变这套演化规则。

固定步长、精确算术且各子步保持在势能定义域内时，该分裂具有二阶精度、辛性和时间可逆性。它通常不逐步精确保持原哈密顿量；连续自主系统的能量守恒来自共同 H 的正则方程。同步安排使实现符合这些方程，守恒仍需按能量收支与误差检查。对浮点程序，可复现性还涉及归约顺序、输入版本与随机种子；现有工作没有宣称跨硬件逐位一致。

共同更新规则与独立物理读数

计算流程定义变量怎样更新；物理接口还需定义变量怎样被观测

$$H = T + V; \text{ 纯包络 } M^2(R) = M_\infty^2 + b/\ln^2(R/R_*) \text{ 同时进入场力与时钟反馈}$$




图3.1 当前可计算的同步架构。 完整状态同时包含场与时钟，每次动量更新从同一配置评估两者的力；位置更新后重新评估。下层分别列出计算依赖与物理接口。共享 R 的反馈属于当前全局约化，数值步长也尚未被识别为基本时间节拍。本图描述已有模型及待建立联系，没有新增模拟。

3.2.4 有限采样与物理信息的区别

离散空间可以为给定数值模型提供有限空间波数范围，但这尚未完成量子场论的重整化，也未解释真空能为何很小。有限格点数配合实变量仍允许连续取值；配合无限维局部量子空间也不自动产生有限信息容量。若要讨论基本信息界，还需给出可区分状态、能量约束及其与几何的关系。

第1章的真空能问题因而继续存在于物理接口中。格距、时间步长及机器字长具有各自作用，不能把它们造成的计算截断合并称为一种宇宙基本截止。

3.3 两层同步：状态关联与物理因果

3.3.1 逻辑层描述什么

原稿的逻辑层在这里具体化为状态依赖图 G_L ：一条有向边表示某变量参与另一变量的更新，图距离 d_L 计数相应依赖路径。它帮助检查更新次序、共享变量和可能的信息通路。物理距离 d_P 则须由格点的空间嵌入或将来的有效几何定义。二者承担不同任务， d_L 并不是已经建立的第二套时空度规。

两个位置可以共同依赖一个参数，也可以在数据结构中共享标识。由此得到的是联合状态的表达方式。要判断物理关联，还必须定义如何制备状态、实施局部操作及读取结果；若共享变量允许一侧控制另一侧的可观测分布，还需检查相应物理传播机制。

3.3.2 量子关联必须满足的测量条件

共享经典数据为Bell检验提供了清楚的例子。设两侧测量选择为 $x, y \in \{0, 1\}$ ，结果 $A, B = \pm 1$ ，共享变量为 λ 。若满足测量选择独立性和局部分解，则

$$\begin{aligned}
\rho(\lambda | x, y) &= \rho(\lambda), \\
P(A, B | x, y, \lambda) &= P(A | x, \lambda)P(B | y, \lambda), \\
|E_{00} + E_{01} + E_{10} - E_{11}| &\leq 2, \quad E_{xy} = \langle AB \rangle_{x,y}.
\end{aligned} \tag{3.4}$$

这是CHSH约束所处理的统计结构。13, 33 同时读取一份数据或加入共同钟，不自动解除其前提。若候选采用不同的非局部依赖、测量选择关系或量子状态结构，应将改变写进模型，并计算同一组可比较概率。

量子关联还需与可控通信分开。在标准量子形式中，设 ρ_{AB} 为两侧联合密度算符， $\mathcal{E}_A$ 为A侧局部完全正保迹操作，且不按测量结果筛选样本，则

$$\rho'_B = \text{Tr}_A [(\mathcal{E}_A \otimes \text{id}_B)(\rho_{AB})] = \text{Tr}_A \rho_{AB} = \rho_B. \tag{3.5}$$

B侧独立统计不因A侧选择这种操作而改变；条件样本的关联与这一无信号条件可以同时存在。34 式(3.4) — (3.5)在本章是未来量子扩展要面对的比较标准，当前经典格点尚未导出这些量子测量规则。

3.3.3 从算法依赖域到物理传播

同步与局部性可以共同定义一个有限步依赖域。以固定背景、无全局反馈的显式局部规则为例，令 s_i^k 为节点 i 的局部状态， G 为固定空间邻接图，单步读取半径为整数 r ，则

$$s_i^{k+1} = F_i(\{s_j^k : d_G(i, j) \leq r\}) \implies \text{Dep}_k(s_i^{k+m}) \subseteq B_G(i, mr). \tag{3.6}$$

$B_G(i, mr)$ 表示半径 mr 的图球， Dep_k 为对第 k 步状态的依赖集合。这个结论来自逐步合成更新规则。若每条邻接边对应长度 a 、每一步对应数值时间 h ，可形成 ra/h 的算法依赖域上界；由于 h 可以细化，它不能直接作为物理光速。

当前式(3.3)还需具体计数：即使固定 R ，完整一步会两次评估最近邻力，最终动量可以依赖旧配置中相隔两条邻接边的变量，不能直接套用“一步一格”的描述。连续时间的最近邻格点方程与有限步算法又是不同对象，局部耦合本身不保证严格截断的光锥；有效传播应结合色散、频带和连续描述检验。

若进一步假设真实基本长度与时间步长，必须在这个物理模型中建立操作性的传播界及观测者关系。常用普朗克单位满足

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}, \quad t_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}, \quad \frac{\ell_P}{t_P} = c. \tag{3.7}$$

由于其定义已经包含 c ，这个比值是恒等关系，尚非从同步架构独立得到的光速预言。固定格点与共同时间标签还需要说明何种有效范围能够恢复相对论关系，以及是否产生可检验的方向或频率依赖。

3.3.4 当前共享时钟的范围

现有模型的场梯度项是最近邻的，但时钟通过

$$I \frac{d^2 R}{d\tau^2} = -\frac{1}{2} Q_2 [M^2]'(R), \quad Q_2 = a \sum_{\ell=0}^{N-1} q_\ell^2 \quad (3.8)$$

接收整个周期盒的反馈，再共同调制所有格点。¹¹ 因而完整系统包含一个全局自由度，式(3.6)的局部前提不适用于它。当前基准应理解为均匀时钟模式与格点场的共同演化；它尚未构造所有自由度的局域传播或洛伦兹协变性。

这个约化已经可以回答内部反馈是否改变轨迹、能量如何交换以及预设晚时响应能否保留。若要进一步解释物理时空，可研究空间依赖的驱动场 $R(x, \tau)$ ，指定其梯度能、传播或约束方程，再说明何时能够约化为均匀模式。那将是具有额外自由度的新模型，其算术来源与观测对应仍须检验。

3.4 架构小结：把状态、动力学与观测连接起来

RSM的同步架构目前已经有一个明确的计算落点：完整场一时钟状态、含逆对数平方的共同势能，以及与之匹配的分阶段更新。真实零点残差和替代输入可以在相同初态、响应位置与求解协议下比较；保持这一结构，使第2章的算术检验有可追踪的含义。同步规则本身不会增加该检验的证据强度。

原稿的工程—物理对照可以相应写成表3.1。表中既列出已经实施的内容，也指明赋予其物理含义所需的下一步。

表3.1 同步架构中的定义、实现与物理接口。

架构要素	当前明确的定义或实现	进一步物理化需要什么
时间管理	数值步号 k 、步长 h 及动态坐标 R 分别定义	模型时间、物质钟及宇宙时间的对应
状态与组件	经典格点坐标、动量和共享时钟；数组实现	真实物质自由度；若引入量子态则需测量规则
算术响应	逆对数平方包络及有界残差进入同一势能	从算术结构确定相互作用与耦合的机制
同步更新	同一配置评估场与时钟的力，按式(3.3)推进	若赋予基本离散时间含义，需独立物理检验
守恒与验证	连续能量收支、辛积分、步长及独立求解核对	扩展模型中相同的守恒、稳定与误差条件
关联与传播	明确依赖图；当前含全局时钟反馈	局域驱动、相对论因果结构及量子关联统计

这些接口也联系已有的小论文：精细结构常数与光谱需要定义钟及跃迁读数；膨胀史需要给出共同背景与时间关系；CMB需要由状态和传播产生受约束的空间统计。^{19, 22, 23, 24} 架构提供统一表述这些任务的方法，实际响应仍由具体物质耦合和观测模型决定。

下一章将从这里进入数学框架，展开共同哈密顿量、辛结构、反作用和能量收支，并给出格点到连续场及逆对数晚时行为的条件推导。

第4章 数学框架：辛演化与离散—连续映射

本章提要。 本章把前述架构写成可推导的数学模型：从共同哈密顿量得到场与内部时钟的双向作用，证明所用更新的辛性，并在固定有限格点的正能量分支上说明逆对数平方响应如何保留晚时主项。随后沿同一相互作用导出长波场方程及首个格距修正。原稿关于算术结构、影子哈密顿量和有限精度的设想在这一过程中分别落实为输入、误差工具及观测接口。由此形成一段明确的微观—宏观连接，而真实物质耦合、量子化和引力仍需要进一步构造。

4.1 离散演化算符：从正则状态到辛更新

4.1.1 连续动力学与离散映射的分工

当前候选沿用式(0.3)的共同哈密顿量和第3章的状态。令 $Q = (q_0, \dots, q_{N-1}, R)$ 、 $P = (p_0, \dots, p_{N-1}, P_R)$ ，对应辛形式为

$$\omega = \sum_{\ell=0}^{N-1} dq_\ell \wedge dp_\ell + dR \wedge dP_R, \quad \Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (4.1)$$

这里 $\mathbf{1}$ 为 $(N+1)$ 维单位矩阵， $p_\ell = a\dot{q}_\ell$ 、 $P_R = I\dot{R}$ ，点号表示对 τ 求导。连续正则方程定义待研究的轨迹；固定步长 h 的离散映射负责求解它。原稿进一步把离散映射视为基本物理定律的设想可以保留，但应另行规定基本步长和可观测后果。数值离散本身并不使连续方程失去数学意义。

具体响应写为

$$\chi = \ln(R/R_*), \quad \chi_i = \ln(R_i/R_*), \\ M^2(R) = \underbrace{m_0^2 + b(\chi^{-2} - \chi_i^{-2})}_{M_{\text{env}}^2(R)} + \varepsilon_{\text{ar}} w(R) S(R), \quad R > R_*. \quad (4.2)$$

wS 为固定窗化算术残差，纯包络取 $\varepsilon_{\text{ar}} = 0$ ；初值参数 χ_i 在求导时保持固定。¹¹ 在现有无量纲基准中 R, R_* 及残差均无量纲；恢复单位时， $M^2, b, \varepsilon_{\text{ar}}$ 具有频率平方量纲，场归一化另由能量约定确定。

完整 $H(Q, P)$ 不显含 τ ，因此自主；场沿 $R(\tau)$ 感受到时间依赖，体现子系统的有效非自治响应。辛结构约束演化的几何性质，具体势能及平方指数仍须给定。第2章的一维非可逆二次映射也不能直接充当式(4.1)上的正则变换：一维实空间没有非退化辛二形式，建立高维扩展或投影关系是另一个数学任务。

4.1.2 算符推导：辛性与相空间体积

共同 $H = T(P) + V(Q)$ 的动能采用常矩阵 $M = \text{diag}(a, \dots, a, I)$ 。定义动量子步 $K_\delta : (Q, P) \mapsto (Q, P - \delta \nabla V)$ 和位置子步 $D_\delta : (Q, P) \mapsto (Q + \delta M^{-1} P, P)$ ，其雅可比为

$$DK_\delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\delta V''(Q) & 1 \end{pmatrix}, \quad DD_\delta = \begin{pmatrix} 1 & \delta M^{-1} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (4.3) \\ J^T \Omega J = \Omega, \quad \det J = 1.$$

只要势能二阶可微， V'' 及 M^{-1} 均为对称矩阵，代入即可验证后一行分别对两个子步成立。相应

复合 $\Phi_h = K_{h/2} \circ D_h \circ K_{h/2}$ 亦保持 ω ；每个子步的导数须在该子步实际配置上评估。这给出第3章更新式的辛性依据。¹⁰

对精确算术， $\Phi_{-h} = \Phi_h^{-1}$ ；在足够光滑的区域，方法为二阶。保相空间体积不意味着所有轨迹有界，也不等于原 H 逐步恒定。浮点舍入、步长稳定域与连续系统的能量收支仍须分别检查。

4.1.3 稳定性与能量：内部时钟的反作用

记 $Q_2 = a \sum_{\ell} q_{\ell}^2$ 及 $\Delta_a q_{\ell} = (q_{\ell+1} - 2q_{\ell} + q_{\ell-1})/a^2$ 。对同一 H 求导得到

$$\begin{aligned}\ddot{q}_{\ell} &= v^2 \Delta_a q_{\ell} - M^2(R) q_{\ell} - g q_{\ell}^3, \\ I \ddot{R} &= -\frac{1}{2} Q_2 [M^2]'(R), \\ [M^2]'(R) &= -\frac{2b}{R\chi^3} + \varepsilon_{\text{ar}}(w'S + wS').\end{aligned}\tag{4.4}$$

上撇号表示对 R 求导，窗函数和残差的导数均保留。场一时钟耦合能已计入 H_{field} ，不在时钟端重复计算。于是

$$\dot{H}_{\text{field}} = \frac{1}{2} Q_2 [M^2]'(R) \dot{R} = -\dot{E}_R, \quad E_R = \frac{I \dot{R}^2}{2}, \quad \dot{H} = 0.\tag{4.5}$$

纯包络且 $b > 0, \dot{R} > 0$ 时，回复项变软，场向时钟释放能量，时钟加速。加入残差后，能流可以局部反向。这里总能量守恒来自自主正则方程；单向能流则依赖响应导数的符号。

纯包络的条件命题。 固定有限 N, L 与有限初始能量，取 $I > 0, g \geq 0, v^2 \geq 0, R_i > R_* > 0, u_i = \dot{R}(0) > 0$ ，并要求 $0 < b < m_0^2 \chi_i^2$ 。定义 $M_{\infty}^2 = m_0^2 - b/\chi_i^2 > 0$ 及 $E_0 = H_{\text{field}}(0)$ 。式(4.4) — (4.5)给出

$$\begin{aligned}R(\tau) &\geq R_i + u_i \tau, \quad 0 \leq Q_2 \leq Q_{\max} := \frac{2E_0}{M_{\infty}^2}, \\ u_i &\leq \dot{R}(\tau) \leq U, \quad U = \sqrt{u_i^2 + \frac{2E_0}{I}}.\end{aligned}\tag{4.6}$$

证明的关键是 $\ddot{R} \geq 0$ 且场能单调下降、各能量项非负。固定 $a > 0$ 时，能量控制每个场坐标与动量；任意有限时间内还有 $R \leq R_i + U\tau$ 。轨迹远离对数奇点，有限维常微分方程因此能够前向全局延拓。单调有界的时钟速度趋于正极限 u_{∞} ，对速度积分便有

$$\frac{R(\tau)}{\tau} \longrightarrow u_{\infty} \geq u_i > 0, \quad M_{\text{env}}^2(R(\tau)) - M_{\infty}^2 \sim \frac{b}{\ln^2(\tau/\tau_{\text{eff}})}, \quad \tau_{\text{eff}} = \frac{R_*}{u_{\infty}}.\tag{4.7}$$

最后一步使用 $\ln(R/R_*) = \ln(\tau/\tau_{\text{eff}}) + o(1)$ 。这段推导回答了核心问题：**已指定的逆对数平方响应能够在反作用存在时保留晚时主项。** 它不选择出指数2，也不把 τ 标定为宇宙年龄。更细余项及证明保存在已有技术稿中。¹¹

在有限时间上，忽略反作用会得到 $R_{\text{ext}} = R_i + u_i \tau$ ，因此 $\ln(R_{\text{ext}}/R_*) = \ln[(\tau + R_i/u_i)/(R_*/u_i)]$ 。完整时钟与该规定历史的偏离满足

$$0 \leq \dot{R} - u_i \leq A_{\text{fb}}\tau, \quad 0 \leq R - R_{\text{ext}} \leq \frac{1}{2}A_{\text{fb}}\tau^2, \quad (4.8)$$

$$A_{\text{fb}} = \frac{bQ_{\text{max}}}{IR_i\chi_i^3}.$$

这是由式(4.4)的加速度上界两次积分所得。对 $0 \leq \tau \leq T$ ， $A_{\text{fb}}T/u_i \ll 1$ 是充分弱反馈条件；场的相位误差仍须另查。固定初速度而增大 I 同时增加初始时钟能量，不能称为同总能量的比较。外部历史模型应核对场能变化与外功，不能附加一份恒定自由时钟能量来要求总量守恒。

上述存在性与尾律限定于纯包络、固定有限格点及正向分支。残差可能改变反馈符号；只有另外证明轨迹以正速度离开残差支撑并进入正的纯包络区域，才能恢复晚时论证。有限窗口的数值稳定也不能替代连续场或所有参数下的存在性证明。

4.2 从场方程到状态更新：格点与连续描述

4.2.1 离散化的对象与极限

原稿希望从局部状态规则产生宏观场。当前可计算版本先固定周期长度 L 、时钟惯量 I 及相互作用系数，再令 $a = L/N$ 减小。对平滑周期场，正则归一化为

$$q_\ell \simeq \phi(x_\ell, \tau), \quad \frac{p_\ell}{a} \simeq \pi(x_\ell, \tau) = \partial_\tau \phi, \quad \sum_\ell p_\ell \, dq_\ell \longrightarrow \int_0^L \pi \, \delta\phi \, dx. \quad (4.9)$$

其中 $x_\ell = \ell a$ ， $\delta\phi$ 表示场空间中的变分。 p_ℓ 与动量密度 π 相差积分权重 a ；在网格加密时丢失这个因子，会同时改变惯性与时钟源。求和的形式极限给出

$$H_{\text{cont}} = \frac{P_R^2}{2I} + \int_0^L \left[\frac{\pi^2}{2} + \frac{v^2 \phi_x^2}{2} + \frac{M^2(R)\phi^2}{2} + \frac{g\phi^4}{4} \right] dx. \quad (4.10)$$

连续Poisson括号为 $\{\phi(x), \pi(y)\} = \delta_L(x - y)$ 及 $\{R, P_R\} = 1$ ， δ_L 为周期Dirac分布。相互作用和时钟惯量均来自同一格点模型，没有另拟合宏观势能。若保持 a 而增加 N ，改变的是体积；这需要另行规定 I 的体积标度。

4.2.2 差分算子与长波方程

在共同有限时段内，若足够高阶空间导数受控，中心差分展开为

$$\frac{\phi(x+a) - 2\phi(x) + \phi(x-a)}{a^2} = \phi_{xx} + \frac{a^2}{12}\phi_{xxxx} + O(a^4). \quad (4.11)$$

由此得到主阶连续方程及同一耦合能产生的时钟反馈：

$$\begin{aligned} \phi_{\tau\tau} &= v^2\phi_{xx} - M^2(R)\phi - g\phi^3, \\ I\ddot{R} &= -\frac{1}{2}[M^2]'(R) \int_0^L \phi^2 \, dx. \end{aligned} \quad (4.12)$$

首个空间修正是在场方程右端加上 $+v^2a^2\phi_{xxxx}/12$ 。纯包络的时钟源为 $b(R\chi^3)^{-1} \int \phi^2 dx$ ；算术残差加入后仍须使用完整 $[M^2]'$ 。这使原稿“局部规则到宏观响应”的设想有了具体方程，其中逆对数项和反作用都被保留。

同一相互作用：从格点到长波场

指定正则耦合后推导宏观方程；逆对数平方与算术耦合仍是输入假设




图4.1 同一相互作用的离散—连续连接。 规定的算术响应进入共同势能，由其得到格点力与时钟反作用，再在固定体积、受控长波条件下得到连续场及积分源。下排区分空间格距、数值步长与统计闭合。共享 R 的全局性质在连续描述中继续存在；图示没有增加新的观测或实验。

Taylor展开证明的是算子一致性。耦合解的收敛还需要初值逼近、稳定性、共同时间区间和一致的正则性控制。已有固定系数基准在指定初态与时段得到二阶空间差异及首修正后近四阶差异；逆对数完整反馈基准验证了主阶连续描述的二阶空间差异。¹¹ 前一基准最细参考解的一项额外精度门限未通过，记录仍保留；不能把固定系数的四阶比较直接写成完整反馈模型已获得四阶精度。详细数值在第8章展开。

4.2.3 邻接、色散与时间步长

冻结 $R = \bar{R}$ 并令 $g = 0$ ，取波数 $\kappa = 2\pi m/L$ 的周期模态，可以独立检查空间算子：

$$\begin{aligned} \omega_a^2(\kappa) &= M^2(\bar{R}) + \frac{4v^2}{a^2} \sin^2\left(\frac{\kappa a}{2}\right), \\ \omega_0^2(\kappa) &= M^2(\bar{R}) + v^2\kappa^2, \\ \omega_{\text{corr}}^2(\kappa) &= M^2(\bar{R}) + v^2\kappa^2 - \frac{v^2 a^2}{12} \kappa^4. \end{aligned} \quad (4.13)$$

场方程中的正四阶导数项对应频率平方的负四次修正，两者一致。近似要求 $|\kappa|a \ll 1$ ；若把修正方程无截止地推广到任意大波数，会产生正质量原格点没有的失稳。原格点与有限项有效展开各有适用范围。

对一个 $\omega_a > 0$ 的冻结线性模态，式(3.3)给出的离散相位满足

$$\cos \theta = 1 - \frac{h^2 \omega_a^2}{2}, \quad \tilde{\omega} = \frac{2}{h} \arcsin\left(\frac{h\omega_a}{2}\right), \quad 0 < h\omega_a < 2. \quad (4.14)$$

最后的不等式规定有界振荡分支；边界 $h\omega_a = 2$ 一般仍有线性增长。它检查的是冻结线性模式，不是完整非线性场一时钟的全局稳定性证明。加密空间时最高频率升高，数值时间步长也须相应控制。¹⁰

式(4.13)的空间色散与式(4.14)的时间积分色散因而能够分开比较。第3章已说明，完整KDK步也不是“一步只读取一格”。这里的 v 是模型参数，尚未识别为实测光速；全局时钟反馈与局域相对论传播仍是不同问题。

4.3 离散流形映射：算术输入与宏观描述

4.3.1 算术结构怎样进入相互作用

素数和零点前作提供低维动力学、索引演化与谱对应的研究动机。^{7, 8}在当前正则模型中，明确的接入位置是式(4.2)：平滑包络与窗化零点间距残差共同调制二次势，并通过导数产生反作用。尚未从双素数间距推导格点邻接、 v 或普朗克常数；原稿的“算术骨架”应沿这些具体问题继续研究。

现有真实残差与替代输入比较已经运行，但没有检出相对于所构造对照集合的特殊宏观响应。窗化、插值后真正进入动力学的驱动谱尚未严格匹配，检出能力也待量化。¹¹因此，算术输入已进入模型，其独有物理作用仍需要更强对照和明确读数。

变量变换也须保留正则结构。例如改用 $\chi = \ln(R/R_*)$ 时，

$$P_\chi = RP_R, \quad P_R dR = P_\chi d\chi, \quad E_R = \frac{P_\chi^2}{2IR^2} = \frac{1}{2}IR^2\dot{\chi}^2. \quad (4.15)$$

因而本章的自由 R 并不等同于具有恒定动能系数的正则对数字段。此前指数势驱动场、精细结构常数响应及膨胀史恢复可以作为其他候选接口，但不能只因出现相同对数就合并其方程或参数。^{11, 19, 22}

4.3.2 平滑场、统计平均与几何

式(4.9)–(4.12)完成的是指定模型的长波描述。空间坐标和周期区间原已给定，因此尚未从无几何的比特系统导出流形。其成立依据是采样、差分一致性及动力学控制；仅增加格点数或援引大数定律，都不能替代这些条件。

统计约化是另一步。以已定义统计集合中的 $\phi = \bar{\phi} + \eta$ 、 $\langle \eta \rangle = 0$ 为例，若相关矩存在，则

$$\langle \phi^3 \rangle = \bar{\phi}^3 + 3\bar{\phi}\langle \eta^2 \rangle + \langle \eta^3 \rangle, \quad \bar{\phi} = \langle \phi \rangle. \quad (4.16)$$

因此用平均场替换微观变量并不会自动闭合非线性方程；共同演化的 R 还可能与 ϕ 相关。消去自由度通常需要指定统计态，并处理记忆和涨落；已有最优预测研究给出了这种问题的明确构造。³⁵本轮尚未执行这项约化，温度、耗散和有效引力也没有由长波展开自动得到。

这一分工保留了从微观动力学推导宏观理论的目标：先建立受控集体场，再选择观测量、统计态或几何自由度，分别检验进一步的有效描述。CMB项目的空间统计以及光谱项目的跃迁读数属于后续不同接口，不能仅凭图形相似就认定共享了同一微观机制。^{23, 24}

4.4 影子哈密顿量与截断：误差怎样进入物理解释

4.4.1 后向误差分析及其条件

对足够光滑的自主哈密顿系统，固定步长的对称辛方法具有形式修正哈密顿量。对本章KDK分裂，可以写成

$$\tilde{H} = H + h^2 H_2 + h^4 H_4 + \cdots, \quad (4.17)$$

其中常质量矩阵下的首项为

$$H_2 = \frac{1}{12} P^T M^{-1} V''(Q) M^{-1} P - \frac{1}{24} (\nabla V)^T M^{-1} \nabla V. \quad (4.18)$$

这一展开解释了数值轨迹为何可以接近某个修正流；它不是一般非线性映射都精确对应一个收敛级数的保证。长时间能量控制还需要足够小步长、正则性及相应轨迹区域等条件，近可积系统的不变环面结论另有扰动前提。¹⁰ 原稿用统一的“KAM稳定”覆盖所有非自治过程，超出了这些条件。

本模型纯包络在远离 R_* 的区域光滑。现有算术残差采用自然三次样条，跨节点通常只有 C^2 正则性；这仍支持式(4.3)的辛性，但不能无条件套用解析系统的任意高阶或指数长时误差结论。有限窗口的步长与独立求解器核对仍是实际依据。¹¹

4.4.2 格距、步长与有限字长

式(4.11)的 a^2 项来自所选空间相互作用，式(4.18)的 h^2 项来自积分算法，机器字长则产生舍入误差。三者具有不同来源，表4.1列出对应检验。

表4.1 离散尺度、误差与可检验含义。

来源	当前数学含义	如何判断其作用
空间格距 a	最近邻算子的有限格距色散	固定体积加密；或在假设物理格距下检查长波偏离
数值步长 h	积分相位与修正Hamilton项	固定空间模型减小步长，并更换独立求解器
机器字长	舍入、相消及归约误差	改变算术精度和求值顺序，记录误差传播
统计约化	省略自由度后的闭合问题	指定统计态，比较记忆、涨落与不同闭合方案

如果 a 最终被赋予物理长度，有限格距修正可以成为候选物理效应，但仍需独立定标。若把 h 也认定为基本节拍，就提出了不同于数值求解的新物理模型，须独立检验。由积分器选型改变、并随 $h \rightarrow 0$ 消失的偏离，不能直接称为广义相对论修正。

原稿把有限字长的截断余项解释为真空能。本章保留有限精度可能影响有效描述的问题，但目前没有由此推导应力—能量、真空态或引力耦合。经典模型的数值能量漂移也不能代替真空能的量子与引力定义。^{20, 21} 因而尚不能从一个机器精度参数推出宇宙学常数。

4.4.3 观测边界：从固定阈值到协议定义

原稿的零点高度 $T \approx 4200$ 不再作为普适物理上限。后续Clock工作已经区分数学零点的高度与序号、物理装置的估计误差，以及新增的宇宙时间假设；有限资源下的可达范围须由具体协议定义。²³

一个已整理的条件例子是假定装置用 e^{iyu} 编码无量纲高度 y ，而坐标扰动 δu 为零均值高斯变量、方差 $\sigma_u^2 > 0$ 。则平均相干幅度为

$$C(y) = \left| \left\langle e^{iy\delta u} \right\rangle \right| = e^{-y^2\sigma_u^2/2}, \quad y_{\text{det}} = \frac{\sqrt{2 \ln(1/C_{\min})}}{\sigma_u}, \quad 0 < C_{\min} < 1. \quad (4.19)$$

第一式来自高斯特征函数，第二式来自人为规定的最低可用相干幅度。它描述平滑衰减与协议阈值，没有给出零点在某个高度不再存在的结论。实际装置是否采用这种编码、噪声相关性及其重复测量怎样改变 σ_u ，都需要测量。进一步让精度随宇宙时间变化，仍是要独立检验的响应假设。

本章由此得到一组可以继续使用的条件结果：共同势能规定反馈与能流，正能量分支支持逆对数晚时尾律，正则格点产生受控长波方程，离散修正则有可分离的尺度来源。下一章转向观测证据与约束，逐项说明这些结构怎样连接常数、光谱、膨胀史和CMB，以及现有数据实际支持到哪一步。

参考文献

- [1] Bekenstein, J. D. Fine-structure constant: Is it really a constant? *Physical Review D* **25**, 1527 (1982). DOI: [10.1103/PhysRevD.25.1527](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.25.1527).
- [2] Planck Collaboration (Aghanim, N., et al.). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics* **641**, A6 (2020). DOI: [10.1051/0004-6361/201833910](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910). 作者预印本.
- [3] Riess, A. G., et al. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. *The Astrophysical Journal Letters* **934**, L7 (2022). DOI: [10.3847/2041-8213/ac5c5b](https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac5c5b). 作者预印本.
- [4] Montgomery, H. L. The pair correlation of zeros of the zeta function. In *Analytic Number Theory*, Proceedings of Symposia in Pure Mathematics **24**, 181–193 (1973). American Mathematical Society. 作者所在大学提供的全文.
- [5] Odlyzko, A. M. On the distribution of spacings between zeros of the zeta function. *Mathematics of Computation* **48**(177), 273–308 (1987). DOI: [10.1090/S0025-5718-1987-0866115-0](https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1987-0866115-0). 作者文献页.
- [6] Berry, M. V., and Keating, J. P. The Riemann Zeros and Eigenvalue Asymptotics. *SIAM Review* **41**(2), 236–266 (1999). DOI: [10.1137/S0036144598347497](https://doi.org/10.1137/S0036144598347497). 作者提供的全文.
- [7] Wang, L. The emergence of prime distribution from low-dimensional deterministic chaos. *Research in Mathematics* **13**(1), 2684334 (2026). DOI: [10.1080/27684830.2026.2684334](https://doi.org/10.1080/27684830.2026.2684334).
- [8] Wang, L. Numerical Spectral Correspondence Between a Non-Autonomous Quadratic Map and the Riemann Zeros: An Exploratory Study. *Mathematical and Computational Applications* **31**(5), 193 (2026). DOI: [10.3390/mca31050193](https://doi.org/10.3390/mca31050193).
- [9] 't Hooft, G. *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Fundamental Theories of Physics, Vol. 185. Springer, Cham (2016). DOI: [10.1007/978-3-319-41285-6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6). 作者预印本.
- [10] Hairer, E., Lubich, C., and Wanner, G. Geometric numerical integration illustrated by the Störmer–Verlet method. *Acta Numerica* **12**, 399–450 (2003). DOI: [10.1017/S0962492902000144](https://doi.org/10.1017/S0962492902000144). 作者原始摘要与方法说明.
- [11] Wang, L. RSM: 动力学基准与关联项目分析记录。研究代码与技术资料, 版本 e3569ba (2026)。固定仓库版本; 格点一连续场报告; 时钟反馈报告; 算术输入对照; 合成恢复报告; 四个关联项目的证据与接口。
- [12] Schreiber, T., and Schmitz, A. Improved surrogate data for nonlinearity tests. *Physical Review Letters* **77**, 635–638 (1996). DOI: [10.1103/PhysRevLett.77.635](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.635). 作者存档.
- [13] Bell, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physics Physique Fizika* **1**, 195 (1964). DOI: [10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195](https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195).
- [14] Riess, A. G., et al. The Perfect Host: JWST Cepheid Observations in a Background-Free SN Ia Host Confirm No Bias in Hubble-Constant Measurements. 作者预印本 (2025)。arXiv:2509.01667.

- [15] Freedman, W. L., et al. Status Report on the Chicago–Carnegie Hubble Program (CCHP): Measurement of the Hubble Constant Using the Hubble and James Webb Space Telescopes. *The Astrophysical Journal* **985**, 203 (2025). DOI: [10.3847/1538-4357/adce78](https://doi.org/10.3847/1538-4357/adce78); 作者预印本v3。另见该文勘误, *The Astrophysical Journal* **993**, 252 (2025), DOI: [10.3847/1538-4357/ae146d](https://doi.org/10.3847/1538-4357/ae146d)。
- [16] HODN Collaboration. The Local Distance Network: a community consensus report on the measurement of the Hubble constant at 1% precision. *Astronomy & Astrophysics* **708**, A166 (2026). DOI: [10.1051/0004-6361/202557993](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202557993); 作者预印本。
- [17] DESI Collaboration. DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints. *Physical Review D* **112**, 083515 (2025). DOI: [10.1103/tr6y-kpc6](https://doi.org/10.1103/tr6y-kpc6); 作者预印本。
- [18] DESI Collaboration. DESI DR2 Results IV: Alcock–Paczynski Measurements from the Lyman Alpha Forest and Cosmological Constraints. 作者预印本 (2026) , 2026-07-29首稿, 2026-08-04修订。arXiv:2607.27410v3。
- [19] Wang, L. An Inverse-Squared-Logarithm Hubble Normalization: Conditional Distance Fits and Scalar-Field Reconstructions. 探索性工作稿及计算记录 (2026) 。本文使用2026-09-19的校准拟合与标量恢复报告; [原文快照及来源](#), [项目主页](#)。
- [20] Weinberg, S. The cosmological constant problem. *Reviews of Modern Physics* **61**, 1–23 (1989). DOI: [10.1103/RevModPhys.61.1](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.61.1); [出版商全文](#)。
- [21] Padilla, A. Lectures on the Cosmological Constant Problem. 作者讲义 (2015) 。arXiv:1502.05296。
- [22] Wang, L. An Inverse-Squared-Logarithm Fine-Structure History: Conditional Tests with Atomic Clocks and Quasar Spectra. 工作稿与计算资料 (2026) , 版本**3827e38**。固定版本[研究报告](#)。
- [23] Wang, L. Finite-Resource Estimates of Riemann Zeros: Laboratory Diagnostics and a Conditional Cosmic-Time Hypothesis; Instrument and Gas-Model Sensitivity of Fe II Relative-Frequency Tests in Archival Quasar Spectra. 两份关联工作稿与计算资料 (2026) , 版本**5b2b6b7**。项目与稿件; [光谱诊断报告](#); [前瞻检验设计](#)。
- [24] Wang, L. Logarithmic lattice cooling and CMB identifiability. 工作稿与计算资料 (2026) , 版本**f42db51**。固定版本[结果与范围](#)。
- [25] Hadamard, J. Sur la distribution des zéros de la fonction $\zeta(s)$ et ses conséquences arithmétiques. *Bulletin de la Société Mathématique de France* **24**, 199–220 (1896). DOI: [10.24033/bsmf.545](https://doi.org/10.24033/bsmf.545); [期刊数字档案](#)。
- [26] May, R. M. Simple mathematical models with very complicated dynamics. *Nature* **261**, 459–467 (1976). DOI: [10.1038/261459a0](https://doi.org/10.1038/261459a0)。
- [27] Feigenbaum, M. J. Quantitative universality for a class of nonlinear transformations. *Journal of Statistical Physics* **19**, 25–52 (1978). DOI: [10.1007/BF01020332](https://doi.org/10.1007/BF01020332); [大学提供的原文](#)。
- [28] Sprott, J. C. Misiurewicz Point of the Logistic Map. University of Wisconsin–Madison技术说明 (2005, 2006修订) 。[作者原始说明及参数计算](#)。
- [29] Hardy, G. H., and Littlewood, J. E. Some problems of ‘Partitio numerorum’ ;

III: On the expression of a number as a sum of primes. *Acta Mathematica* **44**, 1–70 (1923). DOI: [10.1007/BF02403921](https://doi.org/10.1007/BF02403921)。

[30] Wang, L. `prime_logistic`: 素数与二次映射配套代码。文献7的作者代码库, 版本0bdeaaa (2026) 。固定映射的加权双素数示例; 间距比较与随机稀疏化。

[31] Dyson, F. J. Statistical Theory of the Energy Levels of Complex Systems. I. *Journal of Mathematical Physics* **3**, 140–156 (1962). DOI: [10.1063/1.1703773](https://doi.org/10.1063/1.1703773); 期刊原文的学术镜像。

[32] Schumacher, B., and Werner, R. F. Reversible quantum cellular automata. 作者预印本 (2004) 。[arXiv:quant-ph/0405174](https://arxiv.org/abs/quant-ph/0405174)。

[33] Clauser, J. F., Horne, M. A., Shimony, A., and Holt, R. A. Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories. *Physical Review Letters* **23**, 880–884 (1969). DOI: [10.1103/PhysRevLett.23.880](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880)。

[34] Beckman, D., Gottesman, D., Nielsen, M. A., and Preskill, J. Causal and localizable quantum operations. *Physical Review A* **64**, 052309 (2001). DOI: [10.1103/PhysRevA.64.052309](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.64.052309); 作者提供的期刊全文。

[35] Chorin, A. J., Hald, O. H., and Kupferman, R. Optimal prediction with memory. *Physica D: Nonlinear Phenomena* **166**(3–4), 239–257 (2002). DOI: [10.1016/S0167-2789\(02\)00446-3](https://doi.org/10.1016/S0167-2789(02)00446-3); 作者提供的期刊全文。