

¿Qué evitar?

- Café o té porque contiene compuestos que interfieren con la absorción de hierro.
- Azúcar, pan dulce y aguas gaseosas.
- Sopas de vaso, dulces, o comida procesada en bolsita.
- Alimentos procesados como compotas y comida enlatada



Tenga paciencia en el proceso

- Respete su desarrollo y sus capacidades.
- Tolere cierto desorden.
- No interprete como permanente un rechazo inicial a un nuevo alimento, vuelva a intentarlo.
- Respete los signos de hambre y saciedad.
- No lo obligue a comer.
- Evite distracciones (juegos, pantallas)
- Evite utilizar los alimentos como premio o castigo, ni como consuelo o chantaje.



f X v i n d e
www.igssgt.org



Alimentación Complementaria

Elaborado por: Licda. María Fernanda Funes
Nutrición Clínica
Unidad Periférica Zona 11

#UnIGSSmásCercaDeTi



Alimentación complementaria




Es el proceso en el que se le ofrece al lactante alimentos distintos a la leche materna, como complemento y no como sustituto.

Desde el nacimiento, el recién nacido debe tomar leche materna, ya que esto estimula la digestión, la función intestinal y lo protege de enfermedades.

A partir de los 6 meses de vida es importante la introducción de alimentos complementarios.

Si los lactantes no son amamantados se puede iniciar la alimentación complementaria desde los 4 meses, siempre que se lleve acompañamiento con el pediatra y/o nutricionista.



Recuerda: la introducción temprana, tardía o inadecuada de los alimentos complementarios puede poner en riesgo el crecimiento adecuado, así como de padecer desnutrición o deficiencias nutricionales en el lactante.

Lactancia y alimentación

La firmeza o consistencia de los alimentos más apropiada para el lactante dependerá de la edad y las habilidades para masticar que haya desarrollado.

Meses	Consistencia	Recomendación
6 a 9	Machacados, papillas suaves y espesas.	Comience con 2 o 3 cucharadas soperas por comida, e incremente gradualmente a medio vaso o taza de 8 onzas* Brinde de 2 a 3 veces al día comida Incluya tubérculos, masa de maíz, tortilla, frijol, fideo, arroz, plátano, hierbas, verdura cocida, yema de huevo, frutas sin semillas y pollo.
9 a 12	Picados, cortados en pequeños trozos.	Comience con 3 o 4 cucharadas soperas por comida, hasta llegar a un vaso o taza de 8 onzas** Brinde de 3 a 4 veces al día comida A lo anterior agregue carne de res o molida, hígado y pescado. Puede agregar una cucharadita de aceite en la comida.
12 a 24	Picados, cortados en trozos grandes o enteros.	Brinde primero alimentos y luego la lactancia materna. Fuente: (MSPAS, 2004) Comience con 4 o 5 cucharadas soperas por comida e incremente gradualmente a medio vaso o taza de 8 onzas* Brinde de 3 a 4 veces al día comida. Fuente: (OMS, 2010) A esta edad ya puede comer todo lo que la familia come.

* El número de veces que debe consumir alimentos el niño aumenta conforme va creciendo.

** Dependiendo del apetito del niño, se puede ofrecer 1 a 2 refacciones.

