

Nume: Damitu

Prenume: Marius-Alexandru

Specializare: Calculatoare

Grupa: 211

TEMĂ PROGRAMARE

LOGICĂ ȘI FUNCȚIONALĂ

$$L = (\beta \vee \neg \omega) \rightarrow ((\neg \beta \wedge \theta) \rightarrow (\theta \vee \omega)), \beta, \omega, \theta \in V$$

Fie asamblajul α

$$\alpha = (\beta \vee \neg \omega) \rightarrow ((\neg \beta \wedge \theta) \rightarrow (\theta \vee \omega))$$

$$S\&F: \overset{\alpha_1}{\beta}, \overset{\alpha_2}{\omega}, \overset{\alpha_3}{\theta}, \overset{\alpha_4}{\neg \omega}, \overset{\alpha_5}{\neg \beta}, \overset{\alpha_6}{\beta \vee \neg \omega}, \overset{\alpha_7}{\neg \beta \wedge \theta}, \overset{\alpha_8}{\theta \vee \omega},$$
$$\overset{\alpha_9}{\alpha_7 \rightarrow \alpha_8}, \overset{\alpha_{10}}{\alpha_6 \rightarrow \alpha_9}, \alpha_{10} = \alpha$$

β	ω	θ	$\neg \omega$	$\neg \beta$	$\beta \vee \neg \omega$ α_6	$\neg \beta \wedge \theta$ α_7	$\theta \vee \omega$ α_8	$\neg \beta \wedge \theta \rightarrow (\theta \vee \omega)$ α_9	$\alpha \rightarrow \alpha_{10}$
F	F	F	T	T	T	F	F	T	T
F	F	T	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	T	F	F	T	T	T
F	T	T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	F	F	T	T
T	F	T	T	F	T	F	T	T	T
T	T	F	F	F	T	F	T	T	T
T	T	T	F	F	T	F	T	T	T

$\Rightarrow \alpha$ tautologie