


ASOCIACIÓN ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y SÍNTOMAS DEPRESIVOS

POR MARIUS LUNGU



¿LAS PERSONAS ADULTAS CON MAYOR ACTIVIDAD PRESENTAN MENORES SINTOMAS DEPRESIVOS?

Un análisis descriptivo exploratorio





DATOS UTILIZADOS

NHANES 2021–2023

5.155 adultos

- 1. Actividad física de ocio**
- 2. PHQ–9**
- 3. Síntomas individuales**
- 4. Categorías de actividad**

PREPARACIÓN DE LOS DATOS



Unificar tablas

Limpiar columnas y valores


Filtrar adultos

Calcular PHQ-9


Convertir actividad

Crear categorías

MÁS ACTIVIDAD → MENOS DEPRESIÓN




La proporción con PHQ-9 ≥ 10 es 9,7 puntos porcentuales menor con alguna actividad



PHQ-9 ≥ 10 es un umbral de cribado, no un diagnóstico.


**¡Vale! Moverse
reduce la depresión
casi a la mitad...**



**De momento tenemos
una relación.
Vamos a analizarla**



La proporción con PHQ-9 ≥ 10 disminuye hasta el nivel recomendado y después apenas cambia




Comparación descriptiva; no demuestra causalidad.


**¿Entonces cuanto más
ejercicio, mejor! Mañana
a hacer fcking burpees
desde las 5 de la mañana, bro...**



**Relájate, BRO.
Que te lo explico bien.**



Frecuencia y volumen muestran correlaciones algo mayores con el PHQ-9 que la duración por sesión



Correlaciones débiles; la duración utiliza una muestra diferente.

Mmm... conque lo importante es la frecuencia... Pues diez minutitos todos los días y arreglado.



No tan rápido: frecuencia y volumen están prácticamente empatados. Ahora veamos qué síntomas destacan.




Frecuencia



Volumen




La asociación más marcada se observa en fatiga y falta de energía




n = 5.155 · Correlaciones débiles; análisis exploratorio de los síntomas.

**Pues, según el tal Spearman
ese, cuanto más ejercicio,
menos fatiga... y menos
de todo.**

**El tal Spearman apunta en
esa dirección. Pero todavía
nos falta contar una cosa.**



El número medio de síntomas disminuye hasta el nivel recomendado y después apenas cambia



Presente: ítem PHQ-9 > 0 · Frecuente: ítem ≥ 2 · Barras: intervalos de confianza aproximados · Comparación descriptiva.

ENTONCES...

**¿LAS PERSONAS CON MAYOR
ACTIVIDAD FÍSICA PRESENTAN
MENORES SÍNTOMAS
DEPRESIVOS?**

Lo que mi análisis confirma, es
que sí, **más actividad se asocia**
con menos síntomas depresivos.
La dirección de la causalidad es
otra historia...

LIMITACIONES

**CAUSALIDAD,
VARIABLES PERSONALES,
INFORMACIÓN AUTODECLARADA,
MUESTRA ANALÍTICA**

**Vamos, que a más
mamado, menos
síntomas**



**¿Pero yo qué te acabo
de decir de la
causalidad? Demasiado
burpee, BRO...**



GRACIAS

¡Hacedle muchas
preguntas, que este
tío va muuuy de listo...!



¡Pero tú te
quieres callar...!

