

Lyckas med valldlingen!

Ebba Hellstrand

HS Konsult AB

Hushållningssällskapens i Dalarna, Stockholm, Uppsala,
Södermanland, Gävleborg, Västmanland och Örebro län



Hushållnings
sällskapet

Agenda

01

Val av sortblandning

02

Etablering

03

Gödsling

04

Skötsel

05

Skörd





Mycket att fundera över

- Hur lång liggtid ska vallen ha?
- Vilka djur ska äta fodret?
- Vilka förutsättningar har marken?
- Hur många skördar ska jag ta?
- Ska vallen användas till bete eller slåtter eller både och?
- Vilken gödslingsstrategi har jag?



Val av sortblandning



Hushållnings
sällskapet

Valtider

- Tåla upprepad avbetning
- Leverera jämn avkastning
- Tåla tramp och kunna fylla ut luckor med utlöpare
- Uthållighet

Vilka krav ställer du?



Ängsvingel



Engelskt rajgräs

Engelskt rajgräs



a,
np.
rdet

en och
obas
el och

Rödsvingel



Rörsvingel

ta.
n är
r frost



ipa
ra
et



Ängsgröe



- Inflorescens och blöddar i små mattor som blir tätare ju mer det betas eller skördas.
- Något torkkänslig.

Timotej



- Sortval har det använts i bete
- Generellt känslig täta avbetningar och betestramp



Rödklöver



Lucern

Torktålig,
intensiv.
och pH 6



nde,
struktur

Vitklöver



n
ätt.
ssar

Käringtand



n
latchar
arar
ch bete
song.



Gård med längre liggande vallar och tvåskördesystem

- Välj uthålliga timotejsorter i blandning med ängssvingel och vitklöver.
- Ska några av vallarna vara intensivare, passar lusern i blandning med timotej och rörsvingelhybriden Karolina. Välj Karolina före Swaj och Hykor
- Undvik rörsvingel och snabba rörsvingelhybrider, då dessa konkurrerar ut de andra gräsen från skördeår två och framåt och bidrar till låga energivärden i fodret i ett tvåskördesystem.



Gård med intensiv vallproduktion

- Satsa på intensiva vallar som roteras ofta nära gården. En bas av timotej spetsad med engelskt rajgräs och/eller rörsvingelhybriden Karolina.
- Lejs slåtterkedjan är det bra om alla vallar ska skördasskördas vid samma tid och då kan uthålliga vallar med tidig skörd vara ett bra alternativ på marker som ligger längre från gården.
- Välj blandningar med rödklöver, timotej och rörsvingelhybrider.
- Sköter man slåttern på egen hand är det bra att ha ett mer utdraget skördefönster.



Grunden till framgångsrik betesvall

- Vitklöver
- Grunt rotsystemet –något torkkänslig
- Långsam etablering, tidig första skörd gynnar tillväxten.
- Bra återväxtförmåga.
- Samodlas med till exempel ängssvingel, engelskt rajgräs och ängsgröe.
- Lågväxande



Användningsområde

Vallar till både bete och slåtter

Betar du återväxten?

-Lägre andel rödklöver, timotej och lusern.

Betar du återväxten?

-Välj Engelskt rajgräs, ängsgröe, vitklöver och ängssvingel vilka alla är tramptåliga och avkastande





Etablering



Hushållnings
sällskapet

Sådjup








Ska jag sälja välten?

• Varför vältrar du?





Insådd i spannmål till mogen skörd



Ta skyddsgrödan som helsäd



Varierande etableringshastighet



- Rörsvingel
- Rörsvingelhybrider
- Hundäxing
- Ängsgröe
- Lusern



- Rajgräs




Gödsling



Hushållnings
sällskapet

Baljväxter ger kväve till vallen

- En baljväxtandel på mellan 30-50%
=ca 150kg N/ha
- Mer än 50% klöver ger inte högre skörd



Kvävegödsling

Gröda	Bärgad skörd (ton ts/ha)						
	6	7	8	9	10	11	12
Två skördar							
Gräsvall (traditionella arter)	130	150	170	190			
Blandvall, 10 % klöver	115	135	155	170			
Blandvall, 20 % klöver	90	105	120	135			
Blandvall, 40 % klöver	40	45	50	55			
Tre skördar							
Gräsvall (rörsvingelhybrider)		180	200	220	240	260	
Blandvall, 10 % klöver		160	180	200	215	235	
Blandvall, 20 % klöver		135	150	165	180	195	
Blandvall, 40 % klöver		80	90	100	110	115	
Fyra skördar							
Gräsvall (rörsvingelhybrider)		230	250	270	290	310	330
Blandvall, 10 % klöver		205	225	245	260	280	295
Blandvall, 20 % klöver		175	190	205	220	235	250
Blandvall, 40 % klöver		105	115	120	130	140	150



Glöm inte bort kalium!

Gröda	Avkastning ton <u>ts</u> /ha	K-AL- klass I	K-AL- klass II	K-AL- klass III	K-AL- klass IV	K-AL- klass V
Slåttervall <u>ts</u> , vall I	6	120	80	40	0	0
Slåttervall <u>ts</u> , vall II	6	160	120	80	40	0
Slåttervall <u>ts</u> , vall I	8	160	120	80	40	0
Slåttervall <u>ts</u> , vall II	8	200	160	120	80	40



Skötsel



Hushållnings
sällskapet

**Betas ej
insåningsåret!**





Ogräs???

- Putsa betesvallen direkt efter avbetning.
- Låt inte skräppans frön hinna mörkna på plantan.



Restaurering






Skörd



Hushållnings
sällskapet

Tillväxt i en blandvall

Betets tillväxttakt (kg ts/ha & dygn)



FIGUR 1. *Skillnad i tillväxtrytm mellan baljväxter och gräs (efter Steen, 1970).*







Klicka på en provpunkt nära dig för beräknat skördedatum och provskördar!

[Hjälp och instruktioner](#)

[Lista över alla mätstationer](#)



UPPSALA normalskörd 06 juni, prognos 06 juni



[Förklaring till hur grafen ska tolkas](#)



- Styrkt bete
- Max tre blad på eng raj
- Höga värden



Växtrester



© jasfil.se



Önskemål för en foderstat till mjölkko

Om bara vallfoder

Minst 11 MJ/kg ts

Minst 6,4 Nettoenergi MJ/kg ts

150 g råprotein/kg ts

500 g NDF/kg ts

100-150 g iNDF/kg NDF

< 27 g kalium/kg ts

>2 g magnesium/kg ts

>2 g fosfor/kg ts

Vilka värden vill du ha?



TACK!

Hör gärna av er om ni har några frågor!
ebba.hellstrand@hushallningssallskapet.se

018-560412



Hushållnings
sällskapet