

# Lentifri gård

Getdagen

2026-02-17



## Projektgrupp

- Jonas Johansson Wensman (SLU/SVA)
- Ylva Persson (SVA)
- Jenny Frössling (SVA)
- Karin Alvåsen (SLU)
- Anna Ordell (SVA/SLU)
- Emelie Larsdotter (G&D)


## Referensgrupp

- Anna-Carin Gidlund (Svenska getavelsförbundet)
- Gudrun Haglund Eriksson (Svenska fåravelsförbundet)
- Annette Kampen (Veterinärinstituttet i Norge)
- Johan Åkerstedt (Veterinärinstituttet i Norge)
- Liv Sölveröd (Tine Mjölklaboratorium)




Veterinærinstituttet  
Norwegian Veterinary Institute

# Syfte med projektet




# Seroprevalensstudie


Djurtäthet per besättningstyp




Get 2700st



Får 12300st



Mixade 620st



Provtagna besättningar/djurslag

- Får
- Get
- Mixad

# Seroprevalensstudie

Prevalence




Diagnostics



Genetics



Impact



*Antal testade djur och besättningar*

## Prevalens SRLV

Getter 19% (10-30%)


Får < 3 %

Mixade 7% (1-29%)

SRLV- status

● Negativ

● Positiv




# Provtagna besättningar

Getter



## Raser

- Samtliga raser provtagna
- Positiva besättningar i alla rasgrupper



# Mjök som provmaterial

## Get

- ⊕ Lägre kostnader för provtagning
- ⊕ Mindre invasivt
- ⊕ Kan utföras av djurägare
- ⊖ Bara möjligt för lakterande djur
- ⊖ Ingen klinisk undersökning i samband med provtagning




Figure 1. CAE-ELISA absorbance values in serum (x-axis) vs. milk (y-axis) in 212 lactating goats included in the study to estimate the occurrence of CAE and CLA (Sweden, 2018).

Persson et al, 2022


# Fluktuation i antikropps nivåer i mjölk & serum under lakationsperioden

En getbesättning med 60 djur

Upprepad provtagning med mjölk & blod på samtliga betäckta djur


Analyserats för SRLV med både Idvet & Hyphen ELISA

PCR på ett randomiserat urval (12st)




# Fluktuation i antikropps nivåer i mjölk - & serum under laktationsperioden

Get





Number of positive and negative animals per sampling and material

| Sampling   | Status   | Serum | Milk |
|------------|----------|-------|------|
| Sampling 1 | Positive | 49    | 21   |
|            | Negative | 8     | 3    |
| Sampling 2 | Positive | 48    | 39   |
|            | Negative | 8     | 15   |
| Sampling 3 | Positive | 45    | 40   |
|            | Negative | 7     | 11   |



# Mjök som provmaterial

Get



Graf av: Sehema Gül Yılmaz

# Mjök som provmaterial

## Får

Import av mjök från tre SRLV infekterade fårbesättningar i Spanien med känd besättningsprevalens (Låg/Medium/Hög)

Mjök från en svensk besättning med fristatus

Analyserats på SVA med både Idvet & Hyphen




Bild av: Arianna Comin


# Virusgenetik


## Get

Prover från positiva besättningarna har undersökts med PCR – vävnad/EDTA/serum/nossvabb

Extraktion av DNA från PCR positiva för att fastställa genotyp

Jämfört med andra virusisolat bla. från Norge





## Pairwise genetic distance analysis

| Clusters                        | Proposed Subtypes | Members                                  | To Reference Genotype | Ranged from to | To their cluster (subtype members excluded)                                        | Ranged from to                                | Within subtype | Ranged from to                        |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Cluster A<br>11.15 (2.88-18.83) | C1                | RefC                                     |                       |                | 17.56                                                                              | 16.59-18.53                                   | One isolate    | One isolate                           |
|                                 | C2                | SWE3 SWE5<br>SWE6 SWE7<br>SWE10<br>SWE13 | 17.55                 | 16.59-18.53%   | 17.56                                                                              | 16.59-18.53                                   | 8.55           | 2.88 (SWE3-SWE6)-<br>13.42(SWE5-SWE6) |
| Cluster B<br>14.34 (2.08-19.39) | C3                | Caev-like/Nor                            | 21.21                 | 21.21          | 17.49                                                                              | 15.71-19.39                                   | One isolate    | One isolate                           |
|                                 | C4                | SWE9 SWE11                               | 19.9                  | 19.74-20.06    | 16.82 (SWE9:16.57,<br>SWE11:17.05)                                                 | 15.54 (SWE9-SWE17)-<br>19.39(SWE11-Caev-like) | 2.08           | 2.08                                  |
|                                 | C5                | SWE2                                     | 21.36                 | 21.26          | 16.35                                                                              | 15.71-17.95                                   | One isolate    | One isolate                           |
|                                 | C6                | SWE1 SWE12<br>SWE15<br>SWE16<br>SWE17    | 20.65                 | 19.26-22.17    | 16.50 (SWE1:16.43,<br>SWE12:17.27,<br>SWE17:15.87,<br>SWE16:16.59,<br>SWE15:16.39) | 15.87-17.27                                   | 9.68           | 2.24 (SWE16-SWE15)-14.26 (SWE1-SWE16) |

**Cluster A** consisted of the reference strain (**C1**) and one group of field isolates (**C2**; SWE3, SWE5, SWE6, SWE7, SWE10, SWE13), **whereas Cluster B** was composed of the subtypes **C3–C6** (**C3**; CAEV-like/Nor, **C4**; SWE9, SWE11, **C5**; SWE2, **C6**; SWE1, SWE12, SWE15, SWE16, SWE17).

**Swedish sheep isolate (SWE8)** clustered together with Genotype A5 in different tree approaches (ML, NJ, UPGMA) with low bootstrap value but showed lowest genetic distances as 14.76% to A5/Switzerland/AY454175.

# Djupintervjuer i positiva besättningar

Get

5 positiva besättningar intervjuades

- Hälsan i besättningen
- Riskfaktorer
- Saneringsåtgärder
- Kontrollåtgärder



## Slutsatser

- Sjukdomen var värre än djurägarna trott
- Svårt att slå ut djur vid sanering då tillgång på virusfria djur är låg
- Generellt låg kunskapsnivå om sjukdomen hos getägare (enligt intervjupersonerna)
- De var positiva till kontrollåtgärder såsom snappning/utslag så länge det var frivilligt och följdes av ekonomiskt

# Tack för uppmärksamheten!

