



Snappning

FILM



Praktisk erfarenhet
Anna-Karin Gidlund



Smittspridning

- Virusets sprids i första hand via **råmjölk och mjölk**
- Smittspridning sker även via **saliv och luftvägssekret** (noskontakt) samt **blod**
- **Indirekt smittspridning** via utrustning, redskap och kläder är också möjlig



Förlossning

Killingen ska tas direkt vid förlossning utan att nudda golvet.

- Tvätta händerna + Engångshandskar.
- Dra ut killingen när klövarna syns.
- Tas till ett rent rum.
- Torkas med ren handduk/tyg eller papper.
- Förvaras i pappkartong tills flytt till isoleringsstallet.



Förlossning

- Geten får inte slicka på killingen.
- Killingen får inte dia.
- Ligger killingen på golvet räknas den som smittad och ska inte snappas!
- Drar förlossningen ut på tiden ska killingen inte snappas!
- Killingen torkas torr innan den läggs under värmelampa.
- Handduk/tyg, papper och pappkartong kasseras och bränns efter varje killung.



Utfodring

- Koråmjölk (ca 2 dl) **inom** 2 timmar efter snappning.
- Ett alternativ är pastöriserad getråmjölk.
- Snappade killingar får **inte utfodras med getråmjölk om inte denna är pastöriserad enligt anvisning.**
- Därefter syrad mjölkersättning för lamm/killling.




Isoleringsstall

- Snappade killingar måste födas upp i **isoleringsstall** =
Stall i annan byggnad än där de infekterade getterna hålls.
- Vid ingången till isoleringsstallet ska det finnas en **smittspärr** =
Kläd- och Skobyte, Handtvätt + Engångshandskar.



Isoleringsstall

- Snappade killingar ska hållas i små grupper (max 10 killingar per grupp)
- Täta väggar mellan grupperna tills första provtagningen är genomförd.
- *Så långt det är möjligt ska killingarna ha en egen skötare som inte är i kontakt med de infekterade getterna.*



Provtagningsrutiner CAE efter snappning

- Blodprovstagning av alla killingar innan de är 5 veckor (gäller under snappningsåret).
- Blodprovstagning av de snappade killingarna minst 1 månad före deras första killning.



**Tack för
uppmärksamheten!**

