

# Hudsjukdomar hos svenska getter

En pilotstudie av Matilda Kreutz

1

## Bakgrund

- Getnäringen ökar i Sverige
- Hudsjukdomar är vanligt internationellt
  - Ektoparasiter – *Chorioptes* och löss framför allt
- I Sverige mer okänt läge
  - Löss, stafylkokock-dermatit, orf och örönskador tros vara vanligt
  - *Sarcoptes* och *Psoroptes* ska ej finnas hos svenska getter

2

## Syfte och studiedesign

- Syftet med studien var att få en första bild av läget gällande hudsjukdomar hos landets getter. Ett ytterligare syfte var att undersöka förekomsten av skabbkvalstren *Chorioptes* och *Psoroptes*.
- Studien bestod av en enkätundersökning och gårdsbesök med undersökningar och provtagningar av getter
- Resultat från enkätundersökning respektive gårdsbesök redovisas separat

3

## Enkätundersökning

- Distribuerades via Jordbruksverkets register samt SVA:s hemsida och andra forum på internet
- 26 fullständiga svar mottogs från enkäten
- Besättningsstorlek från 13-130 getter
- Svensk lantras vanligast (enstaka med lappgetter, fåbodskogsgetter eller boerkorsning)
- Vanligt med inköp av djur, men ingen beskrev karantänsrutiner i enlighet med SVA:s rekommendationer (svar i fritext, kan ha haft tillfredställande rutiner men ej tolkats enligt rekommendation i studien)

4

## Enkätundersökning forts.

- Vanligt att djuren klipps på någon del av kroppen, vanligast med juver
- Vanligt med olika typer av hudförändringar, men ovanligt med veterinär diagnos
  - Ovanligt att djurägare söker veterinärvård för hudåkommor eller ovanligt att det diagnosticeras vid veterinärbesök?
- Konstaterade fall: vanligast med löss, enstaka som haft stafylkokock-sår/dermatit eller zinkbrist

5

## Övrig information enkät

Några av de svarande förde fram en önskan om att kunna förstå problem, hur de ska provas och diagnosticeras på ett bättre sätt

6

## Gårdsbesök

- 8 gårdar i södra och mellersta Sverige besöktes, 65 getter undersöktes totalt
- Majoriteten av getterna i studien hade någon typ av hudförändring
  - Getter med förändringar valdes ut
  - Slutsatser om hela populationen kan inte dras på grund av litet studiematerial och typ av urval

## *Chorioptes bovis*

- Kvalster som orsakar benskab
- Lever ytligt på huden, kan överleva i närmiljön
- Vanligt i till exempel Storbritannien
- Nedre delen av benen, vanligast från området runt lättklövarna upp till och med has eller carpus
- Bruna eller vita krustor, oftast endast enstaka individer som har besvär, klåda är ovanligt
- Diagnostiseras via hudskrap – direktmikroskopering eller PCR (ny metod)

7

8

## Gårdsbesök – *Chorioptes bovis* (benskab)

- Samlingsprov – 7/8 positiva
  - Metoden ej testad på getter tidigare
  - Uppföljande besök på två gårdar där kvalstren sågs i mikroskop
- Inga getter med kraftiga kliniska teckens sågs
- Inga getter med tecken på klåda från benen sågs
- Lindrig förekomst av skorpor/mjällighet som sågs först när pälsen klippts


## Förändringar *Chorioptes*



9

10

## *Chorioptes*-kvalster i mikroskopet



## Behandling?

- Eprinex
- Kvalstren kan dock leva länge i närmiljön om de har tillgång till huddebris
  - Sanering av närmiljö samt utrustning krävs
- Är behandling motiverad om getterna inte har besvär?
- Karantän och *Chorioptes*?
  - Antagligen utan betydelse om det redan finns i besättningen
  - Svårt att få inköpta djur fria från det i och med parasitens överlevnad i miljön

11

12

### Staphylococcus (S.) aureus

- Vanligt hos friska getter i nosslemhinnan, vanlig mastitbakterie
- Vanligt vid hudinfektion hos getter
  - Ofta sekundärt vid till exempel Chorioptes eller orf
- Pustler och krustor på juver i närtid efter killning
- Krustor i nos
- Diagnos oftast baserat på typiska tecken, annars cytologi eller odling
- Behandlas i första hand lokalt med antiseptisk rengöring, systemisk behandling vid svåra fall
- Förebyggande åtgärder!

13

### Gårdsbesök - Staphylococcus aureus

- Prover för *S. aureus* togs från pustler eller krustor på juver eller i och runt näsborrar
- 9 prover från 4 olika gårdar – 7/9 positiva
- *S. aureus* i nos?
  - 4/4 positiva
  - Predisponerande faktorer? (t.ex orf-virus)
  - Vanligt i nosslemhinnan även hos friska getter

14


### Förändringar *S. aureus*



15

### *S. aureus* i mikroskopet

- Neutrofiler och kokkoida bakterier från krustor i nos



16

### Slutsatser

- Hudförändringar av olika slag vanligt
- Chorioptes vanligt, men ej vanligt med problem för djuren
- *S. aureus* förekom, men var ej vanligt, i studien
  - Fel årstid
- Löss vanligt enligt enkätstudien, inga löss sågs vid gårdsbesöken
  - Fel årstid
- Liten studiepopulation och geografiska begränsningar → slutsatser angående hela landets getpopulation kan ej dras
- Vidare studier angående hudsjukdomar och riskfaktorer för dessa vore av intresse!

17