

Theoretische Informatik: Blatt 4

Abgabe bis 16. Oktober 2015
Assistent: Sascha Krug, CHN D 42

Linus Fessler, Markus Hauptner, Philipp Schimmelfennig

Aufgabe 10

Aufgabe 11

- (a) Wir machen einen Widerspruchsbeweis. *Annahme:* L ist regulär. Dann gilt das *Pumping-Lemma* für L . Wir betrachten nun das Wort

$$w = 0^{n_0}1^{n_0}$$

Offensichtlich gilt $|w| \leq n_0$.

Daher gilt für die Zerlegung $w = yxz$ nach (i) und (ii), dass $y = 0^l$, $x = 0^m$, $l + m \leq n_0$.

Weil $w = yxz = 0^{n_0}1^{n_0} \notin L$ müssen nach (iii) auch alle $w \in \{yx^kz \mid k \in \mathbb{N}\} \notin L$ sein. wenn wir nun das Wort

$$w = yx^2z = 0^l0^{2m}z$$

betrachten, dann hat sich die Anzahl der 0en erhöht, die Anzahl der 1en ist jedoch gleich geblieben. Dadurch ist jedoch nach Definition $w \in L$.

Es gibt ein Widerspruch \Rightarrow Die Annahme war falsch $\Rightarrow L$ ist nicht regulär.