Fasit — 3.6 Modellering

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Regresjon med digitale verktøy

1.1 a) Lineær: y øker med 4 hver gang. b) Eksponentiell: y ganges med 3 hver gang. c) Potens: når x dobles, ganges y med 4. Det er $y = 5x^2$.

1.2 a) 45: vannmengden øker med 45 liter per minutt. 120: det er 120 liter i bassenget ved start. b) 800: 800 følgere ved start. 1,15: antallet ganges med 1,15 per uke, altså 15 % vekst per uke. c) $V(10) = 570$ liter og $N(2) = 800 \cdot 1{,}15^2 = 1\,058$ følgere.

1.3 a) Ja, punktene ligger nesten på en rett linje. b) $f(x) \approx 52{,}0x + 120$ c) 52 elbiler per år d) $f(10) \approx 640$. Ifølge modellen er det omtrent 640 elbiler i 2025.

1.4 a) Differanser: 40, 55, 75, 90, 130, 180 (vokser, ikke lineær). Forhold: omtrent 1,33; 1,34; 1,35; 1,31; 1,34; 1,35, nesten like. Eksponentiell. b) $f(x) \approx 120 \cdot 1{,}34^x$ c) $a \approx 120$: omtrent 120 visninger på dag 0. $b \approx 1{,}34$: antall visninger ganges med 1,34 per dag, altså 34 % vekst per dag. d) Omtrent 1 200 visninger.

1.5 a) 1,42 og $\frac{2{,}01}{1{,}42} \approx 1{,}42$. Samme faktor når L dobles, så potensmodell. b) $T \approx 2{,}01 \cdot L^{0{,}50}$ c) $T(3{,}0) \approx 3{,}5$ s d) Omtrent 2,2 m.

1.6 Steg 1–3 er riktige. Feilen er i steg 4: $1{,}2^x$ med $x = 5$ betyr fem faktorer 1,2, ikke $1{,}2 \cdot 5$. Riktig er $f(5) = 50 \cdot 1{,}2^5 \approx 124{,}4$.

1.7 a) Alltid. Det er definisjonen på en lineær sammenheng: $y = ax + b$ med a lik tillegget. b) Noen ganger. Bare når punktene ligger nøyaktig på kurven, for eksempel to punkter og en rett linje. Ellers ligger noen punkter ved siden av. c) Aldri. Per måned er stigningstallet $\frac{1}{12}$ av stigningstallet per år, fordi det er 12 ganger så mange x-enheter.

1.8 Eksempel: $y = 20, 30, 45, 68, 101$. Jeg ganget med omtrent 1,5 hver gang. Eksponentiell regresjon gir $f(x) \approx 20{,}0 \cdot 1{,}50^x$ med $R^2 \approx 1{,}00$. Lineær gir $R^2 \approx 0{,}95$. Flere svar er riktige, så lenge faktoren er omtrent lik og ikke 1.

1.9 a) x øker ikke med 1 mellom radene (1, 2, 4, 8). For en eksponentiell modell må y ganges med samme tall når x øker med 1. Her dobles x også. b) $y = 6x$ (lineær gjennom origo, også en potensfunksjon med eksponent 1). Sjekk: $6 \cdot 1, 6 \cdot 2, 6 \cdot 4, 6 \cdot 8$. En eksponentiell modell ville gitt feil for $x = 3$.

Sjekk 1 a) Eksponentiell: y ganges med $\frac{1}{2}$ hver gang. b) Da er $x = 0$ første året, og konstanten blir verdien ved start. Årstall gir store, meningsløse konstanter. c) 3,5: batteriprosenten øker med 3,5 prosentpoeng per minutt. 12: batteriet var på 12 % da ladingen startet.

Del 2 — Vurdere modeller og lese tekster

2.1 a) $P(4) = 52$ kr b) $P(35) = -10$. En pris kan ikke være negativ, så modellen gjelder ikke så langt ut. c) $0 \leq x \leq 10$ (dataene). Aldri over $x = 30$, der prisen blir 0.

2.2 Eksempler på gode svar (flere er riktige): a) «Ifølge modellen blir folketallet omtrent 9 000 i 2040, hvis utviklingen fortsetter.» b) «Ifølge modellen dobles prisen omtrent hvert femte år for tidsrommet vi har data om.» c) «$R^2 = 0{,}99$ betyr at kurven passer godt med punktene, men modellen kan likevel være feil for situasjonen.»

2.3 a) Alle punktene ligger nøyaktig på kurven. b) Modellen passer dårlig med punktene. c) Se på punktplottet og prøv en annen modelltype. Vurder om modellen passer med situasjonen.

2.4 a) $f(x) \approx -2{,}19x^2 + 14{,}8x + 12{,}3$ b) Toppunkt ved $x \approx 3{,}4$, altså rundt kl. 13.30, med omtrent 37 besøkende. c) $f(8) \approx -9{,}5$. Antall besøkende kan ikke være negativt. d) $0 \leq x \leq 7$ (dataene). Modellen blir negativ etter $x \approx 7{,}5$, så den gjelder ikke senere enn det.

2.5 a) $x = 0, 4, 8$ med $y = 5\,200, 5\,640, 6\,080$. b) $\frac{6\,080 - 5\,200}{5\,200} \approx 16{,}9\,\%$. Påstanden «over 20 prosent» stemmer ikke. c) Økning 110 per år: $f(x) = 110x + 5\,200$. For 2040 er $x = 25$, så $f(25) = 7\,950$. d) Trengs $\frac{8\,500 - 5\,200}{25} = 132$ per år, altså 22 mer per år enn i modellen. Ordføreren må anta at veksten blir større enn hittil, for eksempel prosentvis vekst.

2.6 Steg 1 og 2 er riktige. Første feil er i steg 3: $\frac{60}{2{,}5} = 24$, ikke 25. Riktig år er $2020 + 24 = 2044$. Steg 5 bør også være «ifølge modellen».

2.7 a) Noen ganger. Høy R^2 hjelper når modelltypen passer med situasjonen. En andregradsmodell kan ha høyere R^2 enn en eksponentiell, men gi urimelig prognose (se U7). b) Alltid, for store nok x. Hver økning i x trekker fra like mye, og til slutt er y under 0. (Modellen er ikke

nødvendigvis gyldig så langt.) c) Aldri. Når x skiftes, endres bare startverdien a (ganges med b opphøyd i skiftet). Fra ett år til neste ganges y fortsatt med samme b.

2.8 a) Lineær: $y \approx 13{,}6x + 98$ med $R^2 \approx 0{,}996$. Eksponentiell: $y \approx 100 \cdot 1{,}11^x$ med $R^2 \approx 0{,}9998$. b) Lineær: omtrent 302 tusen. Eksponentiell: omtrent 480 tusen. c) Gode poeng (2–3 holder): begge passer innenfor dataene, så R^2 avgjør ikke. Eksponentiell vekst på 11 % per år kan ikke fortsette, fordi antall husstander er begrenset og markedet metter seg. Lineær er et forsiktigere anslag, men heller ikke sikker. Nevn forbehold og bruk «ifølge modellen».

2.9 a) $5 \cdot 1{,}015^{200} \approx 98$ millioner. b) Landet har begrenset plass og begrenset med ressurser som mat og vann. Veksten kan ikke bli ved med å være 1,5 % i 200 år. c) En kurve som stiger først, deretter flater ut mot en øvre grense. Det finnes modeller med øvre grense. Flere gode svar finnes.

Sjekk 2 a) $0 \leq x \leq 12{,}5$ b) «Ifølge modellen blir det omtrent 500 brukere i 2030, hvis utviklingen fortsetter.» c) Høy R^2 sier bare at modellen passer med punktene vi har. Langt utenfor dataene kan situasjonen endre seg.

Ekstra utfordring

U1 a) Lineær: $h(t) = 30 + 4t$. b) Eksponentiell: $V(x) = 1000 \cdot 0{,}88^x$, fordi hvert år ganges verdien med $1 - 0{,}12$. c) Potens: $A(s) = s^2$. Doble s, og A ganges med 4. d) Eksponentiell: $N(t) = 3 \cdot 2^t$.

U2 a) $\frac{95}{12} \approx 7{,}9$ og $\frac{760}{95} = 8{,}0$. Samme faktor når L dobles, så potensmodell. b) $W \approx 0{,}0121 \cdot L^{2{,}99}$ c) Vekten ganges med omtrent $2^3 = 8$. d) Omtrent 2 500 g. Usikkert, fordi 60 cm er utenfor dataene (10–40 cm) og fisken kanskje ikke vokser etter samme mønster.

U3 a) $x = 0, 1, 2$ med $y = 50\,000, 90\,000, 162\,000$. b) Forholdene er 1,8 og 1,8. Eksponentiell: $f(x) \approx 50\,000 \cdot 1{,}8^x$. c) $x = 8$ gir omtrent 5,5 millioner. d) Modellen gir tallet i påstanden, men påstanden er neppe rimelig. Gode poeng: modellen bygger på tre tall; ikke alle har eller vil ha appen; vi vet ikke om tallet er unike brukere; veksten må flate ut.

U4 a) `nevner = nevner + (x[i] - x_snitt) ** 2` og `b = y_snitt - a * x_snitt`. b) Utskrift: omtrent 2,657 og $-15{,}295$. Samme som regresjon (avrundet $a \approx 2{,}66$, $b \approx -15{,}3$). c) a: salget øker med omtrent 2,66 tusen kr per grad. b: negativt salg ved 0 grader. Det er meningsløst, fordi 0 grader er langt utenfor dataene (14–29 grader).

U5 Eksempel: $y = 2, 6, 17, 50, 150$. Når x dobles, ganges y med omtrent 3. Potensregresjon gir $y \approx 2{,}0 \cdot x^{1{,}55}$ med $R^2 \approx 1{,}00$. Eksponentiell passer dårlig (R^2 omtrent 0,6). Flere svar er riktige, så lenge y ganges med omtrent samme tall hver gang x dobles.

U6 a) $a\bar{x} + b = a\bar{x} + (\bar{y} - a\bar{x}) = \bar{y}$. Linja gir altså $\bar{y}$ når $x = \bar{x}$. b) $b = 20 - 3{,}0 \cdot 4 = 8$.

U7 a) $y \approx 3{,}54x^2 - 56{,}1x + 361$ med $R^2 \approx 0{,}9998$. b) Toppunktet (bunnpunktet) ligger ved $x \approx 7{,}9$. Etter det stiger parabelen. For 15 år gir modellen omtrent 315 tusen kr, nesten like mye som en to år gammel bil. Urimelig. c) Eksponentiell: $y \approx 327 \cdot 0{,}89^x$ med $R^2 \approx 0{,}97$. For 15 år gir den omtrent 55 tusen kr. Lavere R^2, men en rimelig prognose. Velg eksponentiell, fordi bruktprisen ikke stiger igjen med alder. Andregradsmodellen er bare brukbar for $1 \leq x \leq 8$.