

Versuch 234: Lichtquellen und Gitterspektroskopie




Abbildung 1: Versuchsaufbau

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Physikalische Grundlagen	2
1.2	Versuchsdurchführung	2
2	Messprotokoll	3
3	Auswertung	5
4	Zusammenfassung und Diskussion	6

1 Einleitung

In Versuchs 234 betrachten wir verschiedene Arten von Lichtquellen und deren Spektren. Hierbei unterscheiden wir speziell zwischen Temperaturstrahlern und Nichttemperaturstrahlern, welche in ihrer Art und Weise, Licht bzw. Strahlung auszusenden auf zwei verschiedenen physikalischen Phänomenen basieren.

1.1 Physikalische Grundlagen

Zur Erklärung von **Temperaturstrahlern** betrachten wir zunächst einen idealisierten schwarzen Körper, also einen Körper mit dem Emissionsvermögen $\varepsilon = 1$. Sobald die Temperatur T dieses, und allgemein jedes Körpers, größer 0K ist, sendet dieser elektromagnetische Strahlung aus, deren Intensität dem Planck'schen Strahlungsgesetz

$$M_\lambda(\lambda, T) dA d\lambda = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} dA d\lambda \quad (1)$$

folgt. M_λ steht hierbei für die Strahlungsleistung, welche vom Flächenelement dA im Wellenlängenbereich $[\lambda, \lambda + d\lambda]$ abgestrahlt wird. Die Intensitätsverteilung besitzt ein Maximum bei einer bestimmten Wellenlänge, welche nach dem Wie'schen Verschiebungsgesetz

$$\lambda_{\max} = \frac{2897.8 \mu\text{m K}}{T} \quad (2)$$

von der Temperatur des Körpers abhängt.

Durch Betrachtung der Farbe des ausgestrahlten Lichts lassen sich die Lichtquellen charakterisieren. Ein Körper erscheint bei einer Temperatur von 0K absolut schwarz. Darauf folgt bei leichter Erwärmung die Emission von zunächst rotem Licht. Bei einer weiteren Erwärmung wird zusätzlich grünes Licht emittiert, welches sich mit den Rotanteilen zu orange bis gelblich erscheinendem Licht vermischt. Weißlich wirkendes Licht erhält man, wenn sich bei einer Temperatur von etwa 5500K alle Wellenlängen des sichtbaren Bereichs mit etwa gleicher Intensität emittiert werden. Mit weiterer Erwärmung des Körpers kommen vermehrt Blauanteile hinzu, welche das Licht zunächst hellblau, dann blau bis violett erscheinen lässt.


1.2 Versuchsdurchführung

Versuchsprotokoll 234

Narius Pfeiffer
Robert Grosch

12.02.2025

Versuchsaufbau



Aufgabe 1, Sonnenlichtspektrum

Integrationszeit 100ms, 1 Scan to Average

Die Dunkelstrommessung zeigt, wie erwartet, nur bei sehr hoher Zoomstufe Ausschläge im Spektrum.

Intensität bei Sonnenlichtspektrum ohne Fenster allgemein etwas höher als durch das Fenster. Vor allem im IR- und UV-Bereich des Spektrums sichtbar.

Aufgabe 2, Vergleich der Spektren verschiedener Lichtquellen

(a) LEDs in rot, orange, gelb, blau zeigen um die jeweilige Farbe zentriertes Spektrum

LEDs in weiß zeigen ein kontinuierliches Spektrum auf. Je "wärmer" das Weiß, umso geringer ist der blaue Peak

- (b) Spektrum der Glühlampe ist kontinuierlich
- (c) Spektrum der Energiesparlampe ist diskret
- (d) Spektrum des Lasers konzentriert, diskret um 532 nm

Spektren wurden alle mit 100ms Integrationszeit aufgenommen.

Aufgabe 3

Integrationszeit 100ms, 40 Scans für Mittelwert

Aufgabe 4

Bei Sättigung im D-Peak

Integration Time: 10ms

Scans für Mittelwert: 1

Ohne Sättigung im D-Peak

Integration Time: 10ms

Scans für Mittelwert: 5

Aufgabe 5

H. Lutz

Integration Time: 50ms

Scans für Mittelwert: 5

Alle Messungen wurden mit Dunkelstromkorrektur durchgeführt.

3 Auswertung

4 Zusammenfassung und Diskussion

$$x = 3 \frac{1}{|\text{cm}|} \quad (3)$$

$$x = 3 \text{ cm} \quad (4)$$

$$H = \frac{\vec{p}^2}{2m} + \frac{m}{2} \omega^2 \vec{q} \quad (5)$$

$$\vec{p}^2 = \delta_{ij} p_i p_j \quad (6)$$

$$\vec{q}^2 = \delta_{kl} q_k q_l \quad (7)$$

$$\{L_i, H\} = \left\{ \varepsilon_{abc} q_b p_c, \frac{\delta_{ij} p_i p_j}{2m} + \frac{m}{2} \omega^2 \delta_{kl} q_k q_l \right\} \quad (8)$$

$$= \varepsilon_{abc} \left\{ q_b p_c, \frac{\delta_{ij} p_i p_j}{2m} + \frac{m}{2} \omega^2 \delta_{kl} q_k q_l \right\} \quad (9)$$

$$= \varepsilon_{abc} \left(\frac{1}{2m} \{q_b p_c, \delta_{ij} p_i p_j\} + \frac{m}{2} \omega^2 \{q_b p_c, \delta_{kl} q_k q_l\} \right) \quad (10)$$

$$(11)$$