Tabela 1: MOR por tipo de câncer grupos A e C

| | 1 | | | | |
|------------------------|------|------------|---------|--|--|
| Tipo | MOR | IC-95% | P-valor | | |
| Bexiga | 4,81 | 0,66-35,25 | 0,0902 | | |
| Colorretal | 0,31 | 0,04-2,45 | 0,2436 | | |
| Esôfago | 7,42 | 1,19-45,99 | 0,0128 | | |
| Estômago | 1,28 | 0,34-4,82 | 0,7150 | | |
| Fígado | 1,07 | 0,29-3,95 | 0,9187 | | |
| Linfoma não hodgkin | 4,81 | 0,66-35,25 | 0,0902 | | |
| Mama | 1,16 | 0,24-5,69 | 0,8532 | | |
| Osso | 2,34 | 0,21-26,49 | 0,4801 | | |
| Pâncreas | 1,79 | 0,45-7,08 | 0,4009 | | |
| Pele | 0,92 | 0,10-8,11 | 0,9411 | | |
| Próstata | 0,82 | 0,26-2,53 | 0,7314 | | |
| Pulmão | 1,82 | 0,82-4,02 | 0,1381 | | |
| Rim | 1,89 | 0,35-10,12 | 0,4504 | | |
| Laringe | 0,65 | 0,07-5,44 | 0,6900 | | |
| - | 1 | I | I | | |