

# Глобальные сейсмические серии: статистический анализ пространственно-временной кластеризации землетрясений $M \geq 6.5$ за 1973–2026 гг.

© 2026 г. Ярослав Маршалкин

Ярослав Маршалкин

e-mail: marshalkin@gmail.com

Telegram: @MRSHLKN | GitHub: github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering

## Аннотация.

Статья посвящена статистическому анализу пространственно-временной кластеризации землетрясений  $M \geq 6.5$  по объединённому каталогу 4418 записей CSV (вкл.  $\sim 151$   $M < 6.5$  из NOAA), 4267 уникальных событий  $M \geq 6.5$  (4418 строк CSV; анализ  $M \geq 6.5$ ; 2041 событие в современном окне 1973–2026). Обнаружение кандидатов — выход либерального детектора; главный вывод — null/falsification: ETAS  $p_{\text{ETAS}}=1,0$  (mean 27,0). Permutation  $p=0.0001$  (1/10,001) отвергает пуассоновские времена, не доказывает глобальные серии. Источники: USGS ComCat, ISC Bulletin, NOAA NGDC ( $M_c=6.55$ ,  $b=0.911 \pm 0.018$ ). На основе метрики Байеси–Пачуски с эвристической метрикой с тектонической подсказкой (граф Bird 2003) алгоритм находит 47 кандидатов детектора (27 на современном окне). Permutation ( $n=10\,000$ ,  $p=0.0001$ , 1/10,001) отвергает пуассоновские времена; ETAS (1000 кат.,  $FPR=1000/1000$ , mean 27,0,  $p_{\text{ETAS}}=1,0$ ) показывает отсутствие избыточной глобальной структуры.

Ключевые слова: глобальная сейсмичность; сейсмические серии; эвристическая метрика с тектонической подсказкой; кластеризация землетрясений; метрика Байеси–Пачуски; Монте-Карло; Флинн–Энгдал; палеосейсмология; статистический триггеринг; Gutenberg–Richter

Благодарность. Авторы выражают признательность USGS, NOAA NGDC и ISC за поддержание открытых сейсмологических каталогов. Работа выполнена без целевого финансирования.

## Global Seismic Series: Statistical Analysis of Spatiotemporal Clustering in $M \geq 6.5$ Earthquake Catalogs, 1973–2026 CE

Ярослав Маршалкин (Yaroslav Marshalkin)

e-mail: marshalkin@gmail.com | Telegram: @MRSHLKN

## Abstract.

Whether large earthquakes cluster in space and time beyond chance is a foundational question in seismic hazard assessment. We analyse a merged catalog of 4,267 unique  $M \geq 6.5$  events (from 4,418 CSV rows;  $\sim 151$  NOAA  $M < 6.5$  rows excluded from clustering; 47 historical NOAA records pre-1900), identifying 47 global seismic series in three temporal windows. Significance is assessed by a three-level framework: permutation test ( $n=10,000$ ,  $p=0.0001$  (1/10,001),  $z=-6.17$ ), ETAS null-model validation (1000 synthetic catalogs,  $FPR=1000/1000$ ; catalog-calibrated null: mean 27.0,  $p_{\text{ETAS}}=1.0$ ; literature defaults  $\mu=0.008$ : mean 15.4,  $p \leq 0.001$ ;  $N_{\text{obs}}=27$ ), and Benjamini–Hochberg FDR sensitivity (Methods only). Largest early-instrumental candidate: 1905–1910 (193 events, catalog incomplete before  $\sim 1960$ ); modern detector candidate S170 (46 events, 12 Flinn–Engdahl regions, 2002–2023,  $M_{\text{max}}=9.1$ ). Heuristic with tectonic hint (Bird 2003): 98% GC fallback — failed hypothesis test; median  $\text{Datalog}_{10\sigma} = +0.28$ .

Keywords: global seismicity; seismic series; earthquake clustering; heuristic metric with tectonic hint; Baiesi–Paczuski metric; ETAS validation; Monte Carlo; Flinn–Engdahl; paleoseismology; statistical triggering; Gutenberg–Richter

About the author: Yaroslav Marshalkin — independent researcher. Contact: marshalkin@gmail.com, Telegram @MRSHLKN.

---

## ВВЕДЕНИЕ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

Одним из фундаментальных вопросов современной сейсмологии является вопрос о том, образуют ли крупные землетрясения ( $M \geq 6.5$ ) систематические пространственно-временные серии, выходящие за рамки локальных афтершоковых зон, или наблюдаемая группировка является случайной флуктуацией пуассоновского процесса. Практическое значение ответа трудно переоценить: если мультирегиональные серии реальны, условная вероятность крупного события в удалённых тектонических зонах существенно меняется — что напрямую влияет на вероятностный анализ сейсмической опасности [Cornell, 1968].

Первые систематические свидетельства дистанционного триггеринга получили Hill et al. [1993] после землетрясения Ланделс-Хиллс (Landers, Mw 7.3, 1992 г.): сейсмическая активность возникла на расстояниях свыше 1000 км. Brodsky & Prejean [2006] показали, что поверхностные волны способны инициировать рои в вулканических зонах на тысячи километров. Землетрясение Суматра–Андаман 2004 г. (Mw 9.1) активировало ряд удалённых сегментов, что ряд авторов объясняет долгосрочным глобальным возмущением поля напряжений [Freed, Lin, 2001; Pollitz et al., 1998].

Тем не менее систематичность подобных связей оспаривается. Michael [2011] показал, что кластеризация  $M \geq 7$  в 1995–2011 гг. статистически неотличима от случайных флуктуаций. Shearer & Stark [2012] подтвердили, что глобальные частоты  $M \geq 7$  и  $M \geq 8$  не возросли после Суматры 2004. Дискуссию дополнили работы по дублетам [Kagan, Jackson, 1999]: повышенная вероятность второго события вблизи эпицентра первого подтверждает локальные корреляции, не исчерпывая дальнोдействующих связей.

Модель ETAS [Ogata, 1988] откалибрована для региональных сетей и не описывает межплитные корреляции. Метрика Байеси–Пачуски [2004] и её обобщение Зализяпина–Бен-Зиона [2008, 2013] позволяют объективно выявлять кластеры, но используют евклидово расстояние, игнорируя плитно-тектоническую геометрию литосферы.

Цель работы — проверить гипотезу о наличии мультирегиональных серий в инструментальном каталоге 1973–2026 гг. с применением адаптированной метрики  $\eta$  с тектоническим расстоянием вдоль границ плит Bird (2003). Охват: кластеризация с тектоническим расстоянием, ETAS и FDR; дополняет тесты частот Michael (2011) и Shearer & Stark (2012), не отменяя их выводы.

---

## СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕДЁННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

### 1. Данные

#### 1.1 Источники и формирование каталога

Исследование основано на трёх каталогах: USGS ComCat — инструментальный, с 1900 г.,  $M \geq 4.5$ , использованы записи  $M \geq 6.5$  за 1973–2026 гг.; ISC Bulletin — переопределённые гипоцентры для верификации; NOAA NGDC — исторические и палеосейсмические события до 1900 г. (47 записей). Дублирующие записи: допуск  $\pm 30$  сут.,  $\leq 50$  км; ранг надёжности  $ISC > USGS > NOAA$ . После дедупликации (допуск  $\pm 30$  сут.,  $\leq 50$  км) каталог содержит 4267 уникальных событий  $M \geq 6.5$  (из 4418 CSV-строк, вкл.  $\sim 151$   $M < 6.5$  из NOAA). USGS ComCat: 2088 сырых  $M \geq 6.5$  (1973–2026)  $\rightarrow$  2041 после merge/ISC. GK удаляет

~24 афтершока (2017 независимых, 98.8 %). quality\_score 0.30–0.95 — метаданные по эпохе и фазовым отсчётам (Woessner & Wiemer 2005), не критерий отбора. Итоговый каталог: 4267 событий  $M \geq 6.5$  (4418 записей CSV); 2041 — современный (1973–2026), 2179 — ранний (1900–1972), 47 — исторический (фрагментарные палеосейсмические записи).

## 1.2 Анализ полноты каталога

Метод максимальной кривизны даёт  $M_a = 6.55$ . Оценка  $b$ -значения методом максимального правдоподобия по 1688 событиям выше  $M_a$ :

$$b = 0.911 \pm 0.018 \quad (n = 1688 \text{ событий})$$

## 2. Методология

### 2.1 Эвристическая метрика с тектонической подсказкой

Протестирована альтернатива евклидовому расстоянию (граф Bird 2003). В 98% пар реализация сводится к 1,5х дуге большого круга — по сути масштабированное евклидово; улучшения для глобального анализа нет (отрицательный тест гипотезы).  $r_{ij}$  — кратчайший путь между гипоцентрами вдоль глобального графа границ плит Bird (2003), включающего 20 сегментов (субдукционные зоны, трансформные разломы, срединно-океанические хребты). Кратчайший путь находится алгоритмом Дейкстры (пакет NetworkX). Если гипоцентр удалён  $>500$  км от ближайшего узла границы или путь по графу отсутствует, применяется фолбэк:  $r_{ij} = 1.5 \times r_{GC}$  (дуга большого круга). Аудит фолбэка (analyze\_tectonic\_fallback.py, fig07): 4987 пар из 500 событий; 98.0% GC-фолбэк 1.5х, 2.0% Dijkstra (4015 snap $>500$  km, 872 нет пути, 100 Dijkstra; 95 существенно отличаются; примеры FE31 Япония, FE35 Филиппины). Метрика значима только для ~2% пар у границ. Диагностика (generate\_grl\_figures.py): медиана  $\Delta \log_{10} \eta = +0.28$  (~98% — GC-фолбэк 1.5х).

### 2.2 Метрика связности eta

Вслед за Baiesi & Paczuski [2004] и Zaliapin et al. [2008] определим метрику связности между претендентом-родителем  $i$  и последующим событием  $j$ :

$$\eta_{ij} = t_{ij} \times r_{ij}^{1.6} \times 10^{(-b \times m_i)}$$

$b=1.0$  — конвенция Baiesi & Paczuski (2004) для сопоставимости  $\eta$ ; эмпирическое  $b=0.911 \pm 0.018$  — только в Monte Carlo-нуле и оценке полноты.

| Компонент  | Обозначение            | Физический смысл                              |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Время      | $t_{ij}$ (лет)         | Штраф за большой временной разрыв             |
| Расстояние | $r_{ij}^{1.6}$ (км)    | Штраф за большое расстояние (эвристика)       |
| Магнитуда  | $10^{(-b \times m_i)}$ | Усиление связи при большой магнитуде родителя |

### 2.3 Конвейер анализа

Сырые каталоги -> дедупликация -> исключить  $M < 6.5$  (~151 NOAA) -> GK-декластеризация (основной) ->  $\eta$  NN-лес -> скользящие окна -> объединение перекрывающихся -> критерии серии -> MC/ETAS/FDR. GK: 24 афтершока (2017/2041, 98.8%). ZBZ: 1 зависимое (2040/2041) — отдельная проверка чувствительности, не последовательный фильтр. `run_full_historical_analysis.py: global_series()` без GK-префильтра.

## 2.4 Порог $\eta_0$ , поиск серий и параметры ETAS

Порог  $\eta_0$  выбирается автоматически из распределения  $\eta$  ближайших соседей: KDE-детекция долины между модами  $\log_{10}(\eta)$  (Zaliapin & Ben-Zion 2013); по умолчанию  $\eta_0 = 10^{\text{median } \log_{10} \eta}$ . Валидация против пуассоновского перестановочного нуля (Monte Carlo,  $n=10\,000$ ).

1. Декластеризация Gardner–Knopoff [1974] для удаления локальных афтершоков.
2. Лес ближайших соседей: для  $j$  — родитель  $i^* = \text{argmin } \eta_{ij}$  при  $\eta_{ij} < \eta_0$ .
3. Критерий глобальной серии:  $N \geq 4$ ;  $M \geq 6.5$ ;  $\geq 3$  зон Флинна–Энгдала.
4. Скользящие окна: 1, 2, 5 лет; перекрывающиеся группы объединяются.

ETAS-параметры (калибровка на каталоге): MLE на 2041 событии (`scripts/calibrate_etas.py`, `results/etas_calibration.json`):  $\mu \approx 0.103$ ,  $K \approx 0.495$ ,  $\alpha \approx 0.063$ ,  $c \approx 10^{-4}$  сут.,  $p \approx 1.36$ . Литературные defaults (Helmstetter & Sornette 2003:  $\mu=0.008$ ,  $K=0.08$ ) сохранены для сравнения. Multiseed — перспектива.

## 2.5 Статистическая валидация

Тест Монте-Карло.  $n_{\text{sim}}=10\,000$  перестановок:  $p=0.0001$  (1/10,001),  $z=-6.17$  для современного периода. ETAS-валидация. Калиброванные параметры из `etas_calibration.json`; 1000 синтетических каталогов (`seed=42`); порог 500 km.  $\text{FPR}=1000/1000$ ; mean 27,0 (max 27);  $N_{\text{obs}}=27$ ;  $p_{\text{ETAS}}=1.0$  — неотлично от null. Для сравнения, лит.  $\mu=0.008$ : mean 15,4, max 24,  $p_{\text{ETAS}} \leq 0.001$ . Ограничение: детектор либерален ( $\text{FPR}=1000/1000$ ); ужесточение критериев — перспектива. FDR ( $q=0.05$ ): 45/47 значимы. Декластеризация: GK 2017/2041 (24 афтершока); ZBZ 2040/2041 (1 зависимое) — разные критерии, не последовательный фильтр.

# 3. Результаты

## 3.1 Идентифицированные серии

Полный анализ выявил 47 глобальных серий: 27 современных ( $p=0.0001$ , 1/10,001), 15 ранних ( $p=0.007$ , но  $\text{quality\_score} < 0.7$  до 1960 г. ограничивает интерпретацию), 5 исторических кандидатов (статистически не значимы,  $p=0.46$ ; только 47 событий  $M \geq 6.5$  до 1900 г., фрагментарные палеосейсмические записи). 142 кластера-кандидата до фильтрации. Топ-5 серий — в таблице ниже.

| ID        | N   | Регион<br>в | Mmax | Период    | Примечание                                                                    |
|-----------|-----|-------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1905–1910 | 193 | 43          | 8.8  | 1905–1910 | Крупнейший кандидат в раннем инструментальном окне; каталог неполный до ~1960 |
| S047      | 53  | 5           | 8.0  | 1982–2024 | Западная Пацифика, циркум-субдукц. коридор                                    |
| S170      | 46  | 12          | 9.1  | 2002–2023 | Зондский пояс, Суматра 2004 (M 9.1)                                           |

|      |    |   |     |           |                                    |
|------|----|---|-----|-----------|------------------------------------|
| S095 | 25 | 4 | 7.9 | 1989–2017 | Западно-тихоокеанская дуга         |
| S116 | 22 | 5 | 8.2 | 1993–2021 | Южная Пацифика, многодуговая серия |

Таблица 1. Топ-5 мультирегиональных серий ( $\geq 3$  регионов Флинна–Энгдаля).

### 3.2 Статистическая значимость

Перестановочный тест ( $n_{\text{sim}}=10\,000$ ):

**$p \leq 0.0001$  ( $z = -6.17$ , современный период 1973–2026)**

**$p_{\text{ETAS}} = 1,0$  (ETAS калибр., 1000 кат.,  $\text{FPR}=1000/1000$ ,  $\text{mean}=27,0$ )**

**лит.  $\mu=0,008$ :  $\text{mean } 15,4$ ,  $\text{max } 24$ ,  $p_{\text{ETAS}} \leq 0,001$  (сравнение)**

Коррекция FDR ( $q=0.05$ ): 45 из 47 — post-hoc (Methods), не discovery. Permutation  $p=0,0001$  ( $1/10\,001$ ) отвергает пуассоновские времена; ETAS  $\text{mean}=27,0$ ,  $p_{\text{ETAS}}=1,0$  — нет избыточной глобальной структуры. Multiseed ETAS (seeds 42–51,  $n=1000$ ):  $\text{mean}\approx 27$ ,  $\text{FPR}=1,0$ .

### 3.3 Пространственно-временное распределение

Повышенная активность серий: 1952–1965 гг. и 2002–2016 гг. (пост-суматранский период). Пространственно — вдоль циркум-тихоокеанского пояса (Камчатка, Курилы, Япония, Тонга, Индонезия). Диагностика тектоники vs евклидовой метрики: медиана  $\Delta \log_{10} \eta = +0.28$  на случайных парах (в основном GC-фолбэк  $1.5\times$ ).

### 3.4 Обсуждение

Null/falsification: ETAS  $\text{mean}=27,0$ ,  $p_{\text{ETAS}}=1,0$  — избыточной глобальной структуры нет. Физика:  $\Delta$  CFS/динамический стресс — future work; кандидаты — алгоритмические конструкторы, не цепочки triggering.

---

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (ВЫВОДЫ)

Применение калиброванной ETAS-модели показывает, что число мультирегиональных кластеров, обнаруживаемых либеральным детектором, не превышает ожидаемого от локальной афтершоковой активности. Гипотеза о существовании глобальных сейсмических серий не подтверждается. Перестановочный тест отвергает лишь пуассоновскую нулевую гипотезу — тривиально для сейсмических каталогов.

1. Эвристическая метрика с тектонической подсказкой: 98% GC-фолбэк — failed hypothesis test.

2. 47 кандидатов детектора неотличимы от ETAS-null; Delta CFS — future work.

Доступность данных: [github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering \(docs/data\\_availability.md\)](https://github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering/docs/data_availability.md). Внешний DOI (Zenodo) отложен — GitHub only. Перспективы / дополнение: статический Delta CFS и динамический стресс для S170, S047, S095; полный ETAS MLE; multiseed.

---

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Baiesi M., Paczuski M. Scale-free networks of earthquakes and aftershocks // *Physical Review E*. 2004. Vol. 69. P. 066106. DOI: 10.1103/PhysRevE.69.066106
2. Zaliapin I. et al. Clustering analysis of seismicity and aftershock identification // *Physical Review Letters*. 2008. Vol. 101. P. 018501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.018501
3. Zaliapin I., Ben-Zion Y. Earthquake clusters in southern California I // *J. Geophys. Res.* 2013. Vol. 118. P. 2847–2864. DOI: 10.1002/jgrb.50179
4. Bird P. An updated digital model of plate boundaries // *Geochem. Geophys. Geosyst.* 2003. Vol. 4. □3. P. 1027. DOI: 10.1029/2001GC000252
5. Hill D.P. et al. Seismicity remotely triggered by the magnitude 7.3 Landers earthquake // *Science*. 1993. Vol. 260. P. 1617–1623. DOI: 10.1126/science.260.5114.1617
6. Brodsky E.E., Prejean S.G. New constraints on mechanisms of remotely triggered seismicity at Long Valley Caldera // *J. Geophys. Res.* 2006. Vol. 111. P. B06312. DOI: 10.1029/2005JB003869
7. Pollitz F.F. et al. Viscosity of oceanic asthenosphere inferred from remote triggering of earthquakes // *Science*. 1998. Vol. 280. P. 1245–1249. DOI: 10.1126/science.280.5367.1245
8. Freed A.M., Lin J. Delayed triggering of the 1999 Hector Mine earthquake by viscoelastic stress transfer // *Nature*. 2001. Vol. 411. P. 180–183. DOI: 10.1038/35075548
9. Michael A.J. Random variability explains apparent global clustering of large earthquakes // *Geophys. Res. Lett.* 2011. Vol. 38. P. L21301. DOI: 10.1029/2011GL049443
10. Shearer P.M., Stark P.B. Global risk of big earthquakes has not recently increased // *PNAS*. 2012. Vol. 109. □3. P. 717–721. DOI: 10.1073/pnas.1118525109
11. Ogata Y. Statistical models for earthquake occurrences and residual analysis // *J. Amer. Stat. Assoc.* 1988. Vol. 83. P. 9–27. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478560
12. Gutenberg B., Richter C.F. Earthquake magnitude, intensity, energy, and acceleration // *Bull. Seismol. Soc. Am.* 1956. Vol. 46. P. 105–145
13. Woessner J., Wiemer S. Assessing the quality of earthquake catalogues // *Bull. Seismol. Soc. Am.* 2005. Vol. 95. P. 684–698. DOI: 10.1785/0120040007

14. Aki K. Maximum likelihood estimate of  $b$  in  $\log N = a - bM$  // Bull. Earthq. Res. Inst. 1965. Vol. 43. P. 237–239
  15. Shi Y., Bolt B.A. The standard error of the magnitude-frequency  $b$  value // Bull. Seismol. Soc. Am. 1982. Vol. 72. P. 1677–1687
  16. Gardner J.K., Knopoff L. Is the sequence of earthquakes in Southern California Poissonian? // Bull. Seismol. Soc. Am. 1974. Vol. 64. P. 1363–1367
  17. Benjamini Y., Hochberg Y. Controlling the false discovery rate // J. Roy. Stat. Soc. B. 1995. Vol. 57. □1. P. 289–300
  18. King G.C.P. et al. Static stress changes and the triggering of earthquakes // Bull. Seismol. Soc. Am. 1994. Vol. 84. P. 935–953
  19. Stein R.S. The role of stress transfer in earthquake occurrence // Nature. 1999. Vol. 402. P. 605–609
  20. Young J.B. et al. The Flinn–Engdahl regionalization scheme: the 1995 revision // Phys. Earth Planet. Int. 1996. Vol. 96. P. 223–297. DOI: 10.1016/0031-9201(96)03141-X
  21. Storchak D.A. et al. Public release of the ISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue // Seismol. Res. Lett. 2013. Vol. 84. P. 810–815. DOI: 10.1785/0220130034
  22. Kagan Y.Y. Fractal dimension of brittle fracture // J. Nonlinear Sci. 1991. Vol. 1. P. 1–16. DOI: 10.1007/BF01209146
- 

## **ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ**

1. USGS Earthquake Hazards Program. ComCat API. URL: <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/> (дата обращения: 27.06.2026)
2. NOAA National Geophysical Data Center. Significant Earthquake Database. URL: <https://www.ngdc.noaa.gov/> (дата обращения: 27.06.2026)
3. ISC. International Seismological Centre Bulletin. URL: <http://www.isc.ac.uk/> (дата обращения: 27.06.2026)