

机器学习导论

作业四

151220097, 孙旭东, 248381185@qq.com

2018 年 5 月 19 日

1 [30pts] Kernel Methods

Mercer定理告诉我们对于一个二元函数 $k(\cdot, \cdot)$ ，它是正定核函数当且仅当对任意 N 和 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N$ ，它对应的核矩阵是半正定的。假设 $k_1(\cdot, \cdot)$ 和 $k_2(\cdot, \cdot)$ 分别是关于核矩阵 K_1 和 K_2 的正定核函数。另外，核矩阵 K 中的元素为 $K_{ij} = k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ 。请根据Mercer定理证明对应于以下核矩阵的核函数正定。

- (1) [10pts] $K_3 = a_1 K_1 + a_2 K_2$, 其中 $a_1, a_2 \geq 0$.
- (2) [10pts] $f(\cdot)$ 是任意实值函数，由 $k_4(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = f(\mathbf{x})f(\mathbf{x}')$ 定义的 K_4 .
- (3) [10pts] 由 $k_5(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = k_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}')k_2(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ 定义的 K_5 .

Solution.

- (1) 要证明 K_3 对应的核函数正定，即证明 K_3 半正定。

由于 K_1 和 K_2 对应的核函数是正定核函数，所以 K_1 和 K_2 都是半正定矩阵。所以有：对任意非零向量 \mathbf{x} ，都有：

$$\mathbf{x}^T K_1 \mathbf{x} \geq 0 \quad (1.1)$$

$$\mathbf{x}^T K_2 \mathbf{x} \geq 0 \quad (1.2)$$

又因为 $a_1, a_2 \geq 0$ ，所以：

$$\mathbf{x}^T a_1 K_1 \mathbf{x} \geq 0 \quad (1.3)$$

$$\mathbf{x}^T a_2 K_2 \mathbf{x} \geq 0 \quad (1.4)$$

那么可以得到：

$$\mathbf{x}^T K_3 \mathbf{x} = \mathbf{x}^T (a_1 K_1 + a_2 K_2) \mathbf{x} = \mathbf{x}^T a_1 K_1 \mathbf{x} + \mathbf{x}^T a_2 K_2 \mathbf{x} \geq 0 \quad (1.5)$$

所以可得 K_3 是半正定矩阵，所以对应的核函数正定。

(2) 设 K_{ij} 表示 K_4 的 i 行, 第 j 列的项。对于任意非零向量 \mathbf{x} , 用 x_i 表示 \mathbf{x} 的第 i 个项, 可以有:

$$\mathbf{x}^T K_4 \mathbf{x} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N x_i K_{ij} x_j \quad (1.6)$$

又因为 $k_4(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = f(\mathbf{x}_i)f(\mathbf{x}_j)$, 所以为了方便证明令 $t_i = f(\mathbf{x}_i)$, 可得 $K_{ij} = k_4(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = f(\mathbf{x}_i)f(\mathbf{x}_j) = t_i t_j$, 结合上式可得:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^T K_4 \mathbf{x} &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N x_i K_{ij} x_j = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N x_i t_i t_j x_j \\ &= \sum_{i=1}^N (x_i t_i)^2 + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N x_i t_i x_j t_j \\ &= (t_1 x_1 + t_2 x_2 + \dots + t_n x_n)^2 \geq 0 \end{aligned} \quad (1.7)$$

所以可得 K_4 是半正定矩阵, 所以对应的核函数正定。

2 [25pts] SVM with Weighted Penalty

考虑标准的SVM优化问题如下(即课本公式(6.35)),

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}, b, \xi_i} \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^m \xi_i \\ \text{s.t.} \quad & y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \xi_i \\ & \xi_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, m. \end{aligned} \quad (2.1)$$

注意到, 在(2.1)中, 对于正例和负例, 其在目标函数中分类错误的“惩罚”是相同的. 在实际场景中, 很多时候正例和负例错分的“惩罚”代价是不同的. 比如考虑癌症诊断问题, 将一个确实患有癌症的人误分类为健康人, 以及将健康人误分类为患有癌症, 产生的错误影响以及代价不应该认为是等同的.

现在, 我们希望对负例分类错误的样本(即false positive)施加 $k > 0$ 倍于正例中被分错的样本的“惩罚”. 对于此类场景下,

(1) [10pts] 请给出相应的SVM优化问题.

(2) [15pts] 请给出相应的对偶问题, 要求详细的推导步骤, 尤其是如KKT条件等.

Solution. 此处用于写解答(中英文均可)

(1) 定义 \mathbf{P} 表示正例的下标的集合, \mathbf{N} 表示负例的下标的集合, 相应的SVM优化问题为:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}, b, \xi_i} \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i \in \mathbf{P}} \xi_i + Ck \sum_{i \in \mathbf{N}} \xi_i \\ \text{s.t.} \quad & y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \xi_i \\ & \xi_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, m. \end{aligned} \quad (2.2)$$

(2) 根据上式(2.2), 使用拉格朗日乘子法可得拉格朗日函数如下:

$$\begin{aligned} L(\mathbf{w}, b, \alpha, \xi, \mu) = & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i \in \mathbf{P}} \xi_i + Ck \sum_{i \in \mathbf{N}} \xi_i \\ & + \sum_{i=1}^m \alpha_i (1 - \xi_i - y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b)) - \sum_{i=1}^m \mu_i \xi_i \end{aligned} \quad (2.3)$$

其中 $\alpha_i \geq 0$, $\mu_i \geq 0$ 是拉格朗日乘子.

令 $L(\mathbf{w}, b, \alpha, \xi, \mu)$ 对 \mathbf{w} , b , ξ_i 的偏导为零可得

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i \mathbf{x}_i \quad (2.4)$$

$$0 = \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i \quad (2.5)$$

$$C = (\alpha_i + \mu_i)(\mathbb{I}(i \in \mathbf{P}) + \frac{1}{k} \mathbb{I}(i \in \mathbf{N})) \quad (2.6)$$

为了方便解答，这里用到了指示器函数，定义如下：

$$\mathbb{I}(\cdot) = \begin{cases} 1 & \cdot \text{ is true} \\ 0 & \cdot \text{ is false} \end{cases} \quad (2.7)$$

现在将(2.4) – (2.6)代入式(2.3)即可得到式(2.2)的对偶问题

$$\begin{aligned} \max_{\alpha} \quad & \sum_{i=1}^m \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_j \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i = 0 \\ & 0 \leq \alpha_i \leq 1, i = 1, 2, \dots, m. \end{aligned} \quad (2.8)$$

3 [30pts+10*pts] Nearest Neighbor

假设数据集 $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ 是从一个以 $\mathbf{0}$ 为中心的 p 维单位球中独立均匀采样而得到的 n 个样本点. 这个球可以表示为:

$$B = \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x}\|^2 \leq 1\} \subset \mathbb{R}^p. \quad (3.1)$$

其中, $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$, $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$ 是 \mathbb{R}^p 空间中向量的内积. 在本题中, 我们将探究原点 O 与其最近邻(1-NN)的距离 d^* , 以及这个距离 d^* 与 p 之间的关系. 在这里, 我们将原点 O 以及其1-NN之间的距离定义为:

$$d^* := \min_{1 \leq i \leq n} \|\mathbf{x}_i\|, \quad (3.2)$$

不难发现 d^* 是一个随机变量, 因为 \mathbf{x}_i 是随机产生的.

(1) [5pts] 当 $p = 1$ 且 $t \in [0, 1]$ 时, 请计算 $\Pr(d^* \leq t)$, 即随机变量 d^* 的累积分布函数(Cumulative Distribution Function, **CDF**).

(2) [10pts] 请写出 d^* 的**CDF**的一般公式, 即当 $p \in \{1, 2, 3, \dots\}$ 时 d^* 对应的取值. 提示: 半径为 r 的 p 维球体积是:

$$V_p(r) = \frac{(r\sqrt{\pi})^p}{\Gamma(p/2 + 1)}, \quad (3.3)$$

其中, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(1) = 1$, 且有 $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ 对所有的 $x > 0$ 成立; 并且对于 $n \in \mathbb{N}^*$, 有 $\Gamma(n+1) = n!$.

(3) [10pts] 请求解随机变量 d^* 的中位数, 即使得 $\Pr(d^* \leq t) = 1/2$ 成立时的 t 值. 答案是与 n 和 p 相关的函数.

(4) [附加题10pts] 请通过**CDF**计算使得原点 O 距其最近邻的距离 d^* 小于 $1/2$ 的概率至少 0.9 的样本数 n 的大小. 提示: 答案仅与 p 相关. 你可能会用到 $\ln(1-x)$ 的泰勒展开式:

$$\ln(1-x) = -\sum_{i=1}^{\infty} \frac{x^i}{i}, \quad \text{for } -1 \leq x < 1. \quad (3.4)$$

(5) [5pts] 在解决了以上问题后, 你关于 n 和 p 以及它们对1-NN的性能影响有什么理解.

Solution. 此处用于写解答(中英文均可)

4 [15pts] Principal Component Analysis

一些经典的降维方法，例如PCA，可以将均值为 $\mathbf{0}$ 的高维数据通过对其协方差矩阵的特征值计算，取较高特征值对应的特征向量的操作而后转化为维数较低的数据。在这里，我们记 U_k 为 $d \times k$ 的矩阵，这个矩阵是由原数据协方差矩阵最高的 k 个特征值对应的特征向量组成的。

在这里我们有两种方法来求出低维的对应于 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ 的重构向量 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^k$ ：

A. 求最小重构平方误差；

B. 将 \mathbf{x} 投影在由 U_k 的列向量张成的空间中。

在这里，我们将探究这两种方法的关系。

(1) [5pts] 写出 U_k, \mathbf{x} 以及 \mathbf{w} 的最小二乘形式 (方法A)。

(2) [10pts] 证明方法A的解就是 $U_k^T \mathbf{x}$ ，也就是 \mathbf{x} 在 U_k 列向量空间中的投影 (方法B)。

Solution. 此处用于写解答(中英文均可)