

Первая медицинская помощь при электротравме на рабочем месте программиста

Необходимо быстро обесточить электроустановку. Если это невозможно, перекусить инструментом с сухими деревянными или изолированными рукоятками. Затем нужно оттащить пострадавшего за одежду.

Встать на сухую деревянную доску или резиновый коврик. По возможности нужно освобождать от тока человека только одной рукой.

Потом необходимо откинуть провод сторонним предметом.

Аккуратно уложить пострадавшего спиной на сухую, ровную и твердую поверхность. Расстегнуть стесняющую одежду, верхний воротник рубашки, галстук.

Вызвать медицинскую помощь по телефону 103 или 112.

Проверить дыхание по подъему грудной клетки, наличие пульса на сонной артерии и реакцию зрачков на свет. Если человек находится без сознания, нужно открыть ему рот, аккуратно повернуть голову вбок и пальцем, обернутым платком, удалить слизь или рвотные массы. Запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на лоб, а второй приподняв подбородок.

При отсутствии признаков жизни нужно сделать наружный массаж сердца.

Определить точку нажатия — на два пальца выше нижнего края грудины строго по центру грудной клетки.

Положить основание ладони одной руки на точку, вторую руку наложить сверху, соединить пальцы.

Выполнять ритмичные нажатия строго вертикально прямыми руками.

Выдерживать глубину прогиба грудной клетки в 4–5 см и частоту около 60–80 нажатий в минуту.

Проводить искусственное дыхание. Для этого плотно зажать ноздри пострадавшего пальцами руки, лежащей на его лбу. Сделать глубокий вдох, плотно прижать свои губы ко рту пострадавшего через марлю или платок, затем сделать выдох. Если челюсти сжаты, провести вдувание воздуха через нос, зажав его рот ладонью.

Если помощь оказывает один человек, нужно чередовать 15 нажатий и 2 вдоха искусственного дыхания. Если помощь оказывают два человека, один должен делать искусственное дыхание, а второй - массаж сердца 5 нажатий на 1 вдох. В момент вдувания воздуха второй человек должен полностью прекращать нажатия на грудную клетку.

Продолжать реанимацию необходимо до полного восстановления дыхания и пульса или до прибытия медицинского персонала.

При сохранённом дыхании, но бессознательном состоянии уложить человека на сухую подстилку. Создать полный покой и наблюдать за наличием пульса и дыхания. Дать понюхать нашатырный спирт и обрызгать лицо прохладной водой.

При сохранённом дыхании и сохранённом сознании нужно обеспечить пострадавшему покой и горизонтальное положение. Если целостность кожи сохранена, промыть обожженные участки кожи струей холодной воды в течение 10–15 минут.

Аккуратно наложить повязки на места электрических ожогов салфеткой или бинтом.

Укрыть человека одеялом или тёплой верхней одеждой. При сохранении сознания давать пострадавшему тёплое обильное питьё.

Необходимо непрерывно наблюдать за человеком до приезда скорой помощи.

Список использованных источников:

1. Оказание первой помощи при поражении электрическим током [Электронный ресурс] // Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу : официальный сайт. — URL: <https://89.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/3922423> (дата обращения: 31.05.2026).
2. Первая помощь при электротравме [Электронный ресурс] // Россети Центр : официальный сайт. — URL: <https://www.mrsk-1.ru/customers/electrical-safety/first-aid-for-electrical-accident/> (дата обращения: 31.05.2026).