



Wijngaard in Alentejo

23.3 De bodem in diverse wijnregio's

Portugal is grofweg 600 km lang en 200 km breed. De Taag (in het Portugees: Tejo) verdeelt het land in twee ongelijke delen. Het deel ten noorden van de rivier is bergachtig, op een smal kustgebied na. Ten zuiden van de Taag is het landschap veel vlakker. In het oosten van het wijngebied Dão ligt het gebergte Serra de Estrela, dat op zijn hoogste punt bijna 2.000 meter hoog is.

In de kustgebieden bevat de bodem vooral kalksteen, klei en zand. De bodem van de regio Lisboa stamt uit het secundair (245 tot 65 miljoen jaar oud). Het gebied Tejo, ten westen van de Taag, heeft bodems van geologisch veel recenter datum, namelijk uit het tertiair en quartair. De bodem hier is grotendeels door de Taag aangevoerd.

De bodem vormt een belangrijke kwaliteitsfactor voor Portugese wijnen. Bodems zijn bijna overal geologisch zeer oud. Zo'n 70 procent van de totale oppervlakte van Portugal behoort tot het primair (meer dan 245 miljoen jaar geleden). De belangrijkste structuurbepalende eenheid is een oud massief, dat het grootste deel van het Portugese territorium bedekt. Dit massief bestaat voornamelijk uit leisteen. Vooral in het noorden van Portugal, zoals in de gebieden Vinho Verde





Wijngaarden op het eiland Pico (Azoren)

en Dão, is veel graniet het massief binnengedrongen. Boven de keiharde, granieten ondergrond ligt slechts een dunne laag bewerkbare grond. De beste wijngaarden van Vinho Verde hebben een ondergrond van stollingsgesteente (graniet) of metamorf gesteente (schist, gneis). De primaire bodem in het Dourogebied bestaat vooral uit schist. Doordat schist makkelijk splijt en in sommige delen van het Dourogebied in verticale lagen dicht aan de oppervlakte komt, kunnen wijnstokwortels en regenwater makkelijk in de bodem doordringen. Op sommige plaatsen in de Douro komt ook verweerd graniet en basalt voor. In het oosten van het Dourogebied (Douro Superior) vind je ook alluviale bodems.

Een verhaal apart vormen het eiland Madeira en de eilandengroep Azoren. Het vulkanische eiland Madeira is erg steil, met als hoogste punt de Pico Ruivo met een top van 1.862 meter. De bodem is hier zeer vruchtbaar. De ondergrond bestaat voornamelijk uit rood of grijs basalt en is rijk aan fosfor, magnesium, zwavel en ijzer, maar er is een groot gebrek aan kalk. Wijngaarden en andere vormen van landbouw vinden voornamelijk plaats op terrassen die zijn aangelegd op de steile hellingen. Ook de Azoren zijn grotendeels vulkanisch. De eilanden van deze archipel liggen op de Midden-Atlantische Rug, waar soms vulkanische activiteit plaatsvindt. De bodem is rotsachtig, deels vulkanisch en deels bedekt met klei.



Alentejo (links) en het noorden van Madeira (rechts). Zoek de verschillen...

23.4 Klimaat

In Portugal zijn drie klimaatinvloeden te onderscheiden: Atlantische, mediterrane en continentale. Het klimaat in de vlakke kustdelen wordt grotendeels bepaald door de westenwinden van de Atlantische Oceaan. Hier valt relatief veel neerslag. Een voorbeeld daarvan is het gebied Minho (Vinho Verde), waar het koel en vochtig is. Dit ziet men terug in het groene landschap. De verschillen in neerslag zijn echter groot tussen de verschillende kustgebieden. In Porto valt bijna tweemaal zoveel regen als in Lissabon.

In het algemeen wordt het gematigde, maritieme klimaat naar het zuiden en oosten toe extremer. Met name in het oosten van Portugal kan droogte een probleem zijn. Is het klimaat in het gebied Lisboa mediterraan-Atlantisch, in het binnenland en in het zuiden van Portugal is het klimaat continenter van karakter. De Atlantische Oceaan laat zich in het gebied Tejo nauwelijks voelen; we spreken daar van een submediterraan klimaat. Het gebied Alentejo is uitgesproken warm en droog, waardoor irrigatie in veel gevallen nodig is. In het oosten van de Dourostreek is het klimaat mediterraan-continentaal. De zomers zijn hier zeer heet – het kan er boven 40 °C worden – maar 's winters is het er soms koud, met temperaturen tot net onder het vriespunt. Bergen ten noordwes-