
ten en westen van de Douro houden koele, vochtige lucht van de Atlantische Oceaan tegen. In de zuidelijke Algarve schijnt de zon uitbundig, maar de verkoelende invloed van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee zorgt hier voor heel andere groeicondities dan die in Alentejo.

De genoemde klimaatverschillen zijn een belangrijke verklaring voor het verschil in wijnstijlen in Portugal, maar ook de aanwezigheid van bergen, rivieren of bossen speelt een rol. Zo kent Bucelas, ten noorden van Lissabon, onder invloed van de Rio Trancão gematigde temperaturen tijdens de zomer. Het klimaat is er submediterraan. Rietvelden en bossen bieden aan de wijngaarden van Colares, ten westen van Lissabon, enige beschutting tegen de soms stevige winden vanuit zee, die veel schade kunnen veroorzaken. Ook Alenquer neemt binnen het gebied Lisboa een speciale positie in, doordat de Serra de Montejunto het gebied beschermt tegen de winden van de Atlantische Oceaan. De druiven in Alenquer kunnen daardoor evenwichtiger rijpen dan die dichterbij de kust.

Het eiland Madeira, zo'n 1.000 km ten zuidwesten van Lissabon, geniet het hele jaar door van een mild klimaat. De winters zijn zacht en de zomers zijn warm. De gemiddelde temperatuur schommelt in de zomer en winter tussen 16 en 21 °C en het verschil tussen dag en nacht is gemiddeld slechts 4 °C. Hoogte maakt hier het grote verschil. Door de hoogteverschillen op Madeira zijn er subtropische, mediterrane en zelfs ronduit koele zones in de bergen. Boven 900 meter vindt geen wijnbouw meer plaats.

23.5 Druivenrassen

Portugal kent meer dan 250 autochtone druivenrassen. Deze hebben zich door de eeuwen heen goed aangepast aan de natuurlijke omstandigheden. Ook klassieke, Franse druivenrassen zoals cabernet sauvignon en syrah komen voor. Met name in het zuiden van Portugal, in de wijnregio's Alentejo, Tejo en Lisboa, zijn internationale druivenrassen tot de wijngaarden doorgedrongen. Ook de Spaanse tempranillo neemt een belangrijke plaats in de Portugese wijngaarden in.

Tot ver in de twintigste eeuw waren vaak tientallen druivenrassen kriskras door elkaar aangeplant en wisten veel wijnboeren niet precies welke druivenrassen in hun wijngaarden stonden, maar tegenwoordig staan druivenstokken van verschillende rassen vaak van elkaar gescheiden in afzonderlijke percelen. Sommige producenten kiezen bewust opnieuw voor het planten van diverse druivenrassen in een wijngaard, de zogeheten *field blends*. Die druiven worden gelijktijdig geplukt, dus in diverse stadia van rijpheid. De resultaten zijn vaak erg goed.

Witte druivenrassen

De kwaliteit van witte wijnen in Portugal is de afgelopen decennia sterk verbeterd door verbeterde keldertechnieken. Oxidatie, vroeger bijna de norm, wordt nu doorgaans vermeden. De aandacht voor witte druivenrassen is beduidend toegenomen. De meest aangeplante witte druivenrassen van Portugal zijn regionaal (zie tabel 23.2). Hieronder worden de belangrijkste witte druivenrassen besproken.

■ *Alvarinho*

Dit druivenras, dat in Spanje bekendstaat als albariño, wordt beschouwd als een belangrijk kwaliteitsras voor witte wijnen in Portugal. Alvarinhostokken groeien uitbundig, met veel vegetatie, maar de druivenopbrengst is laag. Het is een zeer oud ras, dat al lang voorkomt in het noordelijke grensgebied met Spanje. Alvarinho voelt zich zeer thuis tussen de rivieren Lima en Minho, in het noorden van Vinho Verde, met name in de subregio Monção e Melgaço. Hoewel alvarinho vaak geblend wordt, is hij ook uitstekend geschikt voor monocépages. Langzamerhand wordt alvarinho ook in zuidelijker gebieden van Portugal aangeplant.

■ *Antão vaz*

Van oorsprong komt dit druivenras uit het zuiden van Alentejo. Antão vaz is befaamd door de goede kwaliteit van wijnen uit die streek. Het druivenras kan goed tegen droogte en is redelijk hittebestendig. Wijnen van antão vaz, al of niet vermengd met arinto, zijn krachtig met elegante aroma's, minerale tonen en een hint van kruiden.

■ *Arinto*

Dit laatrijpende druivenras, van oorsprong afkomstig uit de regio ten noorden van Lissabon, staat vrijwel overal in Portugal aangeplant. Ook in het warme, zuidelijk gelegen gebied Alentejo wordt deze druif tegenwoordig bijzonder gewaardeerd, omdat hij ook onder warme omstandigheden zijn frisse zuren behoudt. Wijnen ervan kunnen uitstekend ouderen en winnen dan aan complexiteit. In DOP Bucelas is arinto de belangrijkste variëteit. In de handen van een goede wijnmaker kan dit ras een mooie balans geven tussen zoet en zuur. In de koele Vinho Verdestreek staat deze druif bekend als pedernã en hij is daar een belangrijk ras. Vanwege zijn zuurgraad is arinto ook geschikt voor de productie van mousserende wijnen.

■ *Bical*

Dit is een karakteristiek druivenras in Beiras, met name in de DOP's Bairrada en Dão. Bij veel wijnbouwers was deze druif niet erg populair vanwege zijn gevoeligheid voor meeldauw, maar een nieuwe wijze van aanplant en een betere verzorging hebben ertoe geleid dat dit vroegrijpende ras weer volop voorkomt in Bairrada. Wijnen op basis van bical zijn vaak zacht en aromatisch. Rijping *sur lie* en houtrijping doen wijnen van bical vaak goed. Wijnen van bical kunnen goed ouderen. Vanwege zijn zuurgraad is bical ook geschikt voor verwerking tot mousserende wijnen. Vooral in Bairrada wordt bical gebruikt voor de productie van mousserende wijnen, vaak in een blend met arinto.

■ *Encruzado*

Voor witte wijnen uit de Dão is encruzado een van de belangrijkste druivenrassen. Voor veel wijnproducenten daar staat hij voor hoge kwaliteit. Elders in Portugal komen we encruzado nauwelijks tegen. Ook onder warme omstandigheden behoudt hij zijn zuren en kan hij uitstekend rijpen. In het verleden werd encruzado met andere rassen geassembleerd, zoals malvasia fina en bical. De laatste jaren zijn er steeds meer wijnmakers die witte wijn vinifiëren van uitsluitend encruzado.



De beste wijnen zijn elegant en vol, met een goede balans. Ook eikenhout verdragen wijnen van encruzado goed.

■ *Fernão pires*

Fernão pires is het meest aangeplante witte druivenras van Portugal (zie tabel 21.2). Hij is te vinden in vrijwel alle delen van Portugal, met name in Tejo, Lisboa en Bairrada. In het laatste gebied noemt men dit ras ook wel maria gomes. Fernão pires is vorstgevoelig en rijpt vroeg. Hij heeft een voorkeur voor vruchtbare bodems en geeft hoge opbrengsten. Tijdens de oogstperiode vraagt hij veel aandacht, omdat bij een te late pluk de zuren snel afnemen. Wijnen van fernão pires zijn licht en fruitig. In geur doen ze een beetje aan een Muscat denken. Soms wordt fernão pires met opzet laat geoogst om er een zoete wijn van te produceren. De meeste wijnmakers prefereren het om fernão pires te combineren met rassen die een hoger zuurgehalte hebben, zoals arinto, bical of cerceal. Fernão pires wordt ook veel gebruikt voor mousserende wijnen, vooral in Bairrada.

■ *Gouveio*

Dit relatief vroegrijpende druivenras is gelijk aan de Spaanse godello. In de Dourovallei werd hij lange tijd verdelho genoemd, maar gouveio heeft niets te maken met de verdelho van Madeira. Hij is vatbaar voor oïdium en geeft vrij hoge opbrengsten. In de Douro is gouveio een van de aanbevolen witte rassen voor DOP-wijnen en wordt hij vaak gebruikt in blends voor droge witte wijnen. Ook in Alentejo is hij de laatste jaren aangeplant. Wijnen van gouveio hebben in de beste gevallen een goede zuurgraad en kunnen goed rijpen op fles.

■ *Loureiro*

Loureiro is een ras dat hoofdzakelijk in Vinho Verde is aangeplant, waar hij een belangrijke rol speelt. Hij komt oorspronkelijk uit de vallei van de rivier Lima, in het noorden van Vinho Verde (zie blz. 152). Loureiro heeft veel groeikracht. Bij een lage opbrengst kan dit druivenras wijnen geven met veel elegantie, florale aroma's en citrustonen. Traditioneel werd hij vaak geassembleerd met trajadura, alvarinho en/of arinto om wijnen meer diepgang en structuur te geven, maar wijnen van 100 procent loureiro winnen aan populariteit.

■ *Malvasia fina*

De malvasiadruif kent vele variëteiten, zoals malvasia corada, malvasia fina, malvasia candida en malvasia rei. De malvasia fina komt in verschillende gebieden in Portugal voor, vooral in de Douro. De mooiste kwaliteit vinden we in gebieden met een gematigd klimaat. Op Madeira staat dit ras bekend als boal of bual (zie blz. 144). Malvasia fina is een vroegrijpend ras en zeer gevoelig voor meeldauw. In de Dourostreek plukt men deze druif altijd heel vroeg, omdat het anders rozijnen worden in plaats van druiven. Malvasia fina heeft veel synoniemen, waaronder assario (in Dão), galego (in de Douro) en terrantez do Pico (op de Azoren).

■ *Rabigato*

Dit druivenras wordt met name in Douro Superior gebruikt, waar het vanwege zijn zuurgraad



Rabigatodruiven

populair is in witte blends. Rabigato bot vroeg uit en heeft een dunne schil. Hij wordt zelden gebruikt voor monocépages. Voor port en droge witte Dourowijn is het een aanbevolen druivenras.

■ *Síria*

Síria is een oud druivenras in Portugal en Spanje. Hij rijpt laat en is gevoelig voor meeldauw en botrytis. Vooral in Beira Interior en Alentejo is hij belangrijk. Síria heeft veel synoniemen, waarvan roupeiro (in Alentejo) en códega (in de Douro) de bekendste zijn. Toen Alentejo in 1988 als gecontroleerd herkomstgebied werd erkend, was síria het aanbevolen ras voor witte wijnen. Zodra men erachter kwam dat dit ras in warmere gebieden veel van zijn kwaliteiten verloor, zoals frisheid en fijne zuren, werd zijn plaats ingenomen door antão vaz.

■ *Trajadura*

Trajadura komt oorspronkelijk uit het noorden van Vinho Verde. De opbrengsten kunnen zeer hoog zijn. Hij levert wijnen op met een minder hoge zuurgraad en meer alcohol dan andere druivenrassen voor Vinho Verde. Vaak wordt hij gebruikt als mengdruif met alvarinho, loureiro en/of arinto. In Spanje (Galicië) staat hij bekend als treixadura.

Druivenras	Oppervlakte aanplant (ha)	Percentage aanplant
Fernão Pires / Maria Gomes	12.052,00	6%
Loureiro	5.851,00	3%
Arinto / Pedernã	5.778,00	3%
Síria / Roupeiro / Códaga	5.431,00	3%
Alvarinho	3.187,00	2%
Malvasia Fina / Boal	2.605,00	1%
Rabigato	1.592,00	1%
Malvasia Rei	1.584,00	1%
Trajadura / Treixadura	1.564,00	1%
Malvasia	1.488,00	1%

Tabel 23.2 Overzicht van de meest aangeplante witte druivenrassen in Portugal
(bron: Instituto da Vinha e do Vinho, 2017)

■ Viosinho

Dit vroegrijpende druivenras komt hoofdzakelijk voor in de Dourovallei. Ook in Trás-os-Montes en Alentejo is hij te vinden. Hij presteert het best in een zonnig, warm klimaat. Zijn lage opbrengsten maakten hem vroeger niet erg populair bij wijnboeren, maar inmiddels hebben wijnmakers zijn kwaliteiten ontdekt. Viosinho wordt voor zowel witte port als witte tafelwijnen gebruikt, in combinatie met andere druivenrassen.

Blauwe druivenrassen

Blauwe druivenrassen zijn verantwoordelijk voor zo'n twee derde van de productie in Portugal. De belangrijkste worden hieronder besproken.

■ Alfrocheiro

Vooraf in de streek Dão, waar zijn oorsprong ligt, heeft alfrocheiro een goede reputatie. Hij komt ook voor in Alentejo, Tejo en Península de Setúbal (DOP Palmela). Het is een ras dat zeer gevoelig is voor rotting. Ook in warme klimaten behoudt hij goed zijn zuren. Wijnen van alfrocheiro hebben een diepe kleur en stevige tannine. Grote opbrengsten moeten worden voorkomen, anders gaan veel positieve kwaliteiten verloren.

■ Alicante bouschet

Dit ras is eind negentiende eeuw in Zuid-Frankrijk gekweekt als kruising van petit bouschet met grenache. In Frankrijk, met name in de Languedoc, wordt alicante bouschet beschouwd als een druivenras dat alleen vanwege de diepe kleur die hij aan wijnen geeft zijn diensten kan bewijzen. Toen alicante bouschet begin twintigste eeuw in Portugal werd aangeplant in warme, droge gebieden, toonde hij kwaliteiten die in Frankrijk onbekend waren gebleven. Alicante bouschet vinden

we vooral in de wijnregio's Lisboa en Alentejo. Hij wordt vaak gebruikt in combinatie met andere blauwe druivenrassen.

■ *Aragonez*

Dit Iberische ras, in Spanje bekend als tempranillo, werd rond 1800 aangetroffen in Alentejo onder de naam tinta aragonez. Ook in andere Portugese wijnbouwregio's, zoals Lisboa en Tejo, is hij aangeplant. In de gebieden Douro en Dão staat hij bekend onder de naam tinta roriz. Aragonez is een vroegrijpend ras en kan zich gemakkelijk aanpassen aan verschillende bodemtypen en klimaten. Wel is het belangrijk dat de opbrengsten niet te hoog zijn. Op zijn best geeft aragonez elegante rode wijnen met stevige tannine en een groot bewaarpotentieel. In Portugal wordt aragonez vaak geblend met andere druivenrassen, waaronder touriga nacional, touriga franca en trincadeira.

■ *Baga*

Bagadruiven zijn klein en hebben een dikke schil. Jonge wijnen ervan zijn vaak tannineus en streng. Baga heeft een warm klimaat en een gunstige zonexpositie nodig om goed rijp te worden. Op klei- en kalkhoudende bodems gedijt hij het best. In zijn bakermat Bairrada is baga het belangrijkste druivenras. Ook in het gebied Dão is hij te vinden. Baga kan excellente wijnen geven met alcohol, tannine en voldoende zuren om een goede ontwikkeling van vele jaren aan te kunnen. Een voorzichtige extractie is geboden, omdat de wijn anders erg 'hard' kan overkomen. Baga wordt in Bairrada ook als basisdruivenras gebruikt voor mousserende wijnen.

■ *Castelão*

Dit druivenras, een natuurlijke kruising tussen cayetana blanca en alfrocheiro, is verspreid over Portugal aangeplant, maar geeft de beste resultaten in het zuiden. Het is een populair druivenras in Tejo, Lisboa, Alentejo en op het schiereiland Setúbal (DOP Palmela). Veel Portugezen kennen deze druif als periquita (parkiet), zoals hij vaak genoemd wordt in Bairrada, Alentejo en Tejo. Castelão is geen gemakkelijk ras; hij loopt vroeg uit en is vatbaar voor *coulure* en *millerandage* (zie hoofdstuk 4 van boek 1A). Hij gedijt het best in droge grond en is goed bestand tegen droogte en hoge temperaturen. Bij een lage opbrengst kan castelão mooie wijnen opleveren met een uitstekend bewaarpotentieel.

■ *Tinta barroca*

Dit vroegrijpende druivenras komt op grote schaal voor in de Dourovallei, waar het een van de aanbevolen druivenrassen is voor DOP-wijnen. Tinta barroca is gemakkelijk te telen en geeft hoge opbrengsten. Ook is dit ras goed bestand tegen ziekten. Hij komt in wijnen zelden in zijn eentje voor maar is een populaire mengdruif vanwege zijn kleur en suikers. Ook in Zuid-Afrika wordt tinta barroca gebruikt, voor zowel portachtige wijnen als tafelwijnen.

■ *Tinta cão*

In de achttiende eeuw kwam tinta cão al voor in de Dourovallei. Daar is hij nu een van de aanbevolen rassen voor port en rode tafelwijn. Pas aan het eind van de twintigste eeuw is hij





Tinta barroca



Roupeirostokken in Alentejo

herontdekt. Behalve in het Dourogebied staat deze druif op kleine schaal aangeplant in Dão, Lisboa en Península de Setúbal (DOP Palmela). Tinta cão heeft een dikke schil en rijpt later dan veel andere rassen. Hij heeft dus veel warmte nodig. Een nadeel voor veel wijnbouwers, vooral in economisch zware tijden, is zijn lage opbrengst. In een assemblage (in de praktijk vaak met touriga nacional, aragonez, tinta barroca en touriga franca) geeft tinta cão aan wijnen alcohol, finesse en florale aroma's.

■ *Touriga franca*

In de Dourovallei is dit een van de meest aangeplante druivenrassen voor de productie van zowel port als niet-versterkte rode wijn. Het is een van de aanbevolen druivenrassen voor DOP Porto/ Douro. Het ras heeft veel overeenkomsten met touriga nacional, maar wordt om andere redenen aangeplant. Touriga franca is gemakkelijk te verzorgen, geeft regelmatige opbrengsten, bereikt voldoende rijpheid en is resistent tegen veel ziekten. Wijnen waarin touriga franca een groot aandeel heeft, hebben een dieprode kleur, zijn stevig en hebben duidelijk aanwezige fruittonen met daarnaast een zekere bloemigheid. Vooral in assemblages heeft touriga franca veel invloed op de uiteindelijke kwaliteit. Ook producenten in Bairrada, Lisboa, Tejo en Península de Setúbal hebben inmiddels de hoge kwaliteit van dit ras ontdekt.

■ *Touriga nacional*

Als er één Portugees druivenras het predikaat 'nobil' verdient, dan is het touriga nacional. Het is een druivenras met een dikke schil, dat wijnen van hoge kwaliteit kan geven met een diepe kleur en een krachtige smaak. Door zijn geringe opbrengst is de aanplant tot de jaren tachtig van de vorige eeuw gering gebleven. Met de toenemende internationale vraag naar betere kwaliteitswijnen is touriga nacional vanaf 1980 meer en meer aangeplant. Van oorsprong komt deze druif uit de Dão of Douro. In deze gebieden is touriga nacional tegenwoordig het belangrijkste druivenras. Ook in andere streken van Portugal is hij inmiddels te vinden, vaak als belangrijkste druivenras in blends.

■ *Trincadeira*

Trincadeira is erg gevoelig voor rot, maar goed bestand tegen droogte en hitte. Vandaar dat dit ras vooral is aangeplant in de warmste gebieden van Portugal. In Alentejo is het een veelgebruikt druivenras, maar ook in Tejo en de Dourovallei komen we veel trincadeira tegen. In de Douro noemt men hem ook wel tinta amarela. Wijnen van uitsluitend trincadeira kunnen rijk zijn en van goede kwaliteit, met fruitige aroma's, vaak een peperige toon en een goede zuurgraad. In Alentejo wordt hij vaak succesvol geassembleerd met aragonez.

■ *Vinhão*

Vinhão is het meest aangeplante druivenras in zijn bakermat Minho, waar hij aan de basis staat van rode en rosé Vinho Verde. Rode Vinho Verde heeft een donkere kleur en is vaak wat zuur. Vinhão is een *teinturier*: hij heeft rood vruchtvlees. Omdat hij snel rood sap geeft, komt hij soms goed van pas bij de productie van port, waarbij een snelle kleurextractie essentieel is. In de Douro staat hij bekend als sousão of souzão.

Druivenras	Oppervlakte aanplant (ha)	Percentage aanplant
Aragonez / Tinta Roriz / Tempranillo	20.884,00	11%
Touriga Franca	13.445,00	7%
Touriga Nacional	13.032,00	7%
Castelão / João de Santarém / Periquita	9.130,00	5%
Trincadeira / Tinta Amarela / Trincadeira Preta	8.413,00	4%
Baga	8.258,00	4%
Syrah / Shiraz	5.674,00	3%
Alicante Bouschet	4.888,00	3%
Vinhão / Sousão	3.894,00	2%
Tinta Barroca	3.790,00	2%

Tabel 23.3 Overzicht van de meest aangeplante blauwe druivenrassen in Portugal
(bron: Instituto da Vinha e do Vinho, 2017)



23.6 Wijnbouw

Met uitzondering van hoge bergketens in het midden en noordoosten van het land zijn overal wijngebieden te vinden. Portugal telt ruim 190.000 ha wijngaarden. Daarvan wordt jaarlijks gemiddeld 6,5 miljoen hl wijn geproduceerd. De jaarlijkse wijnproductie fluctueert als gevolg van het grillige Atlantische klimaat sterk. Ongeveer twee derde van de productie betreft rode wijn en rosé (inclusief port). Portugal exporteerde in 2021 voor 925 miljoen euro aan wijn. De belangrijkste exportlanden zijn Frankrijk, Angola, Spanje, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland en de VS. Voor port is Nederland de 3e afzetmarkt. Verreweg het grootste deel van de portproductie is voor export bestemd, maar van de productie van onversterkte wijnen wordt ruim minder dan de helft geëxporteerd.

Wijnbouw is niet overal in Portugal even moeilijk of makkelijk. De omstandigheden variëren sterk. Het landbezit van wijnboeren is bijvoorbeeld in het noorden zeer versnipperd als gevolg van het erfrecht. Vandaar dat veel boeren daar hun druiven aan coöperaties leveren, zij het minder dan vroeger. In de Dourostreek moeten wijnboeren steile hellingen bewerken, maar in de uitgestrekte vlakten van Alentejo gaat het bewerken van wijngaarden eenvoudiger.

De rol van klimatologische en economische invloeden ziet men duidelijk in de streek Vinho Verde. Wijnbouw werd hier in het verleden vaak uit economische noodzaak gecombineerd met andere vormen van landbouw. De regenval in Vinho Verde varieert van 1.200 mm aan de kust tot 2.900 mm in de bergen ten zuiden van de rivier de Minho. Als gevolg van de klimatologische omstandigheden en de vaak niet rendabele, kleine percelen pasten wijnboeren in het verleden vaak geleidingssystemen toe waarmee wijnstokken de hoogte in werden geleid, om zo rotting (vooral grijze rot) tegen te gaan en om op de grond ruimte te maken voor het verbouwen van andere gewassen zoals maïs. Tegenwoordig passen de meeste wijnboeren moderne systemen toe, zoals het *cordon*-systeem, waarbij de druiven zo'n anderhalve meter boven de grond langs draden groeien. Zo krijgen de druiven meer zonlicht en is mechanisch oogsten mogelijk.

Een van de traditionele geleidingssystemen in Minho is *uveiras* of *enforcado*. 'Uveira' betekent 'druivenboom' en 'enforcado' betekent zoiets als 'gehangen' of 'opgeknoopt'. Men laat hierbij een of meerdere wijnstokken vrijuit groeien in een boom (een kastanjeboom, populier of plataan) en zich verstrengelen met de takken van de boom. Dit bespaart ruimte, maar leidt tot wijnen van geringe kwaliteit. Een andere geleidingsmethode die men in Minho vroeger vaak toepaste, was de *pergola*-methode, ook wel *ramadas* of *latadas* genoemd. 'Ramada' betekent 'loof' en 'latada' is 'latwerk' of 'traliwerk'. Dit systeem bestaat uit horizontale structuren. Deze latwerken zitten regelmatig boven wegen, waardoor improductieve ruimten benut kunnen worden. Het vermindert de kans op rot, doordat de druivenstokken in de hoogte meer wind vangen en de druiven zo sneller drogen.