
24.4 Klimaat

De kwaliteit en de stijl van Duitse wijnen worden in hoge mate bepaald door klimaat (op macro-, meso- en microniveau), bodem en ligging. De Duitse wijnbouw is een schoolvoorbeeld van *cool climate viticulture*. De wijngebieden van Duitsland liggen aan de noordelijke wijnbouwgrens, rond 50° N.B. De overgrote meerderheid van de wijngebieden valt in de Europese klimaatzone A; alleen Baden wordt tot zone B gerekend. Helemaal in overeenstemming met plaatselijke condities is deze indeling niet, want sommige delen van de Pfalz zijn zo warm dat ze eerder aan de B-zone doen denken. De opwarming van de aarde heeft tot dusver vooral positieve gevolgen voor de Duitse wijnbouw. Tegenwoordig worden de druiven ieder oogstjaar goed rijp en komen slechte oogstjaren eigenlijk niet meer voor. Wel toegenomen zijn problemen door gebrek aan neerslag, hetgeen steeds vaker droogtestress in wijngaarden veroorzaakt, vooral in wijngaarden met droge, stenige bodems.

De wijnbouw in Duitsland is geconcentreerd op de minst koele plaatsen, in het zuidwesten van het land en vaak in beschutte rivierdalen. Hoe verder oostwaarts de wijngaarden liggen, hoe meer ze zijn blootgesteld aan de invloeden van een continentaal klimaat. De zomers kunnen daar warm zijn, maar het risico van lentevorst is groot. Dit is zeker het geval in de wijngebieden Franken, Saale-Unstrut en Sachsen. Het continentale klimaat betekent een verhoudingsgewijs kort groeiseizoen, wat consequenties heeft voor de keuze van druivenrassen.

De ligging van de wijngaard is zo mogelijk van nog doorslaggevender belang voor de rijpheid van het fruit en de kwaliteit van de wijnen. Wijngaarden in een koel klimaat hebben niet alleen beschutting tegen kou en nachtvorst nodig, maar moeten ook optimaal van zonlicht en zonnewarmte profiteren. Smalle, diepe rivierdalen met hellingen bieden in diverse Duitse wijnstreken gunstige klimatologische omstandigheden. Rivierdalen als die van de Moezel, Ahr, Nahe en Main bieden zo'n omgeving. Aanwezigheid van een grote wateroppervlakte zorgt voor een extra gunstige, matigende invloed. Dit is bijvoorbeeld waar te nemen in de Rheingau, aan de Mittelrhein en bij de Roter Hang in Rheinhessen, waar de nabijheid van de brede Rijn gunstige condities levert. Typerend voor de meeste topwijngaarden is een ligging op zuidhellingen. De ligging op een helling vermindert sowieso het gevaar van nachtvorst, terwijl de zuidelijke expositie bovendien voor een optimale zoninstraling zorgt. De mist van de rivieren draagt in het najaar bij tot de vorming van botrytis, die tot *Edelfäule* (edele rotting) leidt.

24.5 Druivenrassen

In Duitsland staan tal van druivenrassen aangeplant, van acolon tot zweigelt. Het zijn er meer dan honderd. Daarvan doen er overigens minder dan tien echt toe. Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw wordt geëxperimenteerd met internationale soorten zoals chardonnay en cabernet sauvignon, maar Duitsland onderscheidt zich nog steeds door het geheel eigen karakter van zijn



Riesling



Müller-thurgau

aanplant. Voor sommige internationale (Franse) variëteiten worden in Duitsland ook Duitse namen gebruikt. Zo heten pinot blanc, pinot gris en pinot noir respectievelijk ook wel weißburgunder, grauburgunder en spätburgunder. Van de aanplant bestaat tegenwoordig circa 67 procent uit witte rassen en 33 procent uit blauwe. Ter vergelijking: in 2000 bedroeg het percentage witte druivenrassen nog 74 procent en in 1980 zelfs 87 procent. Blauwe druivenrassen hebben de afgelopen decennia gestaag aan terrein gewonnen, zij het dat hun aandeel momenteel niet meer toeneemt.

Witte druivenrassen

De riesling is al eeuwen Duitslands nationale boegbeeld. Het is met ruim 23 procent van de totale aanplant het meest aangeplante druivenras van Duitsland (zie tabel 20.2). Met 23.440 ha is de Duitse rieslingaanplant veruit de grootste van de wereld. Riesling geldt in Duitsland als de onbetwiste nummer één voor kwaliteit. De eerste vermelding ervan dateert uit 1435, maar pas in de loop van de zeventiende eeuw werd hij op grote schaal aangeplant. Riesling is een veeleisend druivenras, dat laat rijpt en daarom de best denkbare locaties met goede beschutting en veel zon eist. Daar staat tegenover dat rieslingstokken dankzij hun taaie hout koudebestendig zijn en een genereuze opbrengst kunnen geven. Niettemin is circa 50 hl/ha de limiet voor wie er grootse wijnen van wil maken. Rieslings kunnen strakdroog zijn, maar ook weelderig zoet. In alle dertien Duitse *Anbaugebiete* staat hij aangeplant. Mosel, Pfalz, Rheingau, Nahe, Mittelrhein, Rheinhessen, Württemberg en Franken geven de mooiste resultaten.

Riesling weerspiegelt als geen ander wit druivenras verschillende terroirnuances in de wijn. Hij is zo verbonden aan topwijnngaarden dat vermelding ervan op het etiket eigenlijk niet zou hoeven, net als bij pinot noir en chardonnay in de Bourgogne. Hoewel riesling, evenals pinot noir, vrijwel nooit geassembleerd wordt, kun je moeilijk van een cépagewijn in de gangbare betekenis spreken; daarvoor is het belang van het terroir te groot. Riesling gedijt op diverse bodemtypes, van löss tot graniet en van kalkhoudende tot vulkanische bodems. De ‘ultieme’ rieslingbodem is die met leisteen. Deze geeft de wijn een uniek, mineraal karakter.

Smaakbedrog

Een intrigerend verschijnsel bij oude(re) Rieslings met restzoet is dat ze droger lijken te worden. Toch behouden de wijnen bij het rijpen hun restsuikers, want suikers breken niet af. Er is in feite sprake van ‘smaakbedrog’ door de proever zelf. Wat als ‘smaak’ wordt betiteld, is vaak een combinatie van feitelijke basissmaken én waargenomen aroma’s in de mondholt (*arômes de bouche*). In jonge wijn overheersen fruitige aroma’s, die de ervaring van een zoete smaak versterken. Maar de fruitigheid neemt met de jaren substantieel af, waardoor het bouquet ‘belegen’ nuances krijgt. Zulke tertiaire aroma’s zijn allesbehalve versterkers van het zoet. Het zoet in de wijn komt zodoende minder naar voren, wat de indruk kan geven van een drogere smaak.

Het tweede witte druivenras van Duitsland is müller-thurgau, ook wel rivaner genoemd. Het is de oudste en meest succesvolle kruising van Duitsland. Hij werd in 1882 in Geisenheim ontwikkeld door dr. Hermann Müller, geboren in het Zwitserse kanton Thurgau. Müller-thurgau is een kruising van riesling en de Franse madeleine royale, maar is (mede door toedoen van Hermann Müller zelf) bekend geworden als een kruising van riesling en silvaner; vandaar de alternatieve naam rivaner (riesling x silvaner). Müller-thurgau was ooit de meest aangeplante druif van Duitsland als zogenaamd alternatief voor riesling. Het is een makkelijk te telen, productief druivenras, dat veel eerder rijpt dan riesling en fruitige wijnen oplevert. Inmiddels is hij op zijn retour en ingehaald door riesling, maar goedkope Duitse wijnen zijn nog vaak (grotendeels) van müller-thurgau gemaakt. In Saale-Unstrut en Sachsen was müller-thurgau anno 2019 nog steeds het meest aangeplante druivenras (zie tabel 20.3). Op kalksteenbodems geeft hij vaak de mooiste resultaten. Müller-thurgau presteert over het algemeen het best in Franken.

Het qua aanplant derde witte druivenras van Duitsland was jarenlang silvaner. Sinds 2013 is hij van de derde plaats verdrongen door grauburgunder (zie verderop). Evenals de riesling is silvaner een oud ras. Hij werd in het midden van de zeventiende eeuw voor het eerst geteeld. Ooit stond hij op grote schaal aangeplant, maar tegenwoordig is de verspreiding ervan beperkt. Silvaner heeft een voorkeur voor bodems met klei en kalksteen. Hij is minder expressief dan riesling en wat neutraal van karakter. Dit maakt wijnen ervan breed inzetbaar. Silvaner is op zijn best in Franken, waar hij minerale wijnen oplevert. Franken is het enige gebied waar er prestigieuze *Große Gewächse* (zie blz. 207) van gemaakt worden. Ook in Rheinhessen staat veel silvaner aangeplant, meer nog dan in Franken.

In opkomst zijn de witte rassen grauer burgunder en weißer burgunder, ook wel grauburgunder en weißburgunder genoemd. Tussen 1995 en 2019 is de aanplant van grauburgunder bijna en van weissburgunder meer dan verdrievoudigd. Wijnen ervan mogen eventueel ook onder de namen Pinot Gris en Pinot Blanc verkocht worden. Grauer burgunder en weißer burgunder zijn vooral – maar zeker niet alleen – te vinden in warmere, zuidelijk gelegen gebieden zoals Baden en Pfalz. Deze druivenrassen hebben een relatief lage zuurgraad in vergelijking met bijvoorbeeld riesling en worden bijna per definitie droog gevinifieerd. Wijnen ervan zijn geschikt om vergisting en/of opvoeding op (kleine) houten vaten te ondergaan. Het succes van grauer burgunder en weißer burgunder wordt vooral door deze twee factoren verklaard. Met name uit Baden komen *Große Gewächse* van grauer burgunder en weißer burgunder. Chardonnay, die ook tot de Burgundersorten wordt gerekend, is bezig aan een opmars.

Andere witte rassen moeten het met een marginaal aandeel in de aanplant stellen. Te denken valt aan oude, qua smaak nogal neutrale rassen als elbling in het gebied Mosel en gutedel (chasselas) in Baden. Aromatische variëteiten zoals (gewürz)traminer en gelber muskateller vind je vooral in Pfalz en Baden.

Druivenras	Percentage van totale aanplant
1. riesling (w)	23,6%
2. spätburgunder (b)	11,1%
3. müller-thurgau (w)	10,6%
4. grauburgunder (w)	7,8%
5. dornfelder (b)	6,6%
6. weißburgunder (w)	6,0%
7. silvaner (w)	4,4%
8. chardonnay (w)	2,5%
9. portugieser (b)	2,2%
10. kerner (w)	2,0%

Tabel 24.2 Meest aangeplante Duitse druivenrassen (bron: Deutsches Weininstitut). (w) = wit, (b) = blauw

Meest toegenomen in aanplant sinds 2005:

- grauburgunder (+ 3.883 ha),
- weissburgunder (+ 2.846 ha)
- chardonnay (+ 1.713 ha)

Meest afgenomen in aanplant sinds 2005:

- müller-thurgau (- 3.376 ha),
- dornfelder (-1.447 ha),
- silvaner (-964 ha)





Dornfelder



Lemberger (blaufränkisch)

Blauwe druivenrassen

Eeuwenlang stonden in Duitsland hoofdzakelijk blauwe druivenrassen aangeplant, ook in gebieden die nu bekendstaan als 'witte' gebieden, zoals de Mosel. Na de omschakeling naar witte druivenrassen waren rode Duitse wijnen een poosje een marginaal verschijnsel. Dat is inmiddels drastisch veranderd. Tegenwoordig vertegenwoordigen blauwe druiven bijna een derde van alle aanplant.

Kwalitatief het meest interessant zijn de wijnen op basis van spätburgunder (pinot noir), vooral wanneer men werkt met klonen uit de Bourgogne (zogenoemde Dijonklonen) en men wijnen produceert met kleur en structuur. De beste Spätburgunders kunnen zich meten met goede Pinots Noirs uit de Bourgogne. Vooral in de wijngebieden Baden, Ahr en Pfalz is spätburgunder te vinden. Veel van de beste Spätburgunders uit de Pfalz en Baden komen van kalkhoudende bodems, die uit de Ahr van leisteen, terwijl in Franken rood zandsteen een goede ondergrond voor spätburgunder vormt.

Het tweede blauwe druivenras van Duitsland (met circa 7,3 procent van de totale aanplant) is de in 1956 ontwikkelde kruising dornfelder, die vooral in Rheinhessen en de Pfalz te vinden is. Hij rijpt vroeg en is geschikt voor koelere gebieden. Tussen 2000 en 2005 was de aanplant bijna verdubbeld. Wijnen ervan zijn alleen de moeite waard als de potentieel zeer hoge rendementen in toom gehouden worden.

De blauwe rassen portugieser en trollinger – deze laatste staat in Italië ook wel bekend als schiava grossa of vernatsch – leveren in de regel geen opwindende wijnen op. Dat heeft niet alleen met de natuurlijke beperkingen van deze rassen te maken, maar vaak ook met (te) hoge rendementen.

Wel de moeite waard zijn wijnen van lemlinger (in Oostenrijk bekend als blaufränkisch), een druivenras met een originele, eigen smaak. Lemmlinger is, samen met trollinger, een specialiteit van Württemberg.

Inmiddels wordt in Duitsland ook mondjesmaat gewerkt met druivenrassen als syrah, merlot en cabernet sauvignon, met name in warmere gebieden zoals de Pfalz.

Een zeldzame maar gewaardeerde mutatie van pinot noir is frühburgunder. Deze heeft een wat lagere zuurgraad dan pinot noir en rijpt zo'n twee weken vroeger. Hij staat ook wel bekend als pinot noir précoce of pinot madeleine. In Duitsland is hij vooral te vinden in de Ahr, Rheinhessen en Franken. Een andere bijzonderheid vormt schwarzriesling, een nogal misleidende naam voor pinot meunier. Hij wordt in Duitsland ook wel müllerrebe genoemd. Schwarzriesling is vooral in Württemberg en Baden te vinden, maar de aanplant ervan is beperkt.

Kruisingen

Kruisingen (in het Duits: *Neuzüchtungen*) worden in Duitsland al sinds de negentiende eeuw ontwikkeld. Het voornaamste doel daarbij is een zo hoog mogelijk economisch rendement. Gezochte eigenschappen zijn daarom:

- resistentie tegen schimmelziekten;
- vorstbestendigheid;
- hoge opbrengst;
- hoog mostgewicht;
- aromatisch potentieel.

Ondanks een enorme populariteit in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft maar een enkele kruising bewezen van blijvende waarde te zijn. Wie kent nog de morio muskat, siegerrebe of albalonga? De lijst van druivenrassen die het nooit echt gemaakt hebben, is lang. De 'moeder' van alle kruisingen is ontegenzeggelijk müller-thurgau. Andere min of meer succesvolle witte kruisingen zijn bacchus, ehrenfelser, kerner, ortega, rieslaner en scheurebe, zij het dat hun aandeel in de aanplant zeer beperkt is. De laatste twee, beide rieslingkruisingen, geven uitgesproken aromatische wijnen. Kerner (een kruising van trollinger en riesling uit 1929) komt qua smaakprofiel het dichtst in de buurt van riesling. De belangrijkste blauwe kruising is dornfelder. Als blauwe kruisingen telt Duitsland verder nog domina, regent en een paar variaties op cabernet sauvignon (zoals cabernet mitos en cabernet dorsa). De regent, die goed bestand is tegen rot, is ook in Nederlandse wijngaarden behoorlijk veel aangeplant.

24.6 Wijnbouw

Het wijngaardareaal van Duitsland schommelt al jaren rond de 100.000 ha. Het is dus kleiner dan dat van het wijngebied Bordeaux (zie hoofdstuk 8) maar ruim twee keer zo groot als dat van Oostenrijk (zie hoofdstuk 24). De wijngaarden zijn hoofdzakelijk te vinden in de dalen van de Rijn en

