
Wel de moeite waard zijn wijnen van lemlinger (in Oostenrijk bekend als blaufränkisch), een druivenras met een originele, eigen smaak. Lemmlinger is, samen met trollinger, een specialiteit van Württemberg.

Inmiddels wordt in Duitsland ook mondjesmaat gewerkt met druivenrassen als syrah, merlot en cabernet sauvignon, met name in warmere gebieden zoals de Pfalz.

Een zeldzame maar gewaardeerde mutatie van pinot noir is frühburgunder. Deze heeft een wat lagere zuurgraad dan pinot noir en rijpt zo'n twee weken vroeger. Hij staat ook wel bekend als pinot noir précoce of pinot madeleine. In Duitsland is hij vooral te vinden in de Ahr, Rheinhessen en Franken. Een andere bijzonderheid vormt schwarzriesling, een nogal misleidende naam voor pinot meunier. Hij wordt in Duitsland ook wel müllerrebe genoemd. Schwarzriesling is vooral in Württemberg en Baden te vinden, maar de aanplant ervan is beperkt.

Kruisingen

Kruisingen (in het Duits: *Neuzüchtungen*) worden in Duitsland al sinds de negentiende eeuw ontwikkeld. Het voornaamste doel daarbij is een zo hoog mogelijk economisch rendement. Gezochte eigenschappen zijn daarom:

- resistentie tegen schimmelziekten;
- vorstbestendigheid;
- hoge opbrengst;
- hoog mostgewicht;
- aromatisch potentieel.

Ondanks een enorme populariteit in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft maar een enkele kruising bewezen van blijvende waarde te zijn. Wie kent nog de morio muskat, siegerrebe of albalonga? De lijst van druivenrassen die het nooit echt gemaakt hebben, is lang. De 'moeder' van alle kruisingen is ontegenzeggelijk müller-thurgau. Andere min of meer succesvolle witte kruisingen zijn bacchus, ehrenfelser, kerner, ortega, rieslaner en scheurebe, zij het dat hun aandeel in de aanplant zeer beperkt is. De laatste twee, beide rieslingkruisingen, geven uitgesproken aromatische wijnen. Kerner (een kruising van trollinger en riesling uit 1929) komt qua smaakprofiel het dichtst in de buurt van riesling. De belangrijkste blauwe kruising is dornfelder. Als blauwe kruisingen telt Duitsland verder nog domina, regent en een paar variaties op cabernet sauvignon (zoals cabernet mitos en cabernet dorsa). De regent, die goed bestand is tegen rot, is ook in Nederlandse wijngaarden behoorlijk veel aangeplant.

24.6 Wijnbouw

Het wijngaardareaal van Duitsland schommelt al jaren rond de 100.000 ha. Het is dus kleiner dan dat van het wijngebied Bordeaux (zie hoofdstuk 8) maar ruim twee keer zo groot als dat van Oostenrijk (zie hoofdstuk 24). De wijngaarden zijn hoofdzakelijk te vinden in de dalen van de Rijn en



Anbaugebiet	Wijngaardareaal	% wit/blauw	Eerste druivenras (%)	Tweede druivenras (%)	Derde druivenras (%)
Rheinessen	26.943 ha	72:28	riesling 18,4%	müller-thurgau 14,9%	dornfelder 12,2%
Pfalz	23.721 ha	66:34	riesling 25%	dornfelder 11,8%	grauburgunder 8%
Baden	15.812 ha	60:40	spätburgunder 33,3%	müller-thurgau 14,6%	grauburgunder 14,3%
Württemberg	11.424 ha	32:68	riesling 18,5%	trollinger 17,7%	lemberger 15,6%
Mosel	8.689 ha	91:9	riesling 62,4%	müller-thurgau 9,8%	elbling 5,3%
Franken	6.163 ha	82:18	silvaner 25%	müller-thurgau 23,7%	bacchus 12,2%
Nahe	4.239 ha	76:24	riesling 28,9%	müller-thurgau 11,8%	dornfelder 9,6%
Rheingau	3.200 ha	86:14	riesling 77,6%	spätburgunder 12,2%	overig 10,2%
Saale-Unstrut	819 ha	75:25	müller-thurgau 14,8%	weißburgunder 13,8%	riesling 8,9%
Ahr	563 ha	18:82	spätburgunder 65%	riesling 8%	frühburgunder 6%
Sachsen	496 ha	82:18	riesling 13,5%	müller-thurgau 13,3%	weißburgunder 12,5%
Mittelrhein	465 ha	85:15	riesling 65%	spätburgunder 10,1%	müller-thurgau 4,7%
Hessische Bergstraße	463 ha	79:21	riesling 38,9%	gruaburgunder 12,5%	spätburgunder 11%

Tabel 24.3 De drie belangrijkste druivenrassen per wijnbouwgebied met hun aandeel in de aanplant in 2021 (bron: Deutsches Weininstitut)

zijn zijrivieren Moezel, Main en Neckar. De beste wijngaarden liggen op stukken land waar andere vormen van landbouw onmogelijk zijn.

Een veelgebruikt Duits woord voor wijngaard is *Weinberg*. Dit woord is toepasselijk, aangezien veel Duitse wijngaarden van oudsher op hellingen zijn aangelegd. Men spreekt in dit verband ook wel van *Hanglagen* (een *Hang* is een helling). Gaat het om een steile helling van minstens 30 procent, dan is er sprake van een *Steillage*. Steile hellingen bieden in kwalitatief opzicht de beste resultaten, maar de exploitatie ervan is duur. Mechanisatie is maar in beperkte mate mogelijk en het onderhoud is kostbaar. Alleen een economisch verantwoorde prijs voor de wijn rechtvaardigt een bedrijfsvoering met dergelijke wijngaarden. Goede Duitse wijn uit een wijngebied met steile hellingen kan daarom nooit goedkoop zijn.

Om economische redenen zijn in het recente verleden wijngaarden op vlak en vruchtbaar terrein aangeplant, vaak met zeer productieve kruisingen. Op een enkele uitzondering na heeft deze politiek alleen maar geleid tot de productie van middelmatige massawijnen, ook al dragen ze op papier indrukwekkende predikaten.

In de afgelopen decennia is in tal van gebieden een grootschalig programma tot ruilverkaveling en herinrichting uitgevoerd. Dat gebeurde om de exploitatie van moeilijk te bewerken wijngaarden te vergemakkelijken. In het kader van deze ingrijpende *Flurbereinigung* zijn percelen die vroeger versnipperd waren, aaneengesloten tot grotere wijngaarden. Er zijn wegen, terrasmuren en afwateringsgoten aangelegd. Tegelijkertijd heeft men ook op vele plaatsen *Weinlehrpfade* aangelegd, educatieve wijn-

wandelpaden. In steile wijngaarden, met name aan de Moezel, past men nog paalgeleiding toe. In een beperkt aantal wijngaarden wordt iedere plant afzonderlijk verticaal langs een paal geleid en de ranken in boogvorm. In minder steile percelen wordt gebruikgemaakt van draadgeleiding.

Ondanks arme bodems en een relatief koel klimaat kunnen de Duitse wijngaarden voor opmerkelijk hoge rendementen zorgen. Opbrengsten van 100 hl/ha of meer zijn geen uitzondering, alle discussies over rendementsbeperkingen ten spijt. De pluk vindt in Duitsland op een laat tijdstip plaats, van half september voor vroegrijpende rassen tot laat in november voor riesling.

24.7 Vinificatie

Duitse wijnen kenmerken zich met name door zuren. In het relatief koele klimaat van Duitsland rijpen druiven langzaam en laat, waardoor ze hun zuren en aroma's behouden. Om te voorkomen dat de zuren in de smaak te dominant worden – ook al gaat het om wijnsteenzuren en niet om agressieve appelzuren – laten wijnmakers meestal een paar gram restsuiker in de wijn zitten. In relatief warme gebieden ligt het restsuikergehalte doorgaans lager dan in koelere gebieden. Wijnen uit de Mosel bijvoorbeeld hebben door hun hoge zuurgraad wat meer restsuiker nodig dan wijnen uit warmere, zuidelijke gebieden als Pfalz of Baden.

In de Duitse wijnbouw spelen mostgewichten een belangrijke rol. Ze worden gemeten in graden Öchsle (°Ö). Het aantal graden correspondeert met het aantal grammen suikers en aromastoffen in de most. Op basis daarvan krijgt men bij benadering een indruk van het potentiële alcoholgehalte. Ook zuren worden meegewogen. Chaptalisatie (in het Duits: *Anreicherung*) is alleen toegestaan voor wijnen die tot het niveau *Qualitätswein* of lager behoren.

Witte en rode wijnen

Witte wijnen worden in diverse gradaties van zoetheid gevinifieerd. Die zoetheid kan verkregen worden doordat de gisting op natuurlijke wijze stopt of doordat de wijnmaker actief ingrijpt. De gisting kan op natuurlijke wijze tot stilstand komen door een hoog suikergehalte van de most en/of een lage temperatuur in de kelder. Wijnen die op deze manier tot stand komen, dus zonder enigerlei vorm van manipulatie, werden tot 1971 aangeduid als *naturrein*. Ook het toevoegen van zo'n 100 mg/l sulfiet helpt de gisting te stoppen op het gewenste gehalte alcohol en restsuiker. Om een wijn met restzoet te produceren kan men ook de wijn eerst volledig laten vergisten en deze vervolgens aanzoeten met *Süßreserve*. Dat is onvergiste, vaak ingedikte most met hetzelfde suikergehalte en dezelfde herkomst als de vergiste wijn. Deze handelwijze is enigszins vergelijkbaar met de *dosage* bij mousserende wijnen. Duitsland is met zijn veelal aromatische druivenrassen sinds jaar en dag een land van reductieve vinificatie met vergisting bij lage temperatuur. Malolactische omzetting (*biologischer Säureabbau*) blijft bij witte wijnen in de regel achterwege. Bij rode wijnen gebeurde dat tot voor kort ook nogal eens, omdat ze min of meer als witte gevinifieerd werden. Dat leidde dan tot compensatie van de agressieve appelzuren met restsuiker. Rode wijnen waren daarom meestal licht en zoet. Tegen-

