
waarom er zoveel varianten en biotypen zijn. Spontane mutatie is eerder regel dan uitzondering. Inmiddels zijn meer dan 600 varianten bekend. Ook het aantal synoniemen is groot: bruneletto, calabrese, morellino de Florence, morellone, negretta, nielluccia (nielluccio, niellucciu), pignolo en tignolo, om maar wat voorbeelden te noemen. Verwacht wordt dat de namen en synoniemen van de verschillende biotypen in de nabije toekomst worden vervangen door gecertificeerde klonale aanduidingen.

■ *Vernaccia nera*

Vernaccia is een soort verzamelnaam voor druiven die niet altijd aan elkaar verwant zijn (zie blz. 34). Genetisch is de vernaccia nera gelijk aan de Spaanse garnacha en de Franse grenache. Synoniemen zijn onder meer guarnaccia, morone, tai rosso (in Veneto), tranese en cannonau (op Sardinië). Vernaccia nera staat in Italië op nog geen 300 ha aangeplant, waarvan we het grootste deel in de Marken en in Toscane aantreffen. De belangrijkste herkomstnaam voor deze druif is Vernaccia di Serrapetrona DOCG.

21.6 Wijnbouw

Het wijngaardareaal in Italië is de laatste decennia fors afgenomen, maar de productie neemt niet evenredig af. Er wordt efficiënter gebruikgemaakt van de oppervlakten en gemiddeld meer per hectare geoogst dan voorheen. Volgens cijfers van ISTAT produceerde Italië in 2023 bijna 42,5 miljoen hectoliter; 60 procent wit en 40 procent rood/rosé. Het aandeel BOB-wijnen besloeg 48 procent, 25 procent werd geclassificeerd als 'wijn' en 27 procent BGA-wijnen. Veruit de meest productieve regio is Veneto, met ruim 10,5 miljoen hectoliter wijn, gevolgd door Apulië met bijna 6,9 en Emilia Romagna met 6,2. Sicilië leverde 4,8 miljoen hectoliter, de Abruzzes 1,8 - Piemonte 1,9 - Toscane 1,8 - Friuli Venezia Giulia 1,7 - Lombardije 1,2 en Trentino Alto Adige 1,2 miljoen hectoliter. De Veneto blijft de absolute leider voor de productie van witte wijn (8,6 miljoen hectoliter), met een hoofdrol voor Prosecco en Pinot Grigio delle Venezie. De hoogste productie van rode wijn komt voor rekening van Apulië; 3,8 miljoen hectoliter, het merendeel verkocht in bulk. De Veneto is qua volume ook de absolute leider voor de productie van DOP-wijnen (8 miljoen hectoliter in totaal), Apulië heeft de hoogste productie IGP-wijnen, met 2,2 miljoen hectoliter. In Italië zijn veel handelshuizen en coöperaties werkzaam en beiden zijn een belangrijke schakel tussen de boeren en de uiteindelijke consumenten, zoals in Toscane, Trentino, de Veneto en op Sicilië. Dit heeft veel te maken met de enorme versnippering van het wijngaardbezit. De gemiddelde wijngaard is nog geen 2 ha groot. Relatief grote individuele bedrijven vinden we vooral in Toscane (Antinori en Frescobaldi), Emilia-Romagna (Cantine Riunite & CIV), de Veneto (Santa Margherita) en op Sicilië (Corvo en Settesole).

Snoei- en geleidingsmethoden

Vaak liggen de betere wijngaarden in Italië op een helling, de laatste jaren hoger vanwege de klimaatverandering. Vlakke gebieden zoals in Apulië (of Grave de Friuli) vormen een uitzondering. Meestal zien we in Italiaanse wijngaarden niet alleen unieke druivenrassen, maar ook eigen snoeiwijzen. Deze hebben zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld vanuit klassieke methoden. Opval-

lend is dat in Italië zogenaamde polycultuur tot in het midden van de twintigste eeuw gebruikelijk was. In veel wijngaarden door heel Italië werden tussen de wijnstokken ook graan en andere gewassen verbouwd, inclusief olijven. Pas in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is wijnbouw een monocultuur geworden. In eerste instantie werd bij het herinrichten van de wijngaarden gekozen voor een relatief lage plantdichtheid (zo'n 3.000 tot 3.330 stokken per hectare) met voldoende ruimte om het werken met tractoren en grote oogstmachines mogelijk te maken. Hierdoor was de opbrengst per plant lange tijd hoog tot zeer hoog en toegestaan door de voorgeschreven rendementen in veel DOC-bepalingen. Pas in de jaren tachtig kwam er aandacht voor hogere plantdichtheden (6000 of meer stokken per hectare) en lagere opbrengsten, met een betere wijnkwaliteit tot gevolg.

Globaal zijn er twee methoden te onderscheiden voor het opbinden van de druivenstokken: hoog opbinden en het moderne scheutsnoeien. Voorbeelden van traditionele snoeiwijzen zijn alberello (waarbij de wijnstok wordt onderhouden als een struik of boompje, ook bekend als gobelet of bush vine) en de diverse varianten van de pergola. Deze vorm van preeelbouw is van oudsher in gebruik in heel Italië, vooral in Trentino, rond Verona, in de Abruzzes en regio's in het zuiden. Het doel hierbij is om door middel van een dicht bladerdek overmatige hitte te voorkomen. Dat is gunstig voor de druiventrossen en eventueel ook voor andere gewassen, zoals graan en groenten, die op de grond worden verbouwd. Deze snoeiwijze geeft een hoge opbrengst per hectare en een zeer hoge opbrengst per plant. Een ander voordeel is dat het de druiventrossen beter beschermt tegen vorst aan de grond, hagel en schimmel- ziekten. De pergola vraagt evenwel relatief veel onderhoud en machinaal oogsten is bij de pergola-methode niet mogelijk.

De snoeiwijzen toegelicht:

- *Cordone speronato* ofwel *cordon spur*: Hierbij wordt een volwassen tak in horizontale richting langs een draad geleid. De uitlopers waaraan de druiventrossen zich ontwikkelen, worden in verticale positie naar boven geleid.
- *Lyre*: Hierbij worden de takken in een U- of V-vorm gesnoeid.
- *Tendone*: Deze methode wordt vooral toegepast in Zuid-Italië, waarbij de planten hoog worden opgebonden, enerzijds voor een hoge opbrengst en anderzijds om de bladeren veel schaduw te laten creëren, een soort *pergola* dus.
- *Guyot* of *spalliera*: Bij deze snoeiwijze wordt een bestaande tak of jonge uitloper op horizontale wijze langs een draad geleid, weg van de verticale stam.

De meest algemene snoeimethode is *cordone speronato*, met een toenemende populariteit van *Guyot*, een en ander sterk afhankelijk van de druivenrassen, traditie en nieuwe inzichten. Zo blijkt de vaak bekritiseerde pergola-methode juist duidelijk voordelen te hebben bij specifieke druivenrassen en in sommige wijnbouwgebieden. In het Valpolicellagebied bijvoorbeeld biedt de pergola betere bescherming tegen nachtvorst, vocht en overvloedige zonneschijn dan *Guyot*.





Pergola veronese in de regio Valpolicella (links) en alberello op Sicilië (rechts)

Het was een oude, Etruskische traditie om druivenranken te geleiden langs hoge bomen. Bij het plaatsje Aversa in Campanië, ten noorden van Napels, wordt deze oude methode (*alberata aversana* genoemd) door sommige druiventelers nog toegepast. De ranken van asprinio-druiven groeien daar in meer dan tien meter hoge populieren, zodat de druiven met behulp van een ladder geplukt moeten worden. Wijnen van Aversa DOC die gemaakt zijn van aldus geteelde druiven worden geëtiketteerd met de vermelding Alberata of Vigneti ad Alberata. De kwaliteit van de druiven is doorgaans niet heel hoog, omdat ze niet goed rijp worden.

21.7 Vinificatie

Ook Italië is met zijn tijd meegegaan. Tegenwoordig is gisting met temperatuurbelasting eerder regel dan uitzondering en ontbreekt het in veel bedrijven niet aan roestvrijstalen tanks. Vanaf de jaren zestig zijn vooral de witte wijnen enorm opgeknapt door nieuwe technieken. Ze zijn nu frisser en fruitiger dan in het midden van de vorige eeuw. In nieuwe wijngaarden staan de druivenstokken dicht op elkaar geplant en worden ze laag gesnoeid, wat druiven van goede kwaliteit oplevert. Aangezien het hoge opbinden van stokken, zoals vroeger vaak werd gedaan, de rijping van de druiven niet ten goede kwam, ondergingen de druiven uit ouderwetse wijngaarden met *pergola*-wijnbouw vaak een langere maceratie om een gebrek aan kleur en smaak te compenseren. Dit laten meegisten van de