Questionnaire:

Questionnaire simplifié de repérage des troubles démentiels

1. Méi	moire et rappel
	Pas de perte de mémoire évidente ou des oublis inconsistants qui ne perturbent pas le fonctionnement dans les activités quotidiennes.
	Légères pertes de mémoire constantes ou rappel partiel des événements qui peuvent interférer avec les activités quotidiennes ; la personne répète des questions/des déclarations, égare des articles, oublie des rendez-vous.
	Perte de mémoire légère à modérée, plus marquée pour les événements récents, qui interfère avec l'exécution des activités de la vie quotidienne.
	Perte de mémoire modérée à grave ; seules les informations apprises très jeune sont rappelées ; les nouvelles informations sont rapidement oubliées.
	Perte de mémoire sévère, le rappel de nouvelles informations est presque impossible ; la mémoire à long terme peut être affectée.
2. Orio	entation
	La personne est très bien orientée en ce qui concerne les personnes, les lieux et le temps, presque tout le temps.
	Légère difficulté à garder la notion du temps ; elle peut oublier le jour ou la date, plus fréquemment que par le passé.
	Difficulté légère à modérée à garder la notion du temps et la séquence des événements ; la personne oublie le mois ou l'année ; orientée dans des lieux familiers, mais devient confuse en dehors des zones familières ; elle se perd ou erre.
	Difficulté modérée à sévère ; elle est généralement désorientée par rapport au temps et aux lieux (connus et inconnus) ; elle habite souvent dans le passé.
	Orientée seulement par rapport à son nom, bien que des membres de la famille peuvent être

reconnus.

3. Capacités de prises de décision et de résolution de problèmes		
	La personne résout les problèmes du quotidien sans difficulté ; elle gère bien les affaires personnelles et les finances ; capacités décisionnelles cohérentes avec la performance passée.	
	La personne présente une légère déficience ou prend plus de temps pour résoudre les problèmes ; difficulté avec des concepts abstraits ; décisions encore correctes.	
	Difficulté modérée à gérer les problèmes et à prendre des décisions ; la personne s'en remet à d'autres pour plusieurs décisions ; le jugement social et le comportement social peuvent être légèrement altérés ; perte de perspicacité.	
	Capacité de gérer des problèmes sévèrement compromis ; elle ne prend que des décisions personnelles simples ; le jugement social et le comportement social sont souvent altérés ; elle manque de perspicacité.	
	Incapacité de prendre des décisions ou de résoudre des problèmes ; d'autres prennent presque toutes les décisions.	
4. Act	ivités à l'extérieur de la maison	
	Fonctionnement indépendant, au niveau habituel de performance, pour le travail, les courses, les activités communautaires, le bénévolat, ou les groupes sociaux.	
	Légère déficience dans ces activités par rapport à la performance antérieure ; léger changement dans les compétences de conduite automobile ; encore capable de gérer les situations d'urgence.	
	Incapacité de fonctionner de façon indépendante, mais capacité d'assister et d'être engagée ; la personne semble « normale » pour les autres ; des changements notables dans les compétences de conduite automobile ; préoccupation quant à la capacité à gérer les	

situations d'urgence.

généralement besoin d'être accompagnée.

amenée à des activités en dehors de la maison.

Pas de prétention de fonctionnement indépendant à l'extérieur de la maison ; elle semble assez bien pour être amenée à des activités à l'extérieur du domicile familial, mais a

Aucune fonction ou activité indépendante à l'extérieur ; elle apparaît trop malade pour être

5. Fonctionnement à la maison et activités de loisirs			
	Les tâches domestiques à la maison, les loisirs et les intérêts personnels sont bien maintenus, comparativement aux performances passées.		
	Atteinte légère ou baisse d'intérêt pour ces activités ; difficulté à utiliser des appareils (en particulier les nouveaux achats).		
	Déficience légère, mais claire dans le fonctionnement à la maison et les loisirs ; les tâches plus difficiles sont abandonnées ; les hobbies et les intérêts plus complexes sont abandonnés.		
	Préservation des tâches simples seulement, intérêt très restreint dans les loisirs qui sont peu maintenus.		
	La personne ne fonctionne plus dans les tâches ménagères ou les passe-temps antérieurs.		
6. Toi	lette et hygiène personnelle		
	La personne est pleinement capable de prendre soin d'elle-même (habillage, hygiène, toilette, lavage, bain).		
	Légers changements dans les capacités et l'attention à ces activités.		
	Elle a besoin d'incitation pour aller au bout de ses activités, mais peut encore les mener de façon indépendante.		
	Elle a besoin d'une aide pour l'habillement, l'hygiène, la tenue des objets personnels; est occasionnellement incontinente.		
	Elle a besoin d'une aide importante pour les soins personnels et l'hygiène ; incontinence fréquente.		
7. Cha	angements de comportement et de personnalité		
	Comportement socialement approprié en public et en privé ; aucun changement dans la personnalité.		
	Changements questionnables ou très légers dans le comportement, la personnalité, le contrôle émotionnel et la pertinence des choix.		
	Légers changements de comportement ou de personnalité.		



	Des changements modérés de comportement ou de personnalité affectent les interactions avec les autres ; la personne peut être évitée par des amis, des voisins ou des parents éloignés.				
	Changements sévères de comportement ou de personnalité de telle sorte que les interactions avec les autres sont souvent désagréables ou évitées.				
8. Lan	gage et capacités de communication				
	Pas de difficulté de langage ou recherche occasionnelle des mots ; la personne lit et écrit comme par le passé.				
	Légère difficulté constante à trouver les mots, en utilisant des termes descriptifs ou en prenant plus de temps pour s'exprimer ; légers problèmes de compréhension, conversation diminuée ; la lecture et l'écriture peuvent être affectées.				
	Difficulté modérée à trouver les mots dans le discours, ne peut nommer des objets, réduction marquée de la production de travail ; réduction de la compréhension, de la conversation, de l'écriture et/ou de la lecture.				
	Déficit modéré à sévère de la production de la parole ou de la compréhension ; elle a de la difficulté à communiquer ses pensées à d'autres ; capacité limitée de lire ou d'écrire.				
	Déficit sévère du langage et de la communication ; peu ou pas de discours compréhensible est produit.				
9. Hur	neur				
	Pas de changements d'humeur, d'intérêt, ou de niveau de motivation.				
	Occasionnellement : tristesse, dépression, anxiété, nervosité, ou perte d'intérêt/motivation.				
	Quotidiennement : tristesse, dépression, anxiété, nervosité, ou perte d'intérêt/motivation.				
	Problèmes modérés de tristesse, dépression, anxiété, nervosité, ou perte d'intérêt/motivation.				
	Problèmes sévères de tristesse, dépression, anxiété, nervosité, ou perte d'intérêt/motivation.				



10.	Atten	tion	et	con	cen1	tratio

	Normalité de l'attention, de la concentration et de l'interaction avec l'entourage et l'environnement.
	Problèmes légers d'attention, de concentration et d'interaction avec l'entourage et l'environnement ; la personne peut paraître somnolente pendant la journée.
	Problèmes modérés d'attention et de concentration ; elle peut avoir des absences ou passer du temps les yeux fermés ; augmentation de la somnolence diurne.
	Une partie importante de la journée est passée à dormir ou à ne pas prêter attention à l'environnement ; lorsqu'elle a une conversation, elle peut dire des choses qui sont illogiques ou ne concordent pas avec le sujet.
	Peu ou pas de capacité à prêter attention à l'entourage et l'environnement extérieur.

D'après la référence originale en langue anglaise :

James E. Galvin (2015), The Quick Dementia Rating System (QDRS): A rapid dementia staging tool, dans Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

Score	Interprétation
0-1	Aucun déficit cognitif léger ni signe de démence
1,5-5,5	Déficit cognitif léger ou démence très légère
6-12	Démence légère
12,5-17	Démence modérée
17,5-30	Démence sévère