Oficina d'Accés a la Universitat

### Proves d'accés a la universitat

# Matemàtiques

#### Sèrie 1

Responeu a CINC de les sis questions seguents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que permetin emmagatzemar dades o que puguin transmetre o rebre informació.

- 1. Siguin les matrius  $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ t & 2 \end{pmatrix}$  i  $N = \begin{pmatrix} -1 & t & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ .
  - *a*) Calculeu  $M \cdot N$  i comproveu que la matriu resultant no és invertible. [1 punt]
  - **b)** Trobeu els valors de t per als quals la matriu  $N \cdot M$  és invertible. [1 punt]
- **2.** Sigui *r* la recta que passa pels punts A = (0, 1, 1) i B = (1, 1, -1).
  - *a*) Trobeu l'equació paramètrica de la recta *r*. [1 punt]
  - **b)** Calculeu tots els punts de la recta r que estan a la mateixa distància dels plans  $\pi_1$ : x+y=-2 i  $\pi_2$ : x-z=1. [1 punt]


Nota: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades  $(x_0, y_0, z_0)$  al pla d'equació

$$Ax + By + Cz + D = 0$$
 amb l'expressió  $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ .

- 3. Sigui la funció  $f(x) = x^3 x^2$ .
  - *a*) Trobeu l'equació de la recta tangent a la gràfica i que és paral·lela a la recta d'equació x + 3y = 0.

    [1 punt]
  - b) Calculeu, si n'hi ha, els punts de la gràfica en què la funció presenta un màxim o mínim relatiu o un punt d'inflexió.
     [1 punt]

- 4. Considereu els punts P = (3, -2, 1), Q = (5, 0, 3), R = (1, 2, 3) i la recta  $r: \begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ 2y + 3z 5 = 0 \end{cases}$ 
  - a) Determineu l'equació general (és a dir, que té la forma Ax + By + Cz = D) del pla que passa per P i Q i és paral·lel a la recta r.
  - **b**) Donats el pla  $x + 2y + m \cdot z = 7$  i el pla que passa per P, Q i R, trobeu m perquè siguin paral·lels i no coincidents. [1 punt]
- 5. Sigui la funció  $f(x) = \sqrt{x} + x 2$ .
  - a) Comproveu que la funció f(x) compleix l'enunciat del teorema de Bolzano a l'interval [0,2] i que, per tant, l'equació f(x)=0 té alguna solució a l'interval (0,2). Comproveu que x=1 és una solució de l'equació f(x)=0 i raoneu, tenint en compte el signe de f'(x), que la solució és única.
  - *b*) A partir del resultat final de l'apartat anterior, trobeu l'àrea limitada per la gràfica de la funció f(x), l'eix de les abscisses i les rectes x = 0 i x = 1. [1 punt]
- **6.** Uns estudiants de batxillerat han programat un full de càlcul com el de la figura següent que dona la solució d'un sistema d'equacions compatible determinat d'una manera automàtica:



- *a*) Escriviu el sistema i comproveu que els valors proposats com a solució són correctes. [1 punt]
- **b)** Quin valor s'hauria de posar en lloc del 2 que està emmarcat en la imatge, corresponent a la cel·la E8 ( $a_{33}$  de la matriu de coeficients), perquè el sistema fos incompatible? [1 punt]

Oficina d'Accés a la Universitat

### Proves d'accés a la universitat

# Matemàtiques

#### Sèrie 5

Responeu a CINC de les sis questions seguents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que permetin emmagatzemar dades o que puguin transmetre o rebre informació.

- 1. Considered el sistema d'equacions lineals  $\begin{cases} 6x + 3y + 2z = 5\\ 3x + 4y + 6z = 3, \text{ per a } m \in \mathbb{R}.\\ x + 3y + 2z = m \end{cases}$ 
  - *a*) Expliqueu raonadament que per a qualsevol valor del paràmetre *m* el sistema té una única solució.

[1 punt]

- b) Resoleu el sistema i trobeu l'expressió general del punt solució.
   [1 punt]
- **2.** Siguin el pla d'equació  $\pi$ : x + y z = 0 i el punt P = (2, 3, 2).
  - a) Calculeu el punt simètric del punt P respecte del pla  $\pi$ .
  - **b**) Calculeu l'equació cartesiana (és a dir, que té la forma Ax + By + Cz = D) dels dos plans paral·lels a  $\pi$  que estan a una distància  $\sqrt{3}$  del punt P. [1 punt]

Nota: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades  $(x_0, y_0, z_0)$  al pla d'equació

$$Ax + By + Cz + D = 0$$
 amb l'expressió  $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ .

- 3. Sigui la funció  $f(x) = a \cdot e^{-x^2 + bx}$ , amb  $a \ne 0$  i  $b \ne 0$ .
  - *a*) Calculeu els valors de *a* i de *b* que fan que la funció tingui un extrem relatiu en el punt (1, e).

[1 punt]

**b**) Per al cas a=3 i b=5, calculeu l'asímptota horitzontal de la funció f quan x tendeix  $a+\infty$ .

[1 punt]

- 4. Sabem que una funció f(x) està definida per a tots els nombres reals i que és derivable dues vegades. Sabem també que té un punt d'inflexió en el punt d'abscissa x = 2, que l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f(x) en aquest punt és y = -124x + 249 i que f(-3) = -4.
  - *a*) Calculeu f''(2), f'(2) i f(2).

b) Calculeu 
$$\int_{-3}^{2} f'(x) dx$$
.

[1 punt]

- 5. Siguin les rectes  $r_1$ :  $x-1=\frac{y-2}{-1}=z-5$  i  $r_2$ :  $(x, y, z)=(2-3\lambda, -1+\lambda, 2)$ .
  - a) Trobeu l'equació cartesiana (és a dir, que té la forma Ax + By + Cz = D) del pla que conté la recta  $r_1$  i és parallel a la recta  $r_2$ .
  - b) Digueu quina condició s'ha de complir perquè existeixi un pla que contingui la recta  $r_1$  i sigui perpendicular a la recta  $r_2$ . Amb les rectes  $r_1$  i  $r_2$  de l'enunciat, comproveu si existeix un pla que contingui la recta  $r_1$  i sigui perpendicular a la recta  $r_2$ . [1 punt]
- 6. Considereu la matriu  $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .
  - a) Si  $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  és la matriu identitat d'ordre 3, calculeu per a quins valors de k la

matriu A + kI té inversa. Trobeu, si existeix, la matriu inversa de A - 2I.

**b**) Calculeu la matriu X que satisfà l'equació  $X \cdot A + A^{T} = 2 \cdot X$ , en què  $A^{T}$  és la matriu transposada de la matriu A.

[1 punt]