Pàgina 1 de 8

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

SÈRIE 1

1.

a)

La tarifa de la companyia A segueix la funció f(x) = 0.4x + 20. Mentre que la tarifa de la companyia B és $g(x) = 0.01x^2 + 0.1x + 10$.

Per trobar el preu de les tarifes si fem un recorregut de 10 o de 80 km, només hem de substituir:

$$f(10) = 24$$
, $g(10) = 12$.

Per tant, si fem un recorregut de 10 km la tarifa de la companyia A ens surt 12 euros més cara que la de la companyia B. D'altra banda,

$$f(80) = 52$$
, $g(80) = 82$.

En aquest cas la tarifa de la companyia A és 30 euros més econòmica que la tarifa de la companyia B.

Si substituïm x = 0 a la tarifa de la companyia B, observem que g(0) = 10, per tant, efectivament hi ha un cost fix de 10 euros només pel sol fet de pujar al taxi.

b)

Per trobar el valor per al qual les dues tarifes coincideixen, hem de resoldre l'equació:

$$0.4x + 20 = 0.01x^2 + 0.1x + 10$$

$$x^2 - 30x - 1000 = 0$$
 que té per solucions $x = 50$ i $x = -20$.

Descartem la segona solució perquè no té sentit en el context del problema i obtenim que per a una distància de x = 50 km les dues tarifes coincideixen.

Per a distàncies entre 0 i 50 km observem que la segona tarifa és inferior a la primera. La diferència de preu entre totes dues tarifes si $x \in [0,50)$ vindrà donada per la funció:

$$D(x) = 0.4x + 20 - (0.01x^2 + 0.1x + 10) = -0.01x^2 + 0.3x + 10.$$

Pàgina 2 de 8

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

Per trobar el màxim, calculem la derivada

$$D'(x) = -0.02x + 0.3$$

la igualem a zero i obtenim x = 15.

Observem que es tracta d'un màxim perquè la derivada és positiva per a valors inferiors a x=15, i per tant, la diferència de preu és creixent, mentre que és negativa per a valors superiors a x=15 i, per tant, la funció D(x) és decreixent.

Quan x = 15 la diferència de preu entre una tarifa i l'altra és de D(15) = 12,25 euros.

- a) Trobar les tarifes de les dues companyies si fem un recorregut de 10 km: 0,25 punts. Trobar les tarifes de les dues companyies per al recorregut de 80 km: 0,25 punts. Calcular la diferència en els dos casos: 0,25 punts. Calcular el cost fix de la tarifa de la companyia B: 0,25 punts.
- b) Calcular el valor per al qual les dues tarifes coincideixen: 0,5 punts. Trobar la funció que ens dona la diferència entre les dues tarifes: 0,25 punts. Trobar el valor per al qual s'assoleix el màxim: 0,25 punts. Justificar que es tracta d'un màxim: 0,25 punts. Trobar el valor de la diferència màxima de tarifes per a distàncies inferiors a 50 km: 0,25 punts.

Pàgina 3 de 8

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

2.

a)

Anomenarem x, y i z la producció de sofàs del mes passat de la primera, segona i tercera fàbrica, respectivament. Tenim el sistema d'equacions següent:

$$\begin{cases} x + y + z = 1260 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

Utilitzant el mètode de Gauss en l'ordre x, y, z, s'obté el sistema

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1260 \\ 1 & -1 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1260 \\ 0 & 2 & 0 & | & 1260 \end{pmatrix}$$

Es tracta d'un sistema compatible indeterminat, ja que només tenim dues equacions i en canvi tenim tres incògnites, i, per tant, no es pot determinar quants sofàs van produir cadascuna de les tres fàbriques. Tanmateix, observem que podem trobar la producció de la segona fàbrica a partir de la segona equació, i obtenim y=630 sofàs.

b)

Ara tenim el sistema d'equacions següent:

$$\begin{cases} x + y + z = 1260 \\ x - y + z = 0 \\ 0.1 \ x + 0.3 \ y + 0.2 \ z = 284 \end{cases}$$

Fem un canvi entre la primera i la segona fila i multipliquem l'última fila per 10. S'obté:

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ x + y + z = 1260 \\ x + 3y + 2z = 2840 \end{cases}$$

Utilitzant el mètode de Gauss, prenent les variables en l'ordre x, y, z, obtenim la matriu

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1260 \\ 1 & 3 & 2 & 2840 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1260 \\ 0 & 4 & 1 & 2840 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 630 \\ 0 & 0 & 1 & 320 \end{pmatrix}$$

Podem concloure que és un sistema compatible determinat. Resolent-lo s'obté la solució z=320, y=630 i x=310. Així doncs, la primera fàbrica va produir 310 sofàs el mes passat, la segona 630 i la tercera 320.



Pàgina 4 de 8

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

- a) Plantejament del sistema: 0,25 punts cada equació. Resolució del sistema: 0,5 punts. Obtenció del nombre de sofàs produïts per la segona fàbrica: 0,25 punts.
- b) Plantejament de l'equació addicional: 0,25 punts. Resolució del sistema: 0,5 punts. Obtenció del nombre de sofàs produïts per la primera i la tercera fàbrica: 0,5 punts.

Pàgina 5 de 8

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

3.

a)

Si el tractor fa el recorregut a 40 km/h obtenim que el temps que trigarà a fer tot el trajecte és de $\frac{300}{40}$ = 7,5 hores. Per tant, el cost total del trajecte sumant les despeses de gasoil i el salari del conductor serà

$$\left(5 + \frac{40^2}{98}\right) \cdot 7.5 \cdot 1.96 + 7.5 \cdot 14.70 = 423.75 \in$$

Anem ara a buscar la funció que ens dona el cost en funció de la velocitat, en quilòmetres per hora, x:

$$C(x) = \left(5 + \frac{x^2}{98}\right) \cdot \frac{300}{x} \cdot 1,96 + \frac{300}{x} \cdot 14,70 = \frac{7350}{x} + 6x$$

b)

Per trobar el cost més econòmic cal buscar el mínim de la funció C(x). Comencem calculant la derivada:

$$C'(x) = -\frac{7350}{x^2} + 6$$

Si la igualem a zero obtenim que $x=\pm\sqrt{\frac{7350}{6}}=\pm35$ km/h

Descartem la solució negativa perquè no té sentit en el context del problema i observem que la derivada $\mathcal{C}'(x)$ és negativa per a valors inferiors a x=35 i, per tant, la funció $\mathcal{C}(x)$ és decreixent, mentre que és positiva per a valors superiors a x=35 i, per tant, la funció $\mathcal{C}(x)$ és creixent. Així, doncs, en x=35 hi trobem un mínim local.

El cost a aquesta velocitat serà de

$$C(35) = \frac{7350}{35} + 6 \cdot 35 = 420 \in$$

- a) Càlcul del temps necessari a 40 km/h: 0,25 punts. Càlcul del cost a 40 km/h: 0,5 punts. Obtenció de la funció que dona el cost en funció de *x*: 0,5 punts.
- b) Càlcul de la derivada: 0,5 punts. Càlcul del punt on es troba el mínim: 0,25 punts. Justificació que es tracta d'un mínim: 0,25 punts. Càlcul del cost a aquesta velocitat: 0,25 punts.

Pàgina 6 de 8

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

4.

a)

Comencem calculant el producte que ens demanen

$$10 \cdot A + 3 \cdot B + 18 \cdot C$$

$$= 10 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} + 18 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 10 & 41 & 3 \\ 11 & 18 & 25 \\ 33 & -5 & 26 \end{pmatrix}.$$

Comprovem que efectivament la matriu és màgica:

$$10 + 41 + 3 = 54$$
, $11 + 18 + 25 = 54$, $33 - 5 + 26 = 54$, $10 + 11 + 33 = 54$, $41 + 18 - 5 = 54$ i $3 + 25 + 26 = 54$.

La constant màgica del Martí és 54.

b)

Ara sabem que el pare del Martí va néixer el 8 de setembre però no sabem quina edat té, que anomenarem x. Si calculem la seva matriu màgica obtenim

$$8 \cdot A + 9 \cdot B + x \cdot C = 8 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} + 9 \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} + x \cdot \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 8 & -17 + 3x & 9 \\ 1 + x & x & -1 + x \\ -9 + 2x & 17 - x & -8 + 2x \end{pmatrix}.$$

Sabem que la suma de qualsevol fila o columna ha de sumar 153. A partir, per exemple, de la primera fila, obtenim que 8 - 17 + 3x + 9 = 153 i, per tant, obtenim que x = 51.

Així doncs, el pare del Martí té 51 anys.

- a) Càlcul de $10 \cdot A + 3 \cdot B + 18 \cdot C$: 0,5 punts. Comprovació que la matriu obtinguda és màgica: 0,5 punts. Obtenció de la constant màgica del Martí: 0,25 punts.
- b) Plantejament del problema: 0,5 punts. Càlcul de la matriu màgica en funció de x: 0,5 punts. Obtenció de l'edat del pare del Martí: 0,25 punts.

Pàgina 7 de 8

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

5.

Considerem els esdeveniments:

 $A_1 = \text{el Guiu ha vist la pel·lícula}$

 $A_2 = \text{el Roc ha vist la pel·lícula}$

Sabem que $P(A_1) = 0.5$, $P(A_2) = 0.6$ i $P(A_1 \cap A_2) = 0.25$.

a)

La probabilitat que almenys un dels dos hagi vist la pel·lícula correspon a la unió dels dos esdeveniments:

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2).$$

I, per tant,

$$P(A_1 \cup A_2) = 0.5 + 0.6 - 0.25 = 0.85$$

Així doncs, la probabilitat que almenys un dels dos hagi vist la pel·lícula és de 0,85.

Ara ens demanen

$$P(A_2 \cap A_1^C) = P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) = 0.6 - 0.25 = 0.35$$

La probabilitat que el Roc hagi vist la pel·lícula però el Guiu no és de 0,35.

b)

Finalment ens demanen la probabilitat condicionada que el Guiu l'hagi vista si sabem que almenys un dels dos l'ha vista:

$$P(A_1|A_1 \cup A_2) = \frac{P(A_1 \cap (A_1 \cup A_2))}{P(A_1 \cup A_2)} = \frac{P(A_1)}{P(A_1 \cup A_2)} = \frac{0.5}{0.85} = 0.5882$$

La probabilitat que ens demanen és de 0,5882.

- a) Assignació correcta d'esdeveniments i de les dades de l'enunciat: 0,25 punts. Fórmula de la probabilitat de la unió: 0,25 punts. Resultat de la primera probabilitat demanada: 0,25 punts. Plantejament de la segona probabilitat demanada: 0,5 punts. Obtenció d'aquesta probabilitat: 0,25 punts.
- b) Plantejament: 0,5 punts. Resultat: 0,5 punts.

Pàgina 8 de 8

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

6.

a)

La mida de la mostra és n=350. L'estimació puntual de la proporció de persones que està a favor de la proposta és

$$\hat{p} = \frac{218}{350} = 0,6229.$$

L'estimació puntual de la proporció de persones a favor de la proposta és de 0,6229, és a dir, un 62,29%.

b)

Quan la mida de la mostra és gran, l'interval de confiança per a una proporció amb un nivell de confiança $\gamma \in (0,1)$ s'obté a partir de la fórmula

$$\left[\hat{p}-z_{\gamma}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},\hat{p}+z_{\gamma}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right],$$

en què, si Z segueix una distribució normal (0,1), $P(-z_{\gamma} \le Z \le z_{\gamma}) = \gamma$. Per tant tenim que els extrems de l'interval són

$$\hat{p} - z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 0,6229 - 1,96 \sqrt{\frac{0,6229(1-0,6229)}{350}} = 0,5721$$

i

$$\hat{p} + z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 0.6229 + 1.96 \sqrt{\frac{0.6229(1-0.6229)}{350}} = 0.6737$$

L'interval de confiança demanat és [57,21%, 67,37%], és a dir, el percentatge de persones que està a favor de la proposta està entre el 57,21% i el 67,37% amb una confiança del 95%.

- a) Càlcul de la proporció mostral: 0,75 punts. Expressió com a percentatge: 0,25 punts.
- b) Interpretació correcta de la fórmula i substitució correcta de cada paràmetre pel seu valor: 1 punt. Resultat final: 0,5 punts.