

University of South Bohemia

Faculty of Science



Praktika IV

Určení Rydbergovi konstanty

Datum: 18.10.2023
Jmeno: Martin Skok
Obor: Fyzika
Hodnoceni:

1 Úkoly

- Okalibrujte spektograf pomocí sodíkové lampy
- Změřte vlnové délky čar Balmerovy série vodíku/deuteria
- Vypočtete Rydbergovu konstantu a z ní vypočtete Planckovu konstantu

2 Seznam pomůcek

Spektrometr, držák s optickou mřížkou/hranolem, sodíková lampa, zdroj sodíkové lampy, vodíková spektrální trubice, lampička na přisvícení.

3 Teorie

Rydbergova konstanta je fyzikální konstanta pojmenovaná po švédském fyzikovi Johannesu Rydbergovi. Představuje nejvyšší možný vlnčet (převrácená hodnota vlnové délky) elektromagnetického záření, které může vyzářit nejjednodušší atom – atom vodíku – v limitě nekonečné hmotnosti jádra.

V tomto měření chceme najít Rydbergovu konstantu z Balmerovi série.

Balmerova série je série spektrálních čar (Balmerovy čáry) ve spektru atomů vodíku, které vznikají při přechodu elektronů mezi druhou energetickou hladinou a vyššími hladinami. Při přechodu elektronu mezi druhou a třetí energetickou hladinou se utváří při astronomických pozorování velmi důležitá červená čára H_α (s vlnovou délkou 656,3 nm), při přechodu mezi druhou a čtvrtou hladinou vzniká čára H_β atd...

$$\frac{1}{\lambda_n} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \left[\frac{1}{m} \right]; \quad (n \in \mathbb{N}) \wedge (n > 2) \quad (1)$$

λ je vlnová délka a R_H je Rydbergova konstanta pro vodík.

Klasickou korekci Rydbergovi konstanty na konečné jádro provedeme pomocí vzorce

$$R_\infty = R_H \frac{m_p + m_e}{m_p} \quad (2)$$

$m_p = 1.6726 \cdot 10^{-27} [kg]$ je hmotnost protonu a $m_e = 9.1093 \cdot 10^{-31} [kg]$ je hmotnost elektronu.

Polohy maxim jsou dány vzorcem

$$d \sin \theta = m \lambda \quad (3)$$

d je mřížková konstanta, m je řád difrakce, λ je vlnová délka a θ je úhel difrakce.

Úhel pro difrakci se zjistí ze vztahu

$$\theta = \frac{\theta_L - \theta_P}{2} \quad (4)$$

θ_L je úhel naměřený vlevo od nulové polohy a θ_R úhel naměřený vpravo od nulové polohy.

4 Postup měření

4.1 Kalibrace spektrometru a měření maxim u sodíku

Když jsem přišel, vše bylo zapojeno, zkontroloval jsem tedy zapojení. Zapl jsem sodíkovou lampu a přesunu tak, aby svítila na štěrbinu. Nastavil jsem spektrometr tak, aby byl v jedné přímce s trubicí. Potom jsem nastavil velikost štěrbinu a zaostřil jsem dalekohled. Nastavil jsem dalekohled, aby první čára ze spektra byla přesně na kříži. Zaznamenal jsem si tuto hodnotu. Posouval jsem dalekohled doleva, dokud jsem neobjevil další čáru a zapsal jsem si její hodnotu vycentrovanou na kříži. To jsem udělal ještě pro jednu a vrátil jsem dalekohled do nulové polohy. Opakoval jsem následující i pro pravou stranu.

4.2 Pozorování Balmerovy série

Vyměnil jsem sodíkovou lampu za vodíkovou. Nastavil jsem rameno do nulové polohy a dělal jsem přesně to samý jako u sodíkové lampy. Dokázal jsem změřit difrakci k 4. řádu.