CLÍNICA DENTAL implantdent

RECOMMANDATIONS POSTOPÉRATOIRES

Après votre chirurgie implantaire

Suivez ces conseils pour une bonne cicatrisation et une bonne intégration de votre implant.

La plupart des patients récupèrent sans complication en quelques jours. Lisez cette fiche tranquillement et conservez-la : vous y trouverez ce qu'il faut faire, ce qu'il est normal de ressentir et quand nous prévenir.

Soins à domicile

1 Prenez vos médicaments comme prescrit

Respectez doses et horaires. Si un antibiotique vous a été prescrit, terminez-le même si vous allez bien. Prenez le premier antalgique avant la fin de l'anesthésie. Ne modifiez rien sans nous consulter.

2 Compresse et saignement

Mordez la compresse fermement, sans relâcher, pendant 30 à 60 minutes. Si cela saigne encore, mettez une compresse propre, de préférence humide, et recommencez. Une salive rosée pendant 1 à 2 jours est normale.

3 Froid sur la zone (48 premières heures)

Appliquez du froid sur la joue, côté opéré : 15–20 min de froid, puis 15–20 min de pause. Glace toujours enveloppée dans un linge, jamais directement sur la peau. Pas de chaleur ces jours-là.

4 Alimentation

Attendez la fin de l'anesthésie. Les premiers jours : aliments mous, froids ou tièdes (yaourt, purées, potages, œufs, poisson). Évitez le chaud, le dur, le croquant, l'épicé et les graines. Mâchez de l'autre côté et buvez beaucoup d'eau.

5 Ne crachez pas, ne rincez pas (24 h)

Cracher, se rincer vigoureusement ou boire à la paille peut décoller le caillot et relancer le saignement. Avalez votre salive normalement. Dès le lendemain, bains de bouche doux avec le produit prescrit, sans agiter.

6 Ni tabac ni alcool

Le tabac (vapotage compris) retarde la cicatrisation et est l'une des principales causes d'échec implantaire : évitez-le au moins 2 semaines, l'idéal étant d'arrêter. Pas d'alcool pendant le traitement.

7 Hygiène

Brossez les autres dents dès le soir même avec une brosse souple, en douceur près de la zone opérée. Ne touchez pas la plaie avec la langue ni les doigts, ne soulevez pas la lèvre pour la regarder. Prothèse : selon nos indications.

8 Repos

Reposez-vous le jour de l'intervention. Évitez le sport, le port de charges et de vous pencher pendant 3 à 4 jours. Dormez la tête légèrement surélevée (deux oreillers) pour limiter le gonflement.

En cas de sinus lift : ne vous mouchez pas, éternuez la bouche ouverte et évitez l'avion et la plongée jusqu'à notre accord.

✓ C'est normal et cela fait partie de la guérison

Ces réactions sont attendues et s'améliorent de jour en jour. Pas d'inquiétude.

✓ Gonflement
Augmente pendant 48–72 h, puis diminue progressivement.

✓ Hématome
Bleu sur la joue, le menton ou le cou. Il passe du violet au jaune et disparaît en 1–2 semaines.

✓ Douleur
Gêne modérée les 2–3 premiers jours, soulagée par les médicaments.

✓ Légère fièvre
Quelques dixièmes (moins de 38 °C) pendant les premières 24–48 h.

✓ Salive rosée
Léger saignement ou salive teintée pendant 1–2 jours.

✓ Raideur
Bouche difficile à ouvrir, lèvres sèches, léger mal de gorge.

Appelez-nous si…

- Le saignement ne s'arrête pas après 1 heure de pression ferme sur la compresse.
- La douleur ou le gonflement augmentent à partir du 3e jour au lieu de diminuer, ou la douleur résiste aux médicaments.
- Vous avez 38 °C de fièvre ou plus, ou si elle dure plus de 2 jours.
- Vous remarquez un mauvais goût, une mauvaise odeur ou du pus.
- La lèvre, le menton ou la langue restent engourdis le lendemain.
- L'implant ou la vis de cicatrisation vous semble desserré ou mobile.
- Les médicaments provoquent éruption, démangeaisons, nausées ou vomissements.

Allez aux urgences ou appelez le 112 si…

- Vous avez du mal à respirer ou à avaler.
- Le gonflement augmente vite et s'étend vers l'œil, le cou ou sous la langue.
- Le saignement est abondant et impossible à contrôler.
- Vous avez une forte fièvre (39 °C ou plus) avec frissons ou malaise général.
- Vos lèvres, votre langue ou votre visage gonflent, avec urticaire ou malaise (possible allergie grave).

URGENCES 112 — **En dehors de nos horaires, n'attendez pas : allez aux urgences.**

TÉLÉPHONE DE LA CLINIQUE _____ PROCHAIN CONTRÔLE / RETRAIT DES POINTS _____

Conseils généraux de soins postopératoires. Si votre dentiste vous a donné des consignes différentes, suivez toujours les siennes.