CLÍNICA DENTAL implantdent

RECOMANACIONS POSTOPERATÒRIES

Després de la cirurgia d'implants

Segueixi aquestes pautes per a una bona cicatrització i una correcta integració de l'implant.

La majoria de pacients es recuperen sense complicacions en pocs dies. Llegeixi aquest full amb calma i guardi'l: hi trobarà què ha de fer, què és normal notar i quan ens ha d'avisar.

Cures a casa

1 Prengui la medicació tal com s'ha indicat

Respecti les dosis i els horaris. Si li hem receptat antibiòtic, acabi'l encara que es trobi bé. Prengui el primer analgèsic abans que passi l'efecte de l'anestèsia. No deixi ni canviï la medicació sense consultar-nos.

2 Gasa i sagnat

Mossegui la gasa amb pressió ferma i constant durant 30–60 minuts. Si continua sagnant, posi's una gasa neta, millor humitejada, i repeteixi. És normal que la saliva surti tenyida de rosa durant 1–2 dies.

3 Fred a la zona (primeres 48 h)

Apliqui fred per fora de la cara, sobre la zona operada: 15–20 minuts sí i 15–20 minuts no. Emboliqui el gel amb un drap, mai directament sobre la pell. No apliqui calor aquests dies.

4 Què menjar

Esperi que passi l'anestèsia. Els primers dies: menjar tou, fred o tebi (iogurt, purés, cremes, batuts, ou, peix). Eviti el que sigui calent, dur, cruixent, picant o amb llavors. Mastegui per l'altre costat i begui molta aigua.

5 No escopeixi ni s'esbandeixi (24 h)

Escopir, esbandir-se amb força o xuclar amb canyeta pot desprendre el coàgul i provocar sagnat. Empassi's la saliva amb normalitat. A partir de l'endemà, esbandides suaus amb el col·lutori indicat, sense fer força.

6 No fumi ni begui alcohol

El tabac (també el vapeig) endarrereix la cicatrització i és una de les principals causes de fracàs de l'implant: eviti'l almenys 2 setmanes, i millor encara si aprofita per deixar-lo. Gens d'alcohol mentre prengui la medicació.

7 Higiene

Raspalli la resta de dents des d'aquella mateixa nit amb un raspall suau, amb molta cura a la zona operada. No toqui la ferida amb la llengua ni amb els dits, ni aixequi el llavi per mirar-la. Si porta pròtesi, faci-la servir només com li indiquem.

8 Repòs

Descansi el dia de la intervenció. Eviti l'esport, carregar pes i ajupir-se durant 3–4 dies. Dormi amb el cap una mica elevat (dos coixins) per reduir la inflamació.

Si li hem fet una elevació de sinus: no es moqui, esternudi amb la boca oberta i eviti volar o bussejar fins que li ho indiquem.

✓ És normal i forma part de la recuperació

Aquestes reaccions són esperables i milloren dia a dia. No es preocupi.

✓ Inflamació
Augmenta les primeres 48–72 h i després baixa a poc a poc.

✓ Hematoma
Blau a la galta, el mentó o el coll. Passa de lila a groc i desapareix en 1–2 setmanes.

✓ Dolor
Molèsties moderades els 2–3 primers dies, controlades amb la medicació.

✓ Febrícula
Unes dècimes de febre (menys de 38 °C) durant les primeres 24–48 h.

✓ Saliva rosada
Petit sagnat o saliva tenyida durant 1–2 dies.

✓ Rigidesa
Costa obrir la boca, llavis secs o lleu mal de coll uns dies.

Truqui'ns si...

- El sagnat no s'atura després d'1 hora de pressió ferma amb gasa.
- El dolor o la inflor augmenten a partir del 3r dia en lloc de millorar, o el dolor no cedeix amb la medicació.
- Té febre de 38 °C o més, o li dura més de 2 dies.
- Nota mal gust, mala olor o pus a la zona.
- El llavi, el mentó o la llengua continuen adormits l'endemà.
- Nota que l'implant o la peça de cicatrització es mou o està fluix.
- La medicació li provoca erupció a la pell, picor, nàusees o vòmits.

Vagi a urgències o truqui al 112 si...

- Li costa respirar o empassar.
- La inflor creix ràpidament i s'estén a l'ull, al coll o sota la llengua.
- Sagna en abundància i no ho pot controlar.
- Té febre alta (39 °C o més) amb calfreds o mal estat general.
- Se li inflen els llavis, la llengua o la cara, amb urticària pel cos o mareig (possible al·lèrgia greu).

EMERGÈNCIES **112**

Fora del nostre horari, no esperi: vagi a urgències.

TELÈFON DE LA CLÍNICA _____ PROPERA REVISIÓ / RETIRADA DE PUNTS _____

Pautes generals de cura postoperatòria. Si el seu dentista li ha donat indicacions diferents, segueixi sempre les del seu dentista.