CLÍNICA DENTAL implantdent

RECOMENDACIONES POSTOPERATORIAS

Después de su cirugía de implantes

Siga estas pautas para una buena cicatrización y una correcta integración del implante.

La mayoría de pacientes se recuperan sin complicaciones en pocos días. Lea esta hoja con calma y guárdela: aquí tiene lo que debe hacer, lo que es normal notar y cuándo debe avisarnos.

Cuidados en casa

1 Tome la medicación según lo indicado

Respete dosis y horarios. Si le hemos recetado antibiótico, termínelo aunque se encuentre bien. Tome el primer analgésico antes de que se pase la anestesia. No suspenda ni cambie la medicación sin consultarnos.

2 Gasa y sangrado

Muerda la gasa con presión firme y constante durante 30–60 minutos. Si sigue sangrando, póngase una gasa limpia, mejor humedecida, y repita. Es normal que la saliva salga teñida de rosa durante 1–2 días.

3 Frío en la zona (primeras 48 h)

Aplique frío por fuera de la cara, sobre la zona operada: 15–20 minutos sí y 15–20 minutos no. Envuelva el hielo en un paño, nunca directo sobre la piel. No aplique calor estos días.

4 Qué comer

Espere a que pase la anestesia. Primeros días: comida blanda, fría o templada (yogur, purés, cremas, batidos, huevo, pescado). Evite lo caliente, duro, crujiente, picante o con semillas. Mastique por el otro lado y beba mucha agua.

5 No escupa ni se enjuague (24 h)

Escupir, enjuagarse con fuerza o sorber con pajita puede desprender el coágulo y provocar sangrado. Trague la saliva con normalidad. Desde el día siguiente, enjuagues suaves con el colutorio indicado, sin agitar.

6 No fume ni beba alcohol

El tabaco (también el vapeo) retrasa la cicatrización y es una de las principales causas de fracaso del implante: evítelo al menos 2 semanas, y mejor aún si aprovecha para dejarlo. Nada de alcohol mientras tome la medicación.

7 Higiene

Cepille el resto de dientes desde esa misma noche con un cepillo suave, con mucho cuidado en la zona operada. No toque la herida con la lengua ni con los dedos, ni levante el labio para mirarla. Si lleva prótesis, úsela solo como le indiquemos.

8 Reposo

Descanse el día de la intervención. Evite deporte, cargar peso y agacharse durante 3–4 días. Duerma con la cabeza algo elevada (dos almohadas) para reducir la inflamación.

Si le hemos hecho elevación de seno: no se suene la nariz, estornude con la boca abierta y evite volar o bucear hasta que se lo indiquemos.

✓ Es normal y forma parte de la recuperación

Estas reacciones son esperables y van mejorando día a día. No se preocupe.

✓ Inflamación
Aumenta las primeras 48–72 h y después baja poco a poco.

✓ Hematoma
Moratón en mejilla, mentón o cuello. Pasa de morado a amarillo y desaparece en 1–2 semanas.

✓ Dolor
Molestias moderadas los 2–3 primeros días, controladas con la medicación.

✓ Febrícula
Unas décimas de fiebre (menos de 38 °C) durante las primeras 24–48 h.

✓ Saliva rosada
Pequeño sangrado o saliva teñida durante 1–2 días.

✓ Rigidez
Cuesta abrir la boca, labios secos o leve dolor de garganta unos días.

Llámenos si...

- El sangrado no se detiene tras 1 hora de presión firme con gasa.
- El dolor o la hinchazón aumentan a partir del 3.er día en vez de mejorar, o el dolor no cede con la medicación.
- Tiene fiebre de 38 °C o más, o le dura más de 2 días.
- Nota mal sabor, mal olor o pus en la zona.
- El labio, el mentón o la lengua siguen dormidos al día siguiente.
- Nota el implante o la pieza de cicatrización suelto o móvil.
- La medicación le produce sarpullido, picor, náuseas o vómitos.

Vaya a urgencias o llame al 112 si...

- Le cuesta respirar o tragar.
- La hinchazón crece rápido y se extiende al ojo, al cuello o debajo de la lengua.
- Sangra en abundancia y no consigue controlarlo.
- Tiene fiebre alta (39 °C o más) con escalofríos o mal estado general.
- Se le hinchan los labios, la lengua o la cara, con ronchas por el cuerpo o mareo (posible alergia grave).

EMERGENCIAS **112** — Fuera de nuestro horario, no espere: acuda a urgencias.

TELÉFONO DE LA CLÍNICA _____ PRÓXIMA REVISIÓN / RETIRADA DE PUNTOS _____

Pautas generales de cuidado postoperatorio. Si su dentista le ha dado indicaciones diferentes, siga siempre las de su dentista.