Year	Event	Strength	DJF (°C)	⟨SST′⟩ (°C)	$\delta\omega_{500,\,E-W}$ (%)			$\delta F_{net,\,W-E}$ (%)		
					FULL	UNIF.	PATT.	FULL	UNIF.	PATT.
1983	El Niño	Very Strong	+2.41	+0.25	−76.0	+2.6	−81.4	−76.9	+5.5	−84.4
1998	El Niño	Very Strong	+2.40	+0.55	−90.2	+3.2	−84.8	−99.3	+12.3	−95.7
1992	El Niño	Strong	+1.75	+0.08	−32.6	+0.1	−34.3	−34.8	+0.3	−37.3
2010	El Niño	Strong	+1.59	+0.36	−14.4	+2.2	−15.4	−14.3	+8.5	−22.4
2003	El Niño	Moderate	+1.22	+0.20	−13.5	+0.6	−13.7	−7.9	+4.2	−14.1
1987	El Niño	Moderate	+1.16	+0.09	−27.4	−0.6	−26.0	−31.8	+0.5	−31.5
1995	El Niño	Weak*	+1.00	+0.07	−14.8	+0.5	−15.1	−5.9	+0.2	−7.9
2007	El Niño	Weak	+0.78	+0.19	−8.6	+3.0	−7.9	+6.6	+5.0	+2.2
1988	El Niño	Weak	+0.72	+0.23	−13.6	+0.2	−13.7	−23.8	+1.9	−25.4
2005	El Niño	Weak	+0.63	+0.19	−3.5	+1.1	−4.3	+3.9	+2.3	+2.5
1989	La Niña	Strong	−1.87	−0.34	+8.6	−1.8	+9.6	+39.0	−8.9	+43.2
2000	La Niña	Strong	−1.59	−0.26	+14.4	−0.2	+15.5	+41.8	−5.2	+46.1
2008	La Niña	Strong	−1.58	−0.23	+8.8	−1.1	+9.4	+28.7	−6.3	+33.8
1999	La Niña	Moderate	−1.46	−0.09	+22.1	+0.2	+22.4	+64.1	−2.5	+63.9
2011	La Niña	Moderate	−1.32	−0.17	+19.4	+0.4	+19.2	+53.0	−3.3	+56.8
1985	La Niña	Moderate	−1.27	−0.32	+13.3	+0.5	+11.8	+24.5	−5.3	+26.2
1996	La Niña	Weak	−0.84	−0.08	+14.5	−0.7	+16.1	+35.6	−4.3	+38.3
1984	La Niña	Weak	−0.77	−0.13	+4.5	−0.8	+2.3	+15.0	−3.5	+13.1
2012	La Niña	Weak	−0.75	−0.11	+5.7	+1.2	+4.6	+18.6	−3.5	+20.2
1986	La Niña	Weak	−0.70	−0.22	+7.6	−0.5	+8.1	+17.2	−4.1	+24.3
2001	La Niña	Weak	−0.70	−0.07	+18.8	+0.2	+18.0	+40.3	−2.3	+42.0
2009	La Niña	Weak	−0.67	+0.02	+13.8	+1.9	+12.5	+25.0	+1.0	+23.7
2006	La Niña	Weak	−0.59	+0.04	+15.3	−0.8	+13.8	+25.0	−0.3	+23.0

* Strength classes are assigned from the unrounded DJF index; 1995 is Weak because its DJF magnitude lies just below 1.0 °C.