


Zeta function estimate with prime number and number theory differential geometry of quantum level from Morse theory

Masaaki Yamaguchi



$$\begin{aligned}
 x &\rightarrow a \rightarrow \frac{a}{\log x} \rightarrow x \log x \rightarrow \int x \log x dx \rightarrow \int \frac{1}{(x \log x)} dx \rightarrow \\
 &\rightarrow \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \rightarrow \frac{d}{df} \int \int \frac{1}{(x \log x)^2} dx_m \\
 \frac{d}{df} F &= F^{(f)'} = e^f + e^{-f} \rightarrow 2i \sin(ix \log x) \rightarrow \frac{d}{d\gamma} \Gamma^{-1} = e^f - e^{-f} \rightarrow 2 \cos(ix \log x)
 \end{aligned}$$

整数から素数の散らばっている数値をグラフ化する。統合すると、ゼータ関数の性質がルールの規則となり、この規則がグラフを変形させたり、数式をグラフ化するのに、数式自体を自在に別のこのゼータ関数として成り立つルールの範囲で、数式自体を変形して同型と準同型の範囲で数式処理すると、TupleSpace の Omega Database にアクセスできてフェルミオンとボソンの設計図としてのゼータ関数を求めることができる。微分幾何の量子化は、D-brane の単体量からの図形のメッシュ生成として、Morse 理論となっている。