

空間概念の量子化は、光量子仮説を使う

Masaaki Yamaguchi

空間概念の量子化のため、最低エネルギーのエントロピー値の式が、

$$e^f + e^{-f} \geq e^f - e^{-f}$$

として、この $e^{-x \log x}$ が、光量子仮説を説明している。量子飛躍は、

$$h\nu = [e^{-x \log x}]$$

となる。このため、飛び飛びの値をとる。最低エネルギーのエントロピー値 $e^{-x \log x}$ のため、

$$[\eta + \bar{h}(x)]dx^\mu dx^\nu \\ e^{-2\pi T \|\psi\|} [\eta + \bar{h}(x)]dx^\mu dx^\nu$$

これは、単体量であり、

$$T^2 d^2 \psi$$

これは、アーベル多様体による熱エネルギーを表している。ブラックホールのエネルギー体である。この単体量と熱エネルギーが同等だと、

$$= \|ds^2\|$$

平坦な宇宙の場合となる。空洞放射は、無限の熱エネルギーなのは、 $e^{x \log x}$ ヒッグス場のエネルギーより

$$\frac{d}{df} F = m(x) = e^{x \log x}$$

ここで、ガンマ関数とオイラーの定数の多様体積分が、

$$\int \Gamma(\gamma)' dx_m = e^{-x \log x} \\ \int C dx_m = e^{-x \log x}$$

のために、光電効果から、フェルマーの定理の

$$e^{-x \log x} \leq z^n \leq e^{x \log x}$$

としての範囲を、単体量でのエネルギー範囲をもつ。x の値をとるために、飛び飛びの値を取るのと、無限のエネルギーを持つのを説明できる。全ては、ゼータ関数から求まる。